

Beiträge zur Naturkunde Preussens

herausgegeben

von der

physikalisch-ökonomischen Gesellschaft

zu Königsberg.

4.

Catalog der Preussischen Käfer

neu bearbeitet


von

Prof. Dr. Lentz.

(Preis 2,50 Mark.)

Königsberg 1879.

In Commission bei W. Koch.



deut. Friedrich Leonard

F.59.



Catalog der preussischen Käfer.

Nach den gewaltigen Leistungen von Gemminger und v. Harold (*Catalogus coleopterorum hucusque descriptorum* 1868—71), nachdem neuen Catalog von Stein und Weise (Berlin 1877) ist auch eine neue Bearbeitung des Verzeichnisses der preussischen Käfer nothwendig geworden. In dem früher von mir (Königsb. 1857) herausgegebenen Catalog stehen begreiflicherweise viele Irrthümer, welche durch neuere Forschungen beseitigt sind, und die vier in diesen Schriften erschienenen Nachträge enthalten, abgesehen von der Unannehmlichkeit der Zerstückelung so manche Behauptungen, die wieder zurückgenommen oder wenigstens modifizirt werden mussten. — In Beziehung auf die Quellen unserer Kenntniss verweise ich auf das Vorwort meines früheren Verzeichnisses. Ich habe mir zu der vorliegenden Arbeit das vortreffliche Verzeichniss der Käfer Schlesiens von K. Letzner Breslau 1871 (Zeitsch. für Schles. Insektenkunde Heft 2; Nachtrag 1876 Heft 5) zum Muster genommen: nur habe ich geglaubt diejenigen Sammler namentlich anführen zu müssen, welche die Käfer entweder selbst gefunden haben oder wenigstens wissen, dass und von wem sie gefunden sind. Wenn man das Faunagebiet Schlesiens mit dem der beiden preussischen Provinzen vergleicht, so sollte man meinen, dass, sowie das Areal Preussens (etwa 1172 [J.M.]) um 332 grösser ist als das Schlesiens, so auch die Anzahl der Käferspecies höher wäre. Das ist nun nicht der Fall. In Schlesien sind Ende 1875 nach Letzner 4159 Species gezählt worden, in Preussen jetzt etwa 3250. Der Grund dieser Erscheinung liegt auf der Hand. Was die Verschiedenheit der Bodenbeschaffenheit betrifft, so möchte wohl die Gebirgsfauna Schlesiens der Seesfauna Preussens entsprechen: aber Schlesien ist bedeutend besser durchforscht als unser Land, und namentlich ist der Sinn für coleopterologische Forschungen dort entschieden reger; man lese das Vorwort Letzners p. XIII bis XXIV. Bei uns ist es dem gewöhnlichen Manne noch immer unbegreiflich, wie man ohne materiellen Gewinn am Suchen und Forschen nach Insekten Freude haben kann, und angestaunt wird, wer etwa in einem Pilzenhaufen oder unter welkem Laube etwas sucht. Im Letzner'schen Verzeichnis findet man aus den verschiedensten Gegenden Schlesiens Angaben: von den 55 Kreisen Preussens kann man nur etwa 6 zählen, die einzigermassen durchforscht sind, und auch aus diesen wird jährlich noch eine ziemliche Anzahl neu aufgefunder Käfer angegeben. Im Norden ist die Fauna der Gegend von Königsberg und Danzig bekannt geworden durch die Bemühungen der Herren s. h. t. v. Siebold, v. Frantzius †, Andersch †, Steffahny †, Bogong †, v. Dommer, Kumm, Helm,

Fritzen, Elditt †, Sauter, Kuwert, Schiefferdecker, Künow, Pfeil †, Seydlitz, Steiner, Dossow, Czwalina; in der Mitte der Provinz Osterode und Allenstein (Kugelann † 1815, dessen reiche Sammlung leider verschollen ist, woher die in seinen noch vorhandenen Manuscripten niedergelegten Namen zum grossen Theil nicht mehr deutungsfähig sind), Pr. Stargard (Schmidt Pr. Prov. Blätter 1839 p. 563); im Süden Gilgenburg (Kramer), Lyck (Sanio). Was die mächtigen Forsten und Seen des Ostens und Südwestens bieten, ist bis jetzt noch keinem Sterblichen kund geworden. Sollte also die Behauptung, dass in unserm Lande noch Hunderte von Species aufgefunden werden können, zu gewagt erscheinen? zumal da auch die Forschungen des preuss. botan. Vereins in den Kreisen Carthaus, Dt. Crone, Flatow, Allenstein schon jetzt eine beträchtliche Zahl von bisher nicht in Pr. gefundenen Pflanzen ergeben haben. Dass nun andererseits die Freude am Sammeln und Bestimmen des gesammelten Materials durch die unselige Verwirrung, die in neuerer Zeit in die Wissenschaft hineingekommen ist, sehr verkümmert wird, ist ebenso betrübend als unleugbar. Man vergleiche den ehemaligen doch recht werthvollen Schaumschen Catalog der Käfer Europas 1859 mit dem jetzigen von Stein u. Weise 1877, man lese die Bemerkungen, Vorschläge, Erweiterungen und Erläuterungen dazu in der Deutschen entom. Zeitschrift XXII p. 161—196, ferner bei Katter in den entomol. Nachrichten, und man wird gestehen müssen, dass wir in ein Labyrinth von Genus-, Species- und Varietätennamen geführt werden, aus dem schwerlich ein Ariadnesfaden uns herausführen möchte. Die consequente Durchführung des Prioritätsprincips ist wissenschaftlich wohl begründet, allein das Bedenken und die Warnung v. Kiesewetters l. c. p. 177 ist doch auch wohl zu beherzigen, und ich versteh'e nicht, wie v. Harold die Nomenclatur des Catalogs vollständig aufrecht erhalten will, wie er p. 196 verspricht: leider sehen wir einer end- und zwecklosen Polemik entgegen. Wer vermuthet den allbekannten Omias hirsutulus Fabr. unter dem Namen Platytarsus echinatus Bonsd.? wer sucht den Lathridius illiputanus Mannh. unter Cartodere ruficollis Marsh.? Unter diesen Umständen habe ich es für zweckmässig gehalten, möglichst die bisher gebrauchten bekannten Namen beizubehalten; der Anordnung des neuen Catalogs bin ich aber gefolgt. Sehr oft wiederkehrende Namen von Localitäten habe ich abgekürzt; die wesentlichsten sind folgende:

Dz. = Danzig.

Fchst. = Friedrichstein bei Königsberg.

F. F. = Fritzensche Forst im Samlande.

Heub. = Heubude bei Danzig. *Stogi kolo Gnyzna*

Hlgb. = Heiligenbeil. — *Swietomierze*

Ggbg. = Gilgenburg. — *Dąbrowa pow. Ostrowie*

Kbg. = Königsberg.

Ktzn. = Katznase bei Marienburg. — *Katynia k. Malborka*

Schrb. = Schrombehnen bei Pr. Eylau. *Tawski*

Carabidae.

Cicindela campestris L. h. im Frühjahr auf Sandwegen überall, var. *connata* Heer. (Eld.).

C. hybrida h. — var. *maritima* Dej. gewiss nicht eigene Art, vielfache Uebergänge, am Nordstrande des Samlandes g. Jull (Ltz.).

C. silvatica L. n. s. auf sandigen Wegen unter Nadelholz. Rauschen, Caporn. Haide (Ltz.), Dz. (Czw.).

C. literata Sulz. var. *sinuata* F. n. s. bei Alt-Pillau in den Schluchten der Dünen, namentlich, wo der spärliche Sand die darunter liegende Thonschicht sichtbar lässt. Ende Juni. (Ltz.); Zoppot (Eld. Frantz.).

C. germanica L. n. h. auf Lehmboden. Elbing, Braunsbg. (Sieb.); Wehlau (Sauter).

Omophron limbatum F. n. s. an Teichrändern im Kiessande, Lauthsche Teich (Eld. Ltz.); Zoppot (Helm.).

Notiophilus aquaticus L. h. an feuchten Orten, auf dem sandigen Boden wasserloser Gräben (Ltz.).

N. palustris Dst. ebenso.

N. biguttatus F. u. var. *semiguttatus* F. ebenso.

Elophrus uliginosus F. s. im Uferschlamm der Gewässer. Sarkauer Wald (Nanke), Wehlau (Sauter).

E. cupreus Dst. n. s. an gleichen Orten (Ltz.), an der Mottlau (Helm.).

E. riparius L. g. an gleichen Orten.

E. aureus Müll. n. h. Elbing (Sieb.), Ktz. (Czw.).

Blethisa multipunctata L. n. s. am See-strande, Juil (Eld. Ltz.).

Cychrus rostratus L. n. h. in Laubwäldern unter Steinen (Eld.); var. *elongatus* Hoppe (Eld.).

Proctocera coriacea L. n. h. in Laubwäldern. Warnicken, Kleinhaide (Eld.).

Oreohus intricatus L. s. unter Waldmoos in Erdhügeln. Kahlerberg (Ltz.).

C. purpurascens F. einmal bei Osterode (Kug.), seitdem nicht wieder gefunden.

C. violaceus L. n. s. in Laubwäldern. Neu-häuser (Ltz.).

C. catenulatus Scop. Osterode (Kug.), nachher nicht wieder gefunden.

C. auronitens F. s. in waldigen Strecken, Osterode (Kug.), Elbing, Kbg. (Sieb.), Capornische Haide, Galtgarben (Fritzen).

C. nitens L. n. s. auf Grasplätzchen, Kbg. (Ltz.).

C. granulatus L. s. h. unter Steinen..

C. arvensis F. in versch. Farben n. s. im Frühjahr. Neuhausen (Ltz.).

C. clathratus L. n. h. in der Bludauer Forst in Sandlöchern und Kiesgräben (Eld.). Einmal Spätbr. 1821 h. bei Pr. Stargard unter der Rinde alter Kiefernstubben (Schmidt Pr. Prov.-Bl. 1839 p. 563).

C. cancellatus Ill. s. h. unter Steinen. var. *tuberculatus* Schm. h.

C. auratus L. s. auf Aeckern. Osterode (Kug. Sieb.).

C. convexus F. n. h. unter Steinen, Elbing (Ltz.).

C. hortensis L. n. s. in Laubwäldern. Neu-häuser, Blaustein (Ltz.).

C. silvestris F. s. s. in Preussen (Illig. K. Pr. p. 131). Tilsit (Andersch.).

C. marginalis F. in Kieferwäldern unter alten Baumwurzeln, August. Osterode (Kug.), Dz. (Helm.), Pr. Stargard (Sieb.). Einmal in Mengo bei Rosenberg (Eld.).

C. glabratus Pk. n. h. in Laubwäldern, in Sandgruben u. Kiesgräben (Ltz.).

C. nemoralis Müll. n. s. in Feld u. Wald (Ltz.).

Calodoma inquisitor L. n. s. von Bäumen, besonders Eichen, herabgekippt, auf denen er Nahrung sucht. Corjeiten (Ltz.), Hilgbl. (Star.).

C. sycophanta L. s. Allensteiner Glashütte (Kug.), Warnicken, Schwarzort, Rothenen (Ltz.).

C. sericeum F. s. Neuhäuser (Ltz.).

C. investigator Ill. s. s. Kbg. (Illi. K. Pr. p. 142). Tilsit (Star.).

C. reticulatum F. einmal bei Dz. in größerer Zahl (Domm.), Ufer des Drewenzsee (Hilg.). Neustadt auf tristen Brachfeldern, Juli, Aug. (Fritzen).

Nebria livida L. n. s. Sarkau an den Wurzeln von Carex (Nanke), Osterode einmal zahlreich an alten Elternwurzeln (Kug.), an den Ufern der Weichsel und der Memel, Zoppot (Sieb.), Glettkaus (Czw.), Chmelno bei Carthaus (Helm). Die var. *lateralis* F. war ehemals bei der Kbg. Sternwarte s. h., jetzt daselbst nicht mehr vorhanden. Am Lauthschen Teiche (Eld. Ltz.), an der Ausmündung kleiner Bäche bei Rauschen unter Steinen auf Lehmboden (Eld. Ltz.), Dz. (Domm. Helm).

N. brevicollis F. n. s. unter Steinen und faulem Holze. Dz. (Sieb.), Georgenswalde (Ltz.).

Pelophila borealis Pk. s. s. Osterode (Kug.), Ggbg. (Janke teste Kr.).

Leistus rufomarginatus Dft. s. Putzig (Stf.), Dz., (Domm., Helm, Czw.).

L. ferrugineus L. spinilabris Pz. s. unter moderndem Laube, Warnicker Park (Ltz.)

L. rufescens F. n. s. ebenso.

Olivina fossor L. h. unter Steinen an Pflanzenstößen. Die var. *collaris* Hbst. n. s. daselbst.

Dyschirius globosus Hbst. gibbus F. g. in Pflanzenerde.

D. laeviusculus Putz. s. Nogatuer bei Ktzn. (Czw.).

D. salinus Schaum. s. Dz. (Ltz.).

D. angustatus Ahr. s. Dz. (Frantz.).

D. chalceus Er. s. am Weichselufer (Sieb.).

D. nitidus Dej. inermis Curt. s. Helaer Strand (Stf.).

D. politus Dej. s. Dz. im Werder (Sieb. Czw.).

D. intermedius Putz. s. Schwarzort Juli (Ltz.), Schrb. (Czw.).

D. thoracicus Rossi h. am Weichselufer (Sieb.), Kbg. (Ltz.). Die var. *obscurus* Gyll. n. s. Seestrand bei Putzig u. Dz. (Stf. Czw.).

D. aeneus Dej. n. h. ebenda.

Brachynus crepitans L. s. s. Mewe (Stf.), Neustadt (Fritzen) auf Lehmboden.

Odacantha melanura L. n. h., lebt im Phragmites am Ufer von Landseen. Neuhausen. (Star.), Dammhof (Ltz.), Dz. (Fritzen).

Aëtophorus imperialis Germ. s. Dz. auf den Dünen (Helm), Ktzn. (Czw.).

Dowettiella unipunctatus Germ. h. zwischen

den Stengeln von Junos *bifolia*, *arenarius*, in dessen Halmen er sich entwirrt. Oxhöft, Heub. (Fritzen), Neuhäuser (Star.).

D. atricapillus L. s. daselbst (Sieb.).

Dromius longiceps Dej. s. unter Pappeirinde Dz. (Sieb.), Kbg. Neue Bleiche, Dammhof (Czw. Star.).

D. linearis Oliv. s. unter Pappeirinde Kbg. (Ltz.), Dz. (Czw.).

D. marginellus F. n. s. unter Rinde von Laub- u. Nadelhölzern. Margin bei Kbg. (Ltz.).

D. testaceus Er. n. h. Dz. unter Kiefernrinde (Sieb.).

D. agilis F. h. unter Rinde vieler Bäume.

D. senestratus F. s. Dz. (Sieb.).

D. quadrimaculatus L. n. s. unter Rinde Kbg. (Ltz.).

D. quadrinotatus L. n. h. ebenso.

D. nigriventris Thoms. *fasciatus* Dej. n. h. unter Weiderinde, Rastenbg., Elbing (Ltz.), Dz. (Czw.).

D. sigma Rossi n. s. daselbst.

Blechrus glabratus Dft. *maurus* St. s. Wernsdorf, im Tharauer Walde (Kuwert), Dz. (Helm, Czw.). Vgl. v. Heyden Käf. v. Nassau p. 16.

Metabletus obscuroguttatus Dft. s. Ggbg. (Kr.), Heub. (Helm), Neustadt un'er Erica vulgaris (Fritzen).

M. truncatellus L. g. auf sandigen Aeckern.

M. soveola Gyll. g. ebenso.

Lebia cyanocephala L. s. Aweiden b. Kbg. (Ltz.).

L. chlorocephala Hoffm. n. s. Kbg. (Ltz.), Dz. (Sieb.), liebt Hypericum perforatum (Fritzen).

L. crux minor L. einmal Aug. 77 h. auf Nesseln bei Dammhof (Star.), sonst s. Pelonen bei Dz. (Sieb.), Caporn. Haide (Sauter), Warneicken, Fehst. (Ltz.).

Cymindis humeralis F. s. Dz. (Fritzen), Caporn. Haide (Ltz.), Rauschen (Star.).

C. axillaris F. wird von Kug. angeführt, ist aber bisher nicht wieder gefunden.

C. angularis Gyll. s. Ludwigsort bei Kbg. (Sauter, Künow).

C. macularis Dej. n. h. Hlgbl. (Seydl.), Ragnit am Rombinusberge (Stf.), Rauschen (Ltz.), Neustadt (Fritzen), Heub. (Helm).

C. vaporarium L. n. h. Rauschen (Ltz.), Putziger Stadtwald (Stf.), Neustadt (Fritzen). Pr. Stargardt (Schmidt), Bohnsack (Helm).

Masoreus Wetterhallii Gyll. s. Tuchelsche Haide (Sieg.), Rauschen, Schwarzort unter Steinen und Brettern auf Sandboden (Ltz., Eld.). Neustadt (Fritzen), Dz. (Czw., Helm), Memel (Stnr.).

Loricera pilicornis F. h. unter abgefallenem Laube und im Moose.

Panagaeus crux major n. s. Kbg. Pregeldamm unter Steinen (Ltz.).

P. quadripustulatus St. s. Dz. (Sieg.).

Chlaeniuss spoliatus Rossi s. s. Ggbg. (Kr.), Elbing (Hennig).

C. vestitus Pk. s. Kbg. Teichufer bei Lauth unter Steinen (Ltz.), Kollebekken bei Dz. (Fritzen).

C. Schrankii Dft. s. am Ufer des frischen Hafses bei Bodenwinkel, Elbing, Vogelsang (Dommer), Heub. (Fritzen).

C. tibialis Dej. n. s. Dz. Ottominer Wald an einer sumpfigen Stelle (Dommer), Radauneufer (Helm), Nogatufer bei Kitzn. (Czw.).

C. nigricornis F. mit var. *melanocornis* Dej. h. an feuchten Usfern unter Steinen.

C. sulcicollis Pk. einmal bei Rauschen zahlreich (Ltz.), sonst s., Dünen bei Heub. (Fritzen, Czw.).

C. holosericeus F. n. s. an denselben Stellen.

C. caelatus Web. s. s. Neukuhren (Eld.), Heub. (Fritzen).

C. quadrifasciatus Ill. s. auf Moorwiesen, Damminhof, Spittelhof (Eld.), Caporn. Haide (Ltz. Stnr.).

Oodes helopiooides F. n. s. auf den Weichselkämpfen unter Laub (Fritzen), Kbg. (Ltz.).

Licinus depressus Pk. n. h. Dz. (Czw.), Braunsbg. (Sieg.), Fuchshösen (Ltz.), an Waldrändern bei Oliva (Fritzen), Hlgl. (Stnr.).

Badister unipustulatus Bon. s. Seestrand bei Steegen (Dommer), Neustadt (Fritzen).

B. bipustulatus F. mit var. *laceriosus* St. n. s. im ausgeworfenen Röhricht an Teichen und Wiesen (Ltz.).

B. humeralis Bon. s. Grebbiner Wald und an Weidenstümme in dessen Nähe (Dommer).

B. peltatus Pz. n. s. an Ufern (Dommer), im ausgeworfenen Röhricht (Ltz.).

Brevis cephalotes L. h. im Sande unter Steinen u. Brettern in selbstgegrabenen Höhlen.

Micodera arctica Pk. s. s. überwintert im Kiefernwalde in nach Norden gelegenen Ab-

hängen, deren Sandboden mit dünnem Moose bekleidet ist. Ein glänzendes Pünktchen zeigt den in einer Höhle ruhenden Käfer. Putzig (Stf.), Brösens (Dommer), Caporn. Haide (Ltz.), Neustadt an tristen Bergabhängen (Fritzen).

Pogonius chalceus Marsh. *halophilus* Nico. s. s. am Weichselufer bei Käsemark (Dommer).

Patrebus excavatus Pk. n. h. Neustadt unter Steinen u. in Moos an feuchten Stellen (Fritzen), Neuhausen (Stnr.).

Sphodrus leucophthalmus L. s. in Ställen u. Kellern bei Bückern (Fritzen), Kbg. (Czw.). Im Keller in Katzn. fand Czw. ein Stück mit doppelt so breitem Halssch. als gewöhnlich unter mehreren normalen.

S. inaequalis Pz. *terricola* Hbst. s. dselbst.

Calathus cisteloides Illig. n. s. in Wäldern unter *Erica vulgaris* (Ltz.).

C. flavipes Fourc. *fulvipes* Gyll. g. daselbst.

C. fuscus F. g. ebenso.

C. melanoccephalus L. h. unter Steinen, an Baumwurzeln; die var. *ochropterus* Dr. s. Dz. (Helm).

C. micropterus Dft. h. mit *flavipes*.

Taphria rufalis Pz. n. s. Neustadt unter Steinen an Bergabhängen (Fritzen), Samland. Strand (Ltz.).

Dolichus flavicornis F. im Norden der Prov. s. auf einem lehmigen Brachsfelde bei Gr. Zünder (Dommer); im Süden weniger selten, Ggbg. (Kr.).

Anthonomus livens Gyll. s. Kbg. (Ltz.), Memel (Stnr.).

A. prasinus Thunb. h. unter Steinen und an Baumwurzeln.

A. albipes F. n. s. an der Weichsel (Fritzen), Ufer des Rauschener Teichs (Ltz.).

A. oblongus F. n. s. in Stubben an sumpfigen Stellen (Fritzen), Kbg. (Ltz.).

A. marginatus L. n. s. an schlammigen Teichufern, Lauth, Rauschen (Ltz.).

A. impressus Pz. n. h. Tilsit am Memeler ufer unter Weiden (Nanke), am Lauthschen Teiche im Kiessande (Ltz.).

A. sexpunctatus L. h. unter Steinen und im Grase.

A. ericeti Pz. in Wäldern unter Moos überwinternd (Dommer), bei Kbg. auf einer Pregelwiese bei Horst im Frühjahr zahlreich mit grosser Schnelligkeit umherlaufend (Kuwett).

- A. parumpunctatus* F. h. in Feld u. Wald.
A. gracilipes Dft. elongatus Dej. h. unter Tang am Seestrande (Ltz.).
A. lugens Dft. s. Putzig (Stf.), Neustadt an feuchten Waldstellen (Fritzen).
A. viduus Pz. (grünlich) moestus Dft. (schwarz) s. h. an feuchten Waldstellen; die var. *emarginatus* Gyll. s. auf Pregelwiesen (Czw.).
A. versutus St. s. Neuhausen (Stnr.).
A. dolens Sahib. s. Dz. (Stf.).
A. micans Nicol. s. Kbg. (Ltz.)
A. setulus Dej. s. Cranz unter Seetang (Ltz.), Higbl. (Stnr.).
A. piceus L. *picipes* F. h. am Seestrande unter Tang.
A. gracilis Gyll. s. an Flussufern (Fritzen).
A. fulliginosus Pz. n. s. wie piceus.
A. puerulus Dej. *peliduus* Pk. n. s. Putzig (Stf.), Nordstrand des Samlandes (Ltz.), Ktzn. (Czw.).
A. quadripunctatus Deg. s. Seestrand unter Tang (Ltz., Stnr.).
Olisthopus rotundatus Pk. s. Rauschen (Ltz.), Dz. (Czw.), Memel (Stnr.).
Stomis pumicatus Pz. s. an feuchten Waldstellen unter Steinen (Fritzen), Kbg. einmal mehrfach im botan. Garten (Czw.), F. F. (Stnr.).
Feronia (Pterostichus) punctulata F. n. s. Kbg. (Ltz.).
F. cuprea L. g. auf Aekern.
F. versicolor St. *pauciseta* Thoms. n. h. Kbg. (Czw.).
F. dimidiata Oliv. s. Striesser Feld bei Dz. unter Steinen (Dommer), Nordenbg. (Andersch).
F. lepida F. n. s. mit cuprea. Rauschen (Ltz.).
F. subcoerulea Quens. s. Glettka (Czw.), Dz. (Helm), von Dommer fälschlich als *puncticollis* Dej. aufgeführt.
F. picimana Dft. s. Dz. in einem Pilzenhaufen (Dommer). Kbg. Putzig am Seestrande (Stf.), Warnicken (Eld., Ltz.).
F. vernalis Pz. *crenata* Dft. g.
F. aterrima Pk. n. s. Neuhäuser, Rauschen (Ltz., Stnr.).
F. nigra Schall. h. unter Steinen.
F. vulgaris L. *melanaria* Ill. h. ebenso.
F. nigrita F. h. var. *Rhaetica* Heer. Ggbg. (Kr. Schaum K. D. I. 457. 15).
- F. anthracina* Illig. h. unter Steinen.
F. gracilis Dej. n. h. Kbg. (Ltz.), Neuhäuser (Stnr.).
F. minor Gyll. n. h. ebenso.
F. strenua Pz. *erythropus* Marsh. g.
F. diligens St. *strenua* Er. g.
F. oblongopunctata F. n. s. in Wäldern unter Laub und im Moose.
F. angustata Dft. s. Neustadt (Fritzen); Putzig, Braunsbg. (Stf.), Dz. (Helm).
F. aethiops Pz. n. h. Ottominer Wald in Eichenstubben (Dommer), Warnicker Forst (Ltz.), Dzer Nehrung (Fritzen).
F. fasciatopunctata Croutz. nur einmal in Pr. gefangen (Illig. Magaz. I. p. 58), seitdem nicht wieder.
F. (Abax) carinata (Dft.) s. Belschwitz (Kr.).
F. ovalis s. Angerburg (Fritzen).
Amara concinna Zimm. *lepidia* Er. s. s. Neustadt (Fritzen).
A. tricuspidata Dej. s. Putzig (Stf.).
A. strenua Zimm. s. Dz. (Czw.), Samland. Strand (Ltz.), Neustadt (Fritzen).
A. plebeja Gyll. n. s. unter Steinen. Kbg. (Ltz.), Dz. (Dommer).
A. similata Gyll. ebenso.
A. ovata F. *obsoleta* Dej. Dz. auf lehmigen Feldern (Dommer).
A. nitida St. s. Sandgruben bei Ludwigsort (Sauter).
A. communis Pz. g. Ich mache aufmerksam auf die sehr ähnliche *continua* Thoma. Dtsch. Ent. Ztschr. XX p. 183 u. 307.
A. lunicollis Schiöd. *vulgaris* Pz. h.
A. curta Dej. s. Neustadt (Fritzen).
A. trivialis Gyll. g.
A. spreta Dej. n. h. Neuhäuser (Ltz., Stnr.).
A. famelica Zimm. *contrusa* Schiöd. s. Neustadt (Fritzen).
A. acuminata Pk. n. s. Kbg. (Ltz.).
A. familiaris Dft. g.
A. lucida Dft. *gemina* Zimm. n. s. am Seestrande (Ltz.).
A. tibialis Pk. h. ebenda.
A. ingenua Dft. s. Neustadt (Fritzen), Kbg. (Ltz.).
A. municipalis Dft. s. Kbg. (Ltz.).
A. Quensellii Schh. s. s. Dz. (Sieb.).
A. silvicola Zimm. *maritima* Schiöd. n. s. Putzig (Stf.), Weichselmünde (Helm, Czw.), Cranz

17), öfters bei Schwarzort zwischen den
Eisengräsern s. h. (Ltz.).

A. rufocincta Dej. s. s. Schaum K. D. I.
p. 647.

A. infima Dft. n. h. am Samländ. Strand
(Ltz.).

A. brunnea Gyll. s. s. Dz. (Sieb.).

A. aulica Pz. *picea* Er. h. unter Steinen.

A. convexiuscula Marsh. s. Dz. Weichsel-
mündē (Helm).

A. torrida Illig. nach dessen Bericht (K. Pr.
173. 42) von Kug. einmal gefangen, nachher
nicht wieder. Illiger verbindet damit als var.
alpina Pk., jedoch ist das Vorkommen beider
Käfer in Pr. sehr zweifelhaft, sie sind hochnordisch.

A. consularis Dft. s. Kbg. (Ltz.).

A. fulva Dij. *ferruginea* Pk. n. s. Die
var. *tridipennis* Heer. s. bei Gedingen am
Meeresstrande. Mai (Dommer).

A. apricaria Pk. h. unter Steinen.

A. patricia Dft. n. s. Kbg. (Ltz., Stnr.).

Diachromus germanus L. s. Kbg. (Ltz.)

Dichrotrichus pubescens Pk. s. Putzig einige-
mal unter Tang (St.).

D. rufithorax Sahlb. n. h. Kbg. unter Stei-
nen vor dem Brandenburger Thor (Czw.).

D. lacustris Redt. s. Dz. (Helm).

Anisodactylus signatus Ill. s. Dz. (Fritzen.
Czw.).

A. binotatus F. mit var. *spurcatoriensis*
Dij. h. im Frühjahr auf gedüngten Aekern (Ltz.).

A. nemorivagus Dft. n. h. Neustadt (Fritzen).

Harpalus punctatulus Dft. s. Dz. Katzn.
(Czw.).

H. azureus F. s. auf Lehmboden, Dz. (Dom-
mer, Frantz.).

H. puncticollis Pk. s. Gr. Zündler in einem
lehmigen Graben (Dommer), Dammhof (Stnr.).

H. brevicollis Dej. s. auf Lehmboden, Dz.
(Sieb.).

H. ruficornis F. g. unter Steinen.

H. griseus Pz. h. ebenso.

H. calceatus Dft. n. h. Neustadt im Herbste
auf Feldern (Fritzen), Schwarzort (Ltz.), Pr.
Margardt (Schmidt), Dz. (Czw.).

H. ferrugineus F. s. bei Ludwigsort am
Nischen Hause, Kahlberg (Ltz.), Neustadt (Fritzen),
Oliva (Czw.).

H. honestus Dft. *ignavus* Dft. n. h. Conix
(Sieb.), Heub. (Czw., Helm).

H. distinguendus Dft. n. h. Prübbernen
(Schindowski).

H. aeneus F. in allen Farbenvariétäten g.

H. discoideus F. s. Schwarzort (Ltz.), Pr.
Stargard (Schmidt).

H. rubripes Dft. s. Lyck (Sanio).

H. latus L. s. h. am Nordstrande von Sam-
land (Ltz.).

H. luteicornis Dft. s. Neustadt (Fritzen).

H. quadripunctatus Dej. s. Pelonken, Ca-
dinen (Dommer, Helm).

H. fuliginosus Dft. s. s. in den Dünen von
Glettkau, Juli (Czw.).

H. neglectus Dej. s. Neustadt (Fritzen).

H. melancholicus Dej. s. Dz. unter Steinen
auf Saatfeldern (Dommer), Glettkau (Czw.).

H. tardus Pz. n. s. wie latus.

H. Frölichek St. n. h. Samländ. Strand
(Ltz.), Dz. (Dommer).

H. serripes Quens. s. Neustadt auf sandi-
gen Feldern (Fritzen).

H. hirtipes Pz. n. h. auf Sandboden, Allen-
stein (Eld.).

H. impiger Dft. s. Kbg. (Ltz.), Pr. Stargard
(Schmidt).

H. servus Dft. n. s. Neustadt (Fritzen), Kbg.
(Ltz.).

H. anxius Dft. n. h. Ludwigsort (Ltz.), Neu-
stadt (Fritzen).

H. picipennis Dft. *vernalis* F. h. in Sand-
gruben, Ludwigsort (Ltz.).

Stenolophus vaporariorum F. s. Rauschen
(Ltz.).

S. vespertinus Illig. n. s. Kbg. (Ltz.).

Acupalpus flavicollis St. n. s. Kbg. (Ltz.),
Dz. (Dommer).

A. dorsalis F. g. unter Laub.

A. brunnipes St. s. Gbg. (Kr.), F. F. (Stnr.).

A. exiguus Dej. n. s. unter Laub. Kbg.
(Sauter, Ltz.) Dz. (Helm).

A. meridianus L. n. s. Kbg. (Ltz.).

A. consputus Dft. ebenso.

Bradyceillus cognatus Gyll. s. Dz. (Czw.).

B. placidus Gyll. n. s. Kbg. (Ltz.).

B. collaris Pk. n. s. Blaustein (Ltz.), Pr.
Stargard (Schmidt).

B. similis Dej. n. h. Neustadt an tristen
Bergabhängen unter Moos (Fritzen).

Trechus discus F. n. h. Rhedafluss bei Neu-
stadt (Fritzen), Schwarzort (Ltz.), Dz. Wölke-

kämpfen unter Weidenblättern, Gr. Zündler unter Schilf (Dommer), Kbg. Neue Bleiche (Czw.).

T. micros Hbst. Ggbg. (Kr.).

T. rubens F. paludosus Gyll. s. Ufer der Pengau bei Leesen (Dommer), Cranz (Ltz.), Kbg. Pregelwiesen (Czw.).

T. palpalis Dej. s. Kbg. (Sauter).

T. rivularis Gyll. s. s. Belschwitz (Kr.), Cranz (Ltz.).

T. minutus F. s. h. am Strandte unter Tang.

T. obtusus Er. s. Neustadt (Fritzen).

T. secalis Pk. s. h. wie minutus.

Perileptus areolatus Creutz. s. s. Rastenbg. (Czw.).

Tachys nanus Gyll. s. wie Tr. obtusus.

Bembidion quinquestriatum Gyll. s. Ggbg.

B. obtusum St. s. Kbg. (Sauter), Ggbg. (Kr.).

Dz. (Helm).

B. Mannerheimii Sahlb. unicolor Chaud. s. Schrb., F. F. (Czw., Star.).

B. guttula F. s. h. an sandigen Ufern zwischen Schilf.

B. biguttatum F. g. Ich mache aufmerksam auf das sehr ähnliche B. inoptatum Schaum (Seidl. Fn. Balt. p. 36).

B. assimile Gyll. h. wie guttula.

B. fumigatum Dft. s. Lyck (Sanio).

B. quadrimaculatum L. s. h. auf Lehmboden.

B. quadriguttatum F. n. s. Kbg. (Ltz.).

B. humerale St. pulchrum Gyll. s. Fischhausen (Ltz.).

B. articulatum Pz. n. s. Kbg. (Ltz.).

B. Doris Pz. n. s. zwischen den Wurzelrasern von Sagittaria (Kug.), Kbg. (Ltz.).

B. gillipes St. s. Dz. (Czw. Helm), Neuhäuser (Star.).

B. Schüppellii Dej. s. s. Putziger Stadtwald (Stf.).

B. tenellum Er. s. Dz. (Sieb.).

B. minimum F. pusillum Gyll. s. Hlgb. (Star.).

B. nigricorne Gyll. wird von Sieb. angeführt, von Schaum u. Stf. bezweifelt; wahrsch. war die Bestimmung falsch. Seidl. Fn. Balt. p. 38 stellt es zu pusillum. Fehlt im Catal. von Stein u. Wiese.

B. lampros Hbst. eelere F. velox Er. s. h. in feuchtem Moose, var. felixianum. Heer. s. Dz. (Dommer).

B. bipunctatum L. n. h. Heub. (Fritzen), Kbg. Pregel (Star.).

B. nitidulum Marsh. rufipes Gyll. s. Neustadt (Fritzen), var. alpinum Dej. Dz. (Dommer).

B. saxatile Gyll. wird von Sieb. angeführt, wahrsch. nicht richtig bestimmt; mir unbekannt.

B. Andreae F. femoratum St. g. unter ausgeworfenen Pflanzenresten.

B. rupestre L. Bruxellense Wasm. s. Dz. an der Weichsel und Radaune (Helm).

B. littorale Oliv. rupestre F. n. s. Kbg. (Ltz.).

B. fluviatile Dej. s. an den Seen bei Karthaus (Helm).

B. lunatum Dft. s. Hassstrand bei Bodenwinkel (Dommer), Schwerzort (Ltz.), Weichselmünde (Helm).

B. pallidipenne Illig. n. h. Hassauer bei Pillau (Eld.), Zoppot (Sieb.).

B. splendidum St. s. Neuhäuser (Star.).

B. pygmaeum F. s. Dz. am Weichselufer (Fritzen); var. bilunulatum Bielz. Cranz (Ltz.).

B. dentellum Thunb. undulatum St. s. Schwarzort (Nanke), Kbg. (Ltz.).

B. varium Oliv. n. s. Kbg. (Ltz.).

B. adustum Schaum, fumigatum Dej. s. Wernsdorf (Kuwert).

B. obliquum St. h. Radauneuer (Dommer), Rauschener Teich (Ltz.), Neuhäuser, Menzel (Star.).

B. ruficollis Pz. s. s. Osterode 1795 (Kug.), Heub. (Fritzen), Neufähr u. Zoppot (Helm).

B. punctulatum Drap. aerosum Er. n. h. Loppehnen (Eld.), Rhedafluss b. Neustadt (Fritzen), Rastenbg. (Czw.).

B. laticolle Dft. s. Dz. an der Weichsel (Sieb.).

B. striatum s. Dz. (Fritzen), Ktz. (Czw.).

B. velox L. impressum Pz. s. Schwarzort (Ltz.).

B. argenteolum Ahr. s. ebenso, Ktz. am Nogatuer (Czw.). Die var. azureum Gebl. da-selbst mit der Stammart (Czw.).

B. paludosum Pz. n. s. Weichsel- und Rhedafluss bei Neustadt (Fritzen), Kbg. (Ltz.).

Tachypus caraboides Schrb. s. Lyck (Sanio), Strand b. Broesen (Dommer), Rhedafluss (Fritzen).

T. pallipes Dft. n. s. unter Spreu u. Blättern. Kbg. (Ltz.).

T. flavipes L. s. h. ebenso.

Dytiscidae.

Chemidotus caesus Dft. n. s. Kbg. (Ltz.), F. F. (Star.).

Halipus obliquus F. n. s. Glettka (Czw.), F. F. (Czw., Star.).

H. varius Nicol. s. s. Mühlenteich bei Glettka (Czw.).

H. confinis Steph. *lineatus* Aubé. s. F. F. (Czw.), Lyck (Sanio); merkwürdig ist eine einfarbige var. *concolor*, die Sanio in einzelnen Stücken gefangen hat.

H. variegatus St. n. s. Putzig (Stf.), Kbg. Landgraben (Eld.), Neustadt in den Gräben von Moorwiesen (Fritzen).

H. fulvus Fabr. n. s. Kbg. (Ltz.).

H. impressus Fabr. *flavicollis* St. s. Memel (Star.), in der Badaune bei Pechbude (Dommer), Hassauer bei Margen unter Blättern von *Tussilago* (Ltz.).

H. affinis Steph. *cineratus* Aub. n. h. Putzig (Stf.), Kbg. Landgraben (Eld.).

H. ruficollis Deg. s. h.

H. Heydeni Wehncke s. s. F. F. (Czw.), Memel (Star.).

H. fluvialis Aub. s. im Lyckflusse (Sanio).

H. fulvicollis Er. s. Dz., Neustadt (Fritzen).

H. lineatocollis Marsh. s. Putzig (Stf.), Dz. (Czw.).

Brychius elevatus Pz. s. Kbg. Landgraben, Palmburg (Eld. Ltz.), Memel (Star.), Neustadt im Cedronflüsschen (Fritzen).

Pelobius tardus Ilbst. Hermanni F. 1 St. in einer Lehmpütze März 78 Wernsdorf (Kuwert).

Hyphydrus ovatus L. *ferrugineus* L. h. Damnhof (Ltz.).

Hydroporus reticulatus F. h. ebenso.

H. inaequalis F. h. ebenso.

H. decoratus Gyll. n. h. ebenso.

H. confluens F. s. Heub. (Dommer), Corjliten bei Fischhausen (Ltz.), F. F. einmal zahlreich (Czw.).

H. parallelogrammus Ahr. s. Heub. (Dommer).

H. picipes F. ♀ *lineolatus* Gyll. g.

H. Marklini Gyll. s. Kbg. in Teichen des Landgrabens (Eld.).

H. geminus F. n. s. Ggbg. (Kr.).

H. unistriatus Schrk. n. s. Damnhof (Ltz., Star.).

H. pictus F. n. s. in der Deime bei Goldbach (Ltz.), Neustadt (Fritzen).

H. granularis L. n. s. Dz. (Dommer), Neustadt (Fritzen).

H. bilineatus St. s. Kbg. (Ltz.).

H. latus Steph. *ovatus* St. s. s. in einem Waldtümper bei Ottomün (Dommer), Glettka (Czw.).

H. depressus F. zuw. h. im Uferschlamm. Rauschen, Schwarzort (Ltz., Star.), Karwenbruch bei Neustadt (Fritzen).

H. halensis F. einmal h. bei Belschwitz (Eld.), Loppehnen (Eld.), Dz. (Czw.), Neukuhren (Star.).

H. dorsalis F. s. h. in Moorgräben.

H. oblongus Steph. *nitidus* St. s. s. Heub. (Dommer), Neustadt (Fritzen).

H. rufifrons Dft. n. s. Ggbg. (Kr.).

H. erythrocephalus L. *deplanatus* Gyll. h. Schwarzort, Kapkeln (Ltz.).

H. planus F. n. s. Schwarzort (Ltz.).

H. pubescens Gyll. n. h. Putzig (Stf.), Cranz (Ltz.), Weichselmünde (Helm).

H. fuscipennis Schaum. *picous* St. n. h. Ggbg. (Kr.).

H. discretus Fairm. s. Kbg. am Veilchenberge, F. F. (Czw.).

H. nigrita F. s. Heub. (Dommer).

H. brevis Sahlb. s. Kbg. (Ltz.).

H. melanarius St. s. Schwarzort (Ltz.), F. F. (Star.), Neustadt (Fritzen).

H. elongatus St. s. Schleßdr.

H. tristis Pk. n. s. Ggbg. (Kr.).

H. umbrosus Gyll. n. s. ebenso.

H. obscurus St. s. Neustadt (Fritzen).

H. notatus St. s. ebenso.

H. vittula Er. n. h. Grebbiner Forst (Dommer).

H. palustris L. h. Damnhof (Ltz.).

H. angustatus St. n. h. Neustadt (Fritzen).

H. pygmaeus St. s. Ggbg. (Kr.).

H. lineatus F. h. wie *palustris*.

Noterus crassicornis F. h. ebenso.

N. semipunctatus F. *sparsus* Marsh. n. s. ebenso.

Laccophilus minutus L. *interruptus* Pz. g. h. Damnhof (Ltz.).

L. hyalinus Deg. *obscurus* Pz. h. ebenso.

Colymbetes fuscus L. g.

C. Paykulli Er. n. h. Neuhäuer (Star., Ltz.), Braunsbg. (Sieb.).

C. striatus L. n. s. Sammländ. Strand (Stnr.).
Ltz.

C. pulverosus Steph. s. Saspe bei Dz. (Dommer), Glettikau (Czw.).

C. notatus F. h. Ggbg. (Kr.), Memel (Stnr.).
C. notaticollis Aub. s. Heub. in einem Moortümpel (Dommer), Lyck (Sanio).

C. bistratus Bergstr. s. mit dem vorigen (Dommer), Ggbg. (Kr.), Neuhäuser (Stnr.).

C. adspersus F. h. in den Strandgegenden.
C. collaris Pk. h. ebenso.

C. Grapei Gyll. n. s. Rauschen (Ltz.).

Anm. Was den *C. dolabratus* Pk. betrifft, so ist Elditts Irrthum längst nachgewiesen worden, es war ein etwas kleineres St. von *striatus* ♀. Auch Fritzen Preuss. Käfer p. 52 beschreibt ihn zwar, ist aber den Fundort schuldig geblieben. Der Käfer ist hochnordisch.

Ilybius fenestratus F. n. h. Dammhof (Ltz.).

I. subaeneus Er. n. h. ebenso.

I. fuliginosus F. h. in den Strandgegenden.

I. similis Thoms. s. Kbg. (Czw.), Rauschen (Ltz.).

I. ater Deg. s. h. am Strande.

I. obscurus Marsh. *quadriguttatus* Er. h. ebenso.

I. guttiger Gyll. h. ebenso.

I. acenesens Thoms. n. h. überall noch als *angustior* Gyll. angegeben, der uns fremd und hochnordisch ist. Kraatz Berl. Ent. Ztsch. XV. p. 166. Lentz in der Altpreuss. Monatsschrift XV. p. 360.

Liopeltus agilis F. n. h. Schwarzort (Ltz.).

Agabus fuscipennis Pk. h. am Seestrande (Ltz.), Dammhof (Czw.).

A. maculatus L. n. s. in Büchen unter Steinen. Rauschen (Ltz.).

A. femoralis Pk. n. h. Ggbg. (Kr.), F. F. (Czw.).

A. unguicularis Thoms. s. Kbg. Hufen (Hensche, Tiessen, Czw.), Dz. (Berl. Ent. Ztschr. 1871 p. 107).

A. abbreviatus F. mit *maculatus*, aber seltener; die var. mit verloshener Queerbinde s. Kbg. (Ltz.).

A. Sturmii Gyll. bei Putzig g. (Stf.), sonst n. h.

A. bipunctatus F. n. h. Corjeiten (Ltz.), Braunsb. (Sieb.), Glettikau (Czw.).

A. uliginosus L. n. s. Neustadt (Fritzen).

A. paludosus F. h. in den Strandgegenden, Cranz, Rauschen (Ltz.).

A. congener Pk. ebenso.

A. affinis Pk. s. Ggbg. (Kr.).

A. guttatus Pk. s. Kug. Schießdr.

A. bipustulatus L. h. Kapkeim, Seestrand (Eld., Ltz.).

A. nigroaeneus Er. s. Lyck in der Milchbuder Forst (Sanio).

A. chalconotus Pz. s. Grebbiner Wald (Dommer), Pregel bei Palmburg (Eld.).

A. neglectus Er. s. Dz. am Strande (Dommer, Frantz.).

A. subtilis Er. s. Ggbg. (Kr.), F. F. (Czw.).

Cybister Roesseli F. bei Betschwitz h. (Eld.), sonst einzeln, Schwarzort (Ltz.), Dz. In der Weichsel (Sieb., Helm), Liebschauer See bei Dirschau (Czw.).

Dytiscus latissimus L. in mehreren Masurischen Seen h., im Norden s. (Eld.).

D. marginalis L. ♀ var. *conformis* Kunze s. h.

D. circumcinctus Ahr. n. s. Dammhof (Ltz., Stnr.), die var. *dubius* Gyll. s. s. Putzig (Stf.).

D. circumflexus F. s. in Gesellschaft der vorwandten Arten, Dz. (Dommer).

D. lapponicus Gyll. im Dammhofer Teich h., sonst s. Braunsbg (Sieb.), in den Karthauser Seen (Fritzen).

D. punctulatus F. n. h. im Herbst in Gräben Neustadt (Fritzen), Dz. (Sieb.).

D. dimidiatus Bergstr. s. Weststr. v. Samland (Nanke), Dammhofer Teich (Ltz.), Ktsn. (Czw.), Hlgbl. (Stnr.).

Hydaticus bilineatus Deg. s. Heub. (Dommer), Dammhof (Stnr.).

H. zonatus Pz. n. s. ebenso.

H. piciventris Thoms. s. s. 1 St. ♀ Ggbg. (Kr. Berl. Ent. Ztschr. XV. 168 cf. XVII. 225.)

H. cinereus L. s. in stehenden Gewässern (Dommer), Pregel bei Palmburg (Eld.), Neuhäuser (Stnr.).

H. austriacus St. s. mit *bilineatus* (Dommer).

H. Hybneri F. h. Rauschen (Ltz.).

H. transversalis Pontopp. n. h. Dammhof (Ltz.).

H. stagnalis F. s. ebenso.

Gyrinus concinnus Klug. im Festungsgraben von Dz. und in der Radaune s. h. (Fritzen, Helm).

- G. minutus** F. n. s. Heub., Putzig (Sieb.), Dammhof (Stnr.).
G. natator L. mergus Ahr. g.
G. bicolor Pk. s. in der Drewenz bei Strasburg in Westpr. (Stf.).
G. columbus Er. s. Kbg. (Ltz.).
G. Suffriani Serib. Kbg. (Czw.).
G. marinus Gyll. n. s. Elbing (Ltz.), Dammhof (Stnr.).
G. opacus Sahlb. n. s. Lyck (Sanio), Memel (Stnr.), Glettka (Czw.).
Oretochilus villosus F. n. s. ein nächtliches Thier, in der Weichsel (Dommer), in d. Alle bei Heilsbg. u Schippenbeil (Andersch). Putzig (Stf.).
Hydrophilus piceus L. stellenweise h. Lyck 1875 (Sanio), im Norden s. s.
H. aterrimus Eschsch. n. s. in krautreichen Wassergräben, Kbg. (Ltz.).
Hydroua caraboides L. n. s. in den Strandgegenden.
H. flavipes Stev. s. Loppehnen, Cranz (Eld.), Belschwitz (Eld.), Ktzn. (Czw.).
Hydrobius oblongus Hbst. s. Dz. auf einer sumpfigen Wiese von Wasserpflanzen geschnitten (Dommer), Ggbg. (Kr.).
H. fusipes L. g.
H. bicolor Pk. n. s. Dammhof (Ltz.).
H. globulus Pk. h. daselbst.
Phillydrus testaceus F. h. daselbst.
P. melanoccephalus Oliv. h. ebenso.
P. nigricans Zett. frontalis Er. n. h. ebenso.
P. maritimus Thoms. s. Ktzn. (Czw.), Dz. (Helm), Kbg. (Stnr.).
P. marginellus F. marginatus Dr. ovalis Thoms. g.
Helocares lividus Forst griseus F. n. s. Dammhof (Ltz.).
Laccobius sinuatus Motsch. nigriceps Thoms. in Blüchen unter Steinen n. s. Kbg. (Ltz.), Ktzn. Schrb. (Czw.).
L. bipunctatus Thoms. h. Kbg. (Sauter, Czw., Ltz.).
L. minutus L. n. h. Kbg. (Ltz.).
L. alutaceus Thoms. s. Schrb. (Czw.).
Beroeus luridus L. h. Dammhof (Ltz.).
B. aericeps Curt. s. Ggbg. (Kr.).
Limnebius truncatellus Thunb. s. h.
L. papposus Muls. s. Kbg. (Czw.).
L. truncatulus Thoms. n. s. Kbg. Landgraben (Czw.).

- L. nitidus** Marsh. n. h. Ktzn. (Czw.)
L. atomus Dr. minutissimus Germ. s. Dz. (Sieb.), Neustadt (Fritzen).
Cyathidium seminulum Pk. s. h. im Uferschlamm u. unter Steinen.
Sperchous emarginatus Schall. n. s. Kbg. Lizentgraben (Sauter).
Helophorus nubilus F. h. in Conserven. Dammhof (Ltz.).
H. tuberculatus Gyll. s. unter ausgeworfenem Seegras, Neuhäuser (Ltz.), Brösen (Helm); einmal bei Rauschen zahlreich (Ltz.).
H. arvernicus Muls. s. s. Kbg. im Festungsgraben am Brandenburger Thor (Czw.).
H. aquaticus L. grandis Illig. s. h. in Wiesengräben.
H. granularis L. g.
H. griseus Hbst. g.
H. obscurus Muls. aeneipennis Thoms. s. Neustadt (Fritzen).
H. nanus St. s. ebenso.
H. pumilio Er. n. s. ebenso.
Hydrochus elongatus Schall. g. Dammhof (Ltz.).
H. carinatus Germ. g. ebenso.
H. brevis Hbst. n. s. ebenso.
Ochthebius gibbosus Germ. n. h., einmal zahlreich gefangen bei Ktzn. (Czw.).
O. marginipallens Latr. n. h. Schrb., Pregelwiesen (Czw.).
O. pygmaeus F. g.
O. bicolor Germ. s. in Waldbüchinen unter Steinen, Putzig, Neustadt (Stf.), Neuhausen (Stnr.).
O. rufomarginatus Er. s. Kbg. Pregel-damm, Neue Bleiche (Czw.).
O. soveolatus Germ. s. Neuhäuser unter Seetang (Ltz.).
Hydractis palustris Er. s. einmal bei Heub. von Riedgras geschöpft (Stf.), Kbg. (Stnr.), Blaustein (Ltz.).
H. riparia Kugel. n. s. im Bacho bei Loppehnen (Eld.), Putzig, Neustadt, Dz. (Stf.).
H. angustata St. s. Neustadt in Waldbüchinen (Fritzen).
H. gracilis Germ. s. Memel in der Dange (Stnr.).
H. pulchella Germ. Schrb. an einem Wiesenbach (Czw.).
Cyclonotum orbiculare F. h. im Uferschlamm und unter Steinen. Dammhof (Ltz.).

Sphaeridium scarabaeoides L. g. in frischem Rinderdünger.

S. bipustulatum F. mit var. *marginatum* F. ebenso.

Cercyon obsoletus Gyll. n. s. im Dünger, Kbg. (Stnr.), Loppehnen (Eld.), Dz. Cranz unter Seetang (Stf.).

C. haemorrhoidalis F. n. s. in fetter Erde Kbg. (Ltz.).

C. haemorrhous Gyll. ebenso.

C. lateralis Marsh. s. Ggbg. (Kr.), Kbg. nasse Garten (Czw.), Fuchshöfen (Stnr.).

C. flavipes F. g.

C. palustris Thoms. s. Kbg. Pregelwiesen (Czw., Stnr.).

C. littoralis Gyll. n. s. am Meeressufer, Dz. (Dommer), Sämländ. Strand (Ltz.), Memel (Stnr.).

C. unipunctatus L. n. s. Kbg. (Ltz.).

C. quisquilius L. h. Loppehnen (Eld.).

C. melanocephalus L. n. h. Kbg. (Ltz.).

C. pygmaeus Illig. h. ebenso.

C. terminatus Marsh. *plagiatus* Er. s. im Pferdedünger, Dz. (Dommer).

C. centrimaculatus St. h. im Rinderdünger, Loppehnen (Eld.), Putzig (Stf.).

C. minutus F. s. h. ebenso.

C. lugubris Pk. n. s. am Rande von Gewässern, Neustadt (Fritzen).

C. analis Pk. h. im Schlamm und in fetter Erde, Kbg. (Ltz.).

C. granarius Er. s. ebenso, Dz. (Helm), Neustadt (Fritzen).

C. pulchellus Heer. s. Kbg. Plantage (Stnr.).

Megastrum bolitophagum Kr. s. in faulenden Pflanzenstoffen Putzig (Stf.), Schrb. (Czw.).

Cryptopleurum atomarium F. g. im Dünger.

Staphylinidae.

Autalia impressa Oliv. s. in Blätterpilzen, Dz. (Dommer), Warnicken (Stnr., Ltz.).

A. rivularis Grav. n. s. Blaustein (Ltz.), am Pregelufer (Stnr.).

Falagria thoracica Curt. n. h. Pillau (Sauter), Neuhäuser (Ltz.).

F. sulcata Pk. n. s. unter faulenden Gewächsen (Kug.), Kbg. (Ltz.).

F. sulcatula Grav. n. s. an Wasserrändern, Haffstrom (Eld.).

F. obscura Grav. n. s. Putzig (Stf.).

F. nigra Grav. n. s. wie *sulcata*.

Bolitochara lunulata Pk. n. h. in Blätterpilzen.

B. obliqua Er. s. Kbg. an Baumschwämmen auf dem Kneiph. Kirchhof (Stnr., Ltz.), auf Holzwiesen (Czw.).

Phytos balticus Kraatz s. s. Glettka (Czw.).

Silusa rubiginosa Er. n. h. Kbg. (Ltz.).

Oculea castanea Er. s. Conitz (Sieb.).

O. badia Er. n. h. Nodems am Sämländ. Weststrande (Ltz.). Kbg. Poln. Kirchhof (Czw.).

Ischnoglossa prolixia Grav. s. s. Dz. (Kumm.).

I. corticina Er. s. Kbg. (Ltz.).

Leptusa analis Gyll. s. F. F. unter *Carpinus*-rinde (Czw.).

L. fumida Er. s. Dz. (Kumm.).

L. ruficollis Er. n. h. Dz., Kbg. (Czw., Stnr.).

Thiasophila angulata Er. s. h. unter Ameisen, Putzig (Stf.).

T. inquiline Märk. s. Loppehnen (Eld.).

Homocusa acuminata Märk. wird von Zebe in lit. aus Dz. angegeben; ist aber noch zu bezweifeln.

Microglossa (Haploglossa) gentilis Lünem. n. s. an Eichenwurzeln unter Ameisen, Kbg., Moosbude (Pfell, Ltz.).

M. pulla Gyll. n. h. Dz. unter Steinen (Dommer).

M. rufipennis Kraatz. s. Kbg. (Sauter).

M. praetexta Er. n. h. Kapelmi (Ltz.), Ktzn., Dz. (Czw.), Neuhausen (Stnr.).

Aleochara fusicipes Grav. n. s. unter Steinen, im Dünger und bei Aescern (Kug.), Georgenswalde (Ltz.).

A. curta Sahlb. *fumata* Er. s. Kbg. aus Moos (Sauter).

A. brevipennis Grav. n. s. Ggbg. (Kr.).

A. bipunctata Oliv. n. h. in sandigen Gegen den unter Dünger (Kug.), Cranz (Ltz.).

A. morion Grav. s. Kbg. (Ltz.).

A. puberula Klug. s. s. Ktzn. in einem Stalle (Czw.).

A. crassiuscula Sahlb. s. Kbg. (Czw.).

A. tristis Grav. *nigripes* Mill. n. s. Kbg. (Ltz.).

A. bisignata Er. n. s., unter faulendem Holz (Kugel.), Kbg. (Ltz.).

A. brunneipennis Kr. s. Kbg. (Ltz.), von Lindenblüthen geklopft Glettka (Czw.).

- 22
- A. rufula* Heer. s. Kbg. (Ltz.).
A. lanuginosa Grav. n. s. Kbg. (Ltz.).
A. villosa Mannh. s. in Taubennestern,
Dz. (Dommer).
A. mycetophaga Kr. n. h., Loppehnen
(Eld.), Kbg. (Ltz.).
A. moerens Gyll. n. s. Fischhausen (Ltz.),
Dz. (Dommer).
A. moesta Grav. h. an Exrementen, Kbg.
(Ltz.).
A. bilineata Gyll. n. s. ebenso.
A. nitida Gray. h. ebenso.
A. binotata Kr. h. Loppehnen (Eld.), in den
Dünen von Glettkau (Czw.).
A. obscurella Grav. s. Dz. am Seestrande
(Dommer), Glettkau (Czw.).
Dinarda Märkelil Kow. n. s. in Ameisen-
nestern, Putzig (Stf.), F. F. (Stnr.).
D. dentata Grav. viel seltener an gleichen
Orten (Stf.), Kbg. Wilkie (Sauter).
Atemelus paradoxus Grav. s. bei Ameisen,
Putzig (Stf.), Rauschen (Ltz.).
A. emarginatus Grav. n. h. Putzig (Stf.),
Ludwigsort in Sandgruben (Sauter).
Lomchusa strumosa Fabr. einmal bei Kbg.
unter Ameisen zahlreich (Sauter), sonst s. Dz.
(Dommer), Rauschen (Ltz.).
Myrmecaria collaris Payk. n. s. unter mo-
derndem Laube, im Garten von Margen (Ltz.);
an Schwämmen unter der Rinde abgestorbener
Blüme (Kugel).
M. humeralis Grav. s. Blaustein (Ltz.).
M. cognata Märk. s. Rosenau bei Kbg. (Ltz.),
Dz. (Helm).
M. funesta Grav. s. in Pilzen bei Dz. (Stf.),
Vierbrkr. (Stnr.).
M. limbata Pk. n. s. Kbg. (Ltz.).
M. lugens Grav. s. Dz. (Sieb.).
M. laticollis Märk. s. Loppehnen (Eld.),
Dz. (Helm), Vierbrkr. (Stnr.).
M. canaliculata Fabr. s. h. unter Steinen.
Hyobates nigricollis Pk. s. unter Steinen
im Putziger Stadtwald (Stf.), Schwarzort (Ltz.),
Glettkau (Czw.).
I. forticornis Lac. s. s. Ktzn. unter faulen-
den Pflanzen (Czw.).
Caledora nigrita Mannh. n. h. in Wäldern,
Dz. (Dommer), Ggbg. (Kr.).
C. utiliginosa Er. n. h. Ktzn. (Czw.).
C. riparia Er. s. Kbg. am Pregel (Sauter, Czw.).
C. aethiops Grav. s. Dz. (Dommer).
C. umbrosa Er. s. wie riparia.
Chilopora rubicunda Er. s. Dz. (Dommer),
Neue Bleiche (Czw.).
Tachysa constricta Er. n. h. Ktzn. am
Nogatufer, Kbg. Neue Bleiche, Neuhausen (Czw.,
Stnr.).
T. coarctata Er. h. Dz. am Seestrande
(Dommer), Heilsberg am Alleeufer (Ltz.), Rasten-
burg Guberufer, Ktzn. Nogatufer (Czw.).
T. scitula Er. s. Rauschen (Ltz.). Die An-
gabe von Dommer war unrichtig, es war Ho-
malota puncticeps Thoms. (Czw.).
T. flavitarsis Sahlb. chalybea Er. s. Ktzn.
Rastenbg. (Czw.), Dz. (Dommer).
T. umbratica Er. s. Dz. aus Moos (Dommer).
T. atra n. s. Kbg. (Ltz.).
T. concolor Er. s. Ktzn. am Nogatufer,
Kbg. Pregelufer (Czw.).
Ocyusa maura Er. s. Kbg. (Sauter, Stnr.,
Czw.).
O. picina Aubé s. Ktzn. (Czw.).
Oxyopoda ruficornis Gyll. n. s. in Schwäm-
men u. unter abgefallenem Laube, Putzig, Dz.,
Elbing (Stf.). Die var. spectabilis Märk. bei
Ggbg. (Kr.).
O. lividipennis Mannh. luteipennis Er.
überall h.
O. vittata Märk. s. Kbg. (Sauter).
O. humidula Kr. umbrata Er. s. Ggbg.
(Kr.).
O. opaca Grav. überall h.
O. funebris Kr. s. Ggbg. (Kr.), F. F. (Czw.).
O. longiuscula Er. n. s. Kbg. (Ltz.).
O. lentula Er. s. Ktzn., Schrb. (Czw.).
O. umbrata Gyll. n. s. Ggbg. (Kr.).
O. cuniculina Er. s. Kbg. (Ltz.).
O. togata Er. h. daselbst.
O. abdominalis Sahlb. s. Dz. (Kumm.).
O. testacea Er. s. Sieb.
O. alternans Grav. n. s. Dz. am Meeres-
strande und aus Moos (Dommer), Kbg. (Ltz.).
O. exoleta Er. n. h. Dz., Kbg. (Sauter,
Czw.).
O. incrassata Rey s. F. F. (Czw.).
O. formicetica Märk. n. h. in Ameisen-
haufen, Kbg. (Dommer, Ltz.).
O. haemorrhoa Sahlb. myrmecophila
Märk. ebenso, Putzig (Stf.).
O. amoena Fairm. s. Glettkau (Czw.).

O. terrestris Kr. wie *incrassata*.

O. rufescens Kr. s. Kbg. (Czw.).

O. annularis Sahib. s. Ggbg. (Kr.).

O. brachyptera Steph. *ferruginea* Er. s.

Schrb. (Czw.)

Homalota. Der Uebersichtlichkeit wegen werde ich die sehr bedeutende Menge der Species (97) in alphabetischer Reihenfolge aufzählen.

H. aequata Er. n. s. Kbg. (Sauter, Ltz., Stnr.).

H. analis Grav. g. unter Blättern u. im Moose.

H. anceps Er. h. am Meeresstrande (Dommer, Ltz.).

H. angusticollis Thoms. s. Schrb. in Pilzen (Czw.), nach Eppelsh. ♀ von ravilla.

H. angustula Gyll. h. Dz. (Frantz.), Kbg. (Ltz.).

H. aterrima Grav. n. s. Kbg. (Ltz.).

H. atramentaria Gyll. n. s. Kbg. Pregelwiesen, Glettka im Kuhdüniger (Czw.).

H. atricolor Sharp. *mortuorum* Sharp. s., wie *angusticollis*.

H. endaverina Bris. ebenso.

H. cauta Er. *parvula* Mannh. s. Kbg. (Sauter).

H. eavifrons Sharp. s. F. F. (Stnr. Czw.).

H. celata Er. n. s. Loppehnen (Eld.), Kbg. (Ltz.).

H. cinnamomea Grav. s. am ausgeflossenen Eichensaft Dz. (Dommer); Neuhausen, Memel (Stnr.).

H. circellaris Grav. unter Ablesrinde g.

H. coriaria Kr. n. h. Kbg. (Ltz.).

H. cuspidata Er. unter Rinden s. h.

H. debilis Er. s. im Röhricht am Pregel-damm (Ltz.).

H. deceptans Sharp. s. Schrb., F. F. (Czw.), nach Eppelsh. ♀ zu *analys* gehörig.

H. deformis Kr. n. h. Pregelwiesen, Schrb., Ktzn. (Czw.).

H. depressa Gray. *brunnea* Fabr. s. unter faulenden Vegetabilien, Putzig (Stf.).

H. divisa Märk. n. s. Kbg. (Ltz.).

H. elongatum Grav. h. am ausfliessenden Baumsaft Kbg. (Ltz.).

H. exilis Er. n. s. Kbg. (Sauter, (Ltz.).

H. flavipes Grav. h. überall.

H. fragillicornis Kr. s. Ktzn. am Nogatauer (Czw.).

H. fungi Grav. g. unter Laub; var. *orbata*

Er. Glettka (Czw.).

H. fungicola Thoms. n. s. Kbg. (Ltz.).

H. gagatina Baudi. *variabilis* Kr. n. a. Kbg. (Ltz.).

H. gemina Er. s. Kbg. (Ltz.).

H. germana Sharp. n. h. Kbg. (Czw.).

H. graminicola Grav. h. Kbg. (Ltz.).

H. granigera Ksw. s. Ggbg. (Kr.), Kbg. (Sauter).

H. gregaria Er. *Tachysa immunita* Er. h. Kbg. (Ltz.).

H. grisea Thoms. s. Kbg. (Czw.). Seidl. Fn. Balt. p. 302.

H. humeralis Kr. s. in der F. F. im Schwamm eines Carpinusstammes (Czw.).

H. hygrobia Thoms. s. Kbg. (Czw.).

H. hypnorum Ksw. *silvicola* Fuss. s. Corjeiten, am Meeresstrande (Ltz.).

H. ignobilis Sharp. s. Kbg. (Sauter, Stnr.), Dz. (Czw.).

H. immersa Er. s. Loppehnen (Eld.), Ggbg. (Kr.).

H. incana Er. s. Kbg. Holzwiesen (Ltz., Stnr.).

H. inquinula Er. n. s. Loppehnen (Eld.), Ggbg. (Kr.).

H. insecta Thoms. *languida* Scriba s. Neuhäuser unter Tang (Stnr.), Pregelwiesen (Czw.).

H. labilis Er. n. s. Kbg. (Ltz.).

H. laevana Rey. *setigera* Sharp. n. s. an Excrementen Ggbg. (Kr.), Schrb. (Czw.).

H. languida Er. n. s. Ggbg. (Kr.), Kbg. (Sauter); in der Dommerschen Sammlung hat Czw. 3 St. geschen.

H. lepida Kr. *corvina* Thoms. s. in Pilzen bei Jäschkenthal (Czw.).

H. linearis Grav. s. Kbg. (Ltz.).

H. lividipennis Er. überall h. am Baum-saft.

H. longicornis Grav. h. ebenso.

H. luridipennis Mannh. h. ebenso.

H. lutipes Er. s. F. F. (Czw.).

H. marcida Er. s. Kbg. (Ltz.).

H. meraria Thoms. n. s. In überreichen-den Pilzen, Kbg. (Ltz.).

H. nigerrima Aubé. s. Seestrand (Eld.).

H. nigricornis Thoms. n. h. Kbg. Dz. (Czw.).

H. nigritula Grav. s. Kbg. vom Pregel-damm (Ltz.).

- H. nitidula** Kr. n. s. Kbg. (Ltz.).
H. obliterata Er. s. Ktzn. (Czw.).
H. oblonga Er. s. Kbg. (Czw.).
H. occulta Er. h. Dz., im Frühjahr am Meeresstrande (Dommer).
H. orphana Er. n. s. Kbg. (Ltz.).
H. pagana Er. s. Kbg. (Czw.).
H. pallidula Er. s. Dz. (Dommer), Ggbg. (Kr.).
H. palustris Ksw. s. Dz. am Strande (Dommer), Kbg. (Ltz.).
H. pilicornis Thoms. pilosa Kr. s. Schrb. (Czw.).
H. plana Gyll. s. Loppehnen (Eld.), Kbg. (Stnr.).
H. pulchra Kr. s. Schrb. Ktzn. (Czw.).
H. pumila Kr. s. Kbg. (Czw.).
H. puncticeps Thoms. s. an der Seeküste, Neufahrwasser (Czw.), in der Dommerschen Sammlung als Tachyusa scitula bezeichnet (Czw.).
H. pygmaea Gray n. h. Ggbg. (Kr.), die var. *obfuscata* Gray. aus Moos, Kbg. (Sauter).
H. ravilla Er. s. F. F. (Czw.), cf. angusticollis.
H. sericea Rey. s. Ggbg. (Kr.).
H. simillima Sharp. s. F. F. (Stnr.).
H. sodalis Er. s. Kbg. (Ltz.).
H. sordidula Er. h. Kbg., im Pferdedünger auf den Holzwiesen (Czw.), Loppehnen (Eld.).
H. soror Kr. s. Kbg. Ktzn. (Czw.).
H. splendens Kr. s. Rastenburg (Czw.).
H. stercoraria Kr. s. Dz., an der Krähenschanze unter Steinon (Czw.).
H. subalpina Rey. s. Kbg. (Sauter).
H. sublinearis Kr. s. Kbg. (Ltz.); mitunter sehr zahlreich bei Katzn. (Czw.).
H. subrugosa Ksw. s. F. F. (Czw.).
H. subsinuata Er. s. Karlikau bei Zoppot (Czw.).
H. subterranea Rey. s. Ggbg. (Kr.).
H. subtilis Scriba. s. Schrb., F. F. (Czw.).
H. talpa Heer. n. s. Kbg. (Dommer), Putzig (Stf.), Ggbg. (Kr.).
H. terminalis Gyll. n. s. Sainlünd. Seestrand (Eld. Ltz.), Ggbg. (Kr.).
H. testudinea Er. s. ebendaselbst.
H. thinobloides Kr. s. Loppehnen (Eld.).
H. tibialis Heer. obwohl ein entschiedener Gebirgskäfer, doch in 2 Stück von Czw. bei Schrb. und in der F. F. gefangen (von Scriba bestimmt).
H. trinotata Kr. socialis Thoms. n. s. am Baumsaft Kbg. (Ltz.).
H. validicornis Märk. n. s. am Eichensaft Kbg. (Ltz.).
H. velata Er. n. s. Dz. (Dommer).
H. vernacula Er. n. s. Dz. (Dommer) Kbg. (Ltz.), Ggbg. (Kr.).
H. vestita Gray. n. s. am Ostseestrande (Dommer, Eld., Ltz.).
H. vicina Kr. nigra Kr. n. s. Loppehnen (Eld.), Löwenhagen (Ltz.), Ktzn. (Czw.).
H. vilis Er. s. F. F. (Czw.).
H. volans Scriba. n. s. Ggbg. (Kr.), Kbg. auf den Pregelwiesen (Czw.).
Placusa complanata Er. s. aus Röhricht am Pregeldamme (Ltz.).
P. atrata Sahlb. s. Ktzn. (Czw.).
P. infima Er. s. Kbg. ♂ ♀ (Sauter).
P. adscita Er. s. F. F. (Czw.).
Cyphea curvula Er. s. F. F. unter Rinde von carpinus; die Vermuthung von Kraatz K. D. II. 191 ist richtig (Czw.).
Phloecora reptans Grav. h. unter Tannenrinde Kbg. (Ltz.).
P. corticalis Grav. ebenso.
Hygromona dimidiata Grav. s. auf Wasserpflanzen b. Heub. (Dommer); unter ausgespültem Röhricht Zinten (Ltz.); Ktzn., Kbg. (Czw.).
Oligota pusillima Grav. n. s. aus Moos vom Seestrande (Eld.); auf Waldwiesen bei Sonnenuntergang geschnüpft Putzig (Stf.).
O. parva Kr. s. Kbg. Poln. Kirchhof (Czw.).
O. inflata Mannh. n. h. Dz., Ktzn. (Czw.), Kbg. Holzwiesen (Stnr.).
O. granaria Er. s. wie pusillima, Kbg. (Czw. Stnr.), Schwarzerz (Stnr.).
O. flaveornata Lac. s. F. F. (Stnr.).
Encephalus complicatus Westw. s. s. Löwabagen auf dem östlichen Abhange des Waldes, Rastenburg. (Czw.), Vierbrkr. aus Moos (Stnr.).
Gyrophana pulchella Heer. n. s. Loppehnen (Eld.), Kbg. (Czw.). Alle Species in Blätterpilzen.
G. affinis Sahlb. n. s. Neuhaus (Ltz.).
G. punctulata Rey. s. F. F. (Czw.), ♂ St. alles ♂; auch Muls. sagt: la femelle nous est inconnue (Société Linn. Lyon 1872).
G. gentilis Er. s. Schrb. (Stnr.).
G. nana Pk. überall g.
G. laevipennis Kr. n. h. Kbg. auf dem Poln. Kirchhof (Czw. Stnr.).

- G. lucidula** Er. s. daselbst (Czw.).
G. congrua Er. h. Dz. (Dommer), Kbg. (Ltz.).
G. bibamata Thoms. s. F. F. Ktzn. (Czw.).
G. minima Er. n. s. Dz. (Dommer).
G. manca Er. n. s. Loppehnen (Eld. Ltz.).
G. polita Grav. ebenso.
G. strictula Er. s. ebenso, im Schlossgarten von Friedrichstein (Ltz.).
G. boleti L. n. s. ebenso, F. F. (Stnr.).
Pronomaca rostrata Er. bei Ggbg. (Kr.) nicht sehr selten; Heub. Dz. (Czw.).
Myllaena dubia Grav. s. im Grebbiner Walde im Frühjahr unter feuchtem Laub (Dommer), Kbg. (Stnr.).
M. intermedia Er. n. s. ebenso.
M. minuta Grav. h. aus Moos von Sorquitten (Eld.), unter Tang bei Zoppot, Mai (Stf.).
Gymnusa brevicollis Pk. s. Dz. in Wäldern unter Laub und im Moose (Dommer).
Dinopis fuscata Matth. s. Grebbiner Wald (Dommer), Ktzn. (Czw.).
Hypocyptus longicornis Pk. n. h Putzig Mai, Juni (Stf.); Neuhausen, F. F., Metgethen (Stnr.), Oliva (Czw.).
H. seminulum Er. n. s. Neuhäuser (Ltz.), Glettkauf (Czw.).
H. Ineiuscula Mannh. s. Dz., aus Moos (Dommer), Kbg. (Czw.).
Trichophya pilicornis Gyll. s. s. Rastenburg (Czw.).
Halbrocrus capillaricornis Grav. n. h. Kbg. auf dem Poln. Kirchhof, Dz. am Carlsberg, Ktzn. unter Stroh (Czw.), F. F. (Stnr.).
Leucogaryphus silphoides L. n. s., im Frühjahr an Apfelblüthen (Dommer); auf Eichen, Rauschen (Ltz.), im Kuhdüniger in den Dünen von Glettkauf (Czw.).
Tachinus humeralis Grav. Loppehnen (Eld.).
T. rufipes Deg. h. im Düniger (Ltz.).
T. flavipes Fabr. g. ebenso.
T. rufipennis Gyll. s. Kbg. bei Wilkie (Pfeil), Ggbg. (Kr.).
T. marginatus Gyll. n. h. Rauschen (Ltz.), Higbl. (Stnr.), in der Dommerschen Sammlung als **T. pallipes** Grav. (Czw.).
T. pallipes Grav. s. Blaustein (Ltz.).
T. bipustulatus Fabr. n. h. unter Steinen (Kug.), hierzu gehören die 4 St. der Dommerschen Sammlung, die er *pallipes* Grav. bezeichnet hat (Czw.).
T. subterraneus L. n. h. am ausdriessenden Birkensaft, Blaustein (Ltz.).
T. simetarius Fabr. g. auf Hollunderblüthen.
T. marginellus Fabr. s. Dz. (Sieb.).
T. laticollis Grav. n. s. Kbg. (Czw. Ltz.).
T. collaris Grav. h. an feuchten, schattigen Stellen (Kugel.), Kbg. (Ltz.).
Tachyporus obtusus L. überall h.
T. formosus Matth. s. s. Schrb. (Czw.).
T. ruficeps Kr. s. aus Ellernlaub gesiebt an der Dahlitz bei Lyck (Sanio).
T. solitus Er. n. s. Kbg. (Ltz. Stnr.).
T. chrysomelinus L. g.
T. hypnorum Fabr. g.
T. tersus Er. s. s. Dz. 1860 (Helm).
T. atriceps Steph. humerosus Er. s. bei Stegen, unter Fichtennadeln (Dommer), Kbg. (Stnr.).
T. ruficollis Grav. s. Kbg. (Sauter).
T. transversalis Grav. h. Dz. aus Moos (Dommer), Kbg. (Ltz.).
T. scitulus Er. ebenso.
T. pusillus Grav. n. s. Kbg. (Ltz.).
T. brunneus Fabr. n. s. an feuchten, schattigen Stellen (Kugel. Sieb.).
T. saginatus Grav. s. Osterode, in der Erde, auf Blumen, in Schwämmen (Kugel.), Dz. (Sieb.), Glettkauf (Czw.), F. F. (Stnr.).
Conurus pubescens Pk. h. unter Laub, Kbg. (Ltz.).
C. pedicularius Grav. n. s. an alten Baumstümmen im Moose (Kugel. Dommer).
C. littoreus L. n. s. Kbg. Holzwiesen, Judditen (Ltz. Stnr.).
C. bipustulatus Grav. Osterode unter modernem Holze, unter Baumrinde (Kugel.), jedoch nicht wieder gefunden.
C. bipunctatus Grav. s. an einem Weidenstubben bei Heub. (Dommer), Kbg. (Ltz.).
Bolitobius lunulatus L. *atricapillus* Fabr. h. in faulenden Pilzen, Kbg. (Ltz.).
B. pulchellus Mannh. *lunulatus* Er. bei Putzig n. s. Mai—October (Stf.).
B. trinotatus Er. s. Kbg. vom Pregeldamm (Ltz.).
B. exoletus Er. n. s. Dz. (Dommer), Kbg. (Ltz.).
B. pygmaeus Fabr. g. hierher gehört sicher auch **B. trimaculatus**, von dem Kugel. sagt, dass er von ihm in einem Agaricus wohl über

tausend Stücke gefunden habe. Die var. *intrusus* Hampe. Rauschen (Ltz.).

B. striatus Oliv. s. Osterode in faulendem Holze, (Kugel.), Kbg. aus Moos (Sauter), Schrb. (Czw.).

B. cingulatus Mannh. n. h. Kbg. bei Liep (Ltz.), Glettka (Czw.).

B. analis Payk. s. Putzig, Elbing Mai—October (Stf.).

B. inclinans Grav. s. s. überwinternd an Weiden, die mit Pilzen besetzt sind, Gr. Zünder (Dommer).

B. formosus Grav. n. s. in feuchtem Moose, Putzig (Stf.), Ktzn. Schrb. F. F. (Czw., Stnr.).

B. cornutus Grav. s. Dz. (Dommer), Ggbg. (Kr.), F. F. (Stnr.).

B. rufus Er. s. Schwarzort (Ltz., Schieff.).

Mycetoporus splendidus Grav. n. s. Kbg. (Ltz.).

M. lucidus Er. s. aus Moos von Dammhof (Sauter).

M. nanus Er. n. h. Kbg., nasser Garten (Czw.)

M. punctus Gyll., wie lucidus; Schwarzort (Ltz.).

M. brunneus Marsh. *longulus* Mannh. *lepidus* Grav. *ruficornis* Kr. n. s. in Pilzen, Kbg. (Ltz.), Dz. (Dommer, Czw.).

M. splendens Marsh. s. Rauschen (Ltz.).

M. pronus Er. n. s. aus Moos, F. F. (Ltz., Stnr.).

Acylophorus glabricollis Grav. s. s. Ggbg. (Kr.).

Euryporus pictipes Payk. s. Schrb., F. F., Löwenhagen im Spätherbst (Stnr.), Ggbg. (Kr.).

Heterothops praevia Er. n. s. an Stubben im Moos (Dommer), Kbg. (Ltz.).

H. binotata Grav. *quadripunctula* Gyll. h. am Seestrande (Ltz.), Kbg. Holzwiesen, F. F. (Stnr.).

H. dissimilis Gray. s. an feuchten, dumpfl. Orten (Kugel.), an Stubben im Moose (Dommer).

Quedius dilatatus Fabr. s. s. im Ottominer Walde an ausgeflossenen Eichensaft, August (Dommer); Warnicken (Eld.).

Q. chrysurus Ksw. s. Ggbg. (Kr.).

Q. brevis Er. n. h. Putzig, April—Juni, unter Ameisen (Stf.), Neuhausen (Stnr.).

Q. lateralis Grav. n. s. in faulenden Pilzen bei Zoppot, Aug. Septbr. (Dommer), Putzig (Stf.), Rauschen (Stnr.).

Q. fulgidus Fabr. (mit rothen Decken) n. h. Katznase (Czw.), Kbg. (Stnr.).

Q. mesomelinus Marsh. (schwarz) h. im Moose (Ltz.).

Q. eruentus Oliv. s. Ggbg. (Kr.), Kbg. Plantage (Stnr.).

Q. xanthopus Er. n. s. im Waldlaube (Dommer), Kbg. (Stnr.).

Q. seitus Grav. s. Kbg. (Ltz.).

Q. laevigatus Gyll. s. Putzig (Stf.), Schrb., F. F. (Czw., Stnr.).

Q. impressus Panz. s. unter Steinen in Wäldern (Kugel.), Putzig (Stf.), Kbg. am Trenker Waldhause (Ltz.), Ktzn. (Czw.).

Q. fuliginosus Grav. h. im Moose.

Q. molochinus Grav. ebenso.

Q. umbrinus Er. s. im Moose überwinternd (Dommer).

Q. nigriceps Kr. s. Loppehnen (Eld.), Kbg. (Ltz.).

Q. praecox Grav. s. von Blumen geschöpft (Dommer).

Q. suturalis Ksw. n. s. Ggbg. (Kr.).

Q. marginalis Kr. s. s. Dz. Jäschkenthal (Czw.).

Q. scintillans Grav. s. Trenker Waldhaus (Ltz.), Ktzn. (Czw.).

Q. maurorufus Grav. s. Loppehnen (Eld.), Kbg. (Ltz.), F. F. (Stnr.).

Q. lucidulus Er. s. von Büschen geklopft (Dommer), Ggbg. (Kr.).

Q. attenuatus Gyll. n. s. Kbg. (Ltz.).

Q. boops Grav. s. Putzig (Stf.), am Pregel (Stnr.).

Emus maxillosus L. h. am Aase, Kbg. (Ltz.).

E. hirtus L. s. Blaustein an Kuhdinger (Ltz.).

Leistostrophus nebulosus Fabr. h. wie Emus maxillosus.

L. murinus L. ebenso.

Staphylinus pubescens Deg. n. s. wie Emus maxillosus.

S. fulvipes Scop. s. s. unter Laub in Wäldern (Dommer), Vierbrkr. (Stnr.).

S. stercorarius Oliv. s. Dz. (Sieb.).

S. latebricola Grav. s. ebenso.

S. erythropterus L. h. in Wäldern, War-

nicken, Lyck, Rastenburg (Ltz.).

- S. caesareus* Cederh. überall h.
S. Oryxus olens Müll. s. Heilsberg, Rastenburg (Sieb.).
S. brunnipes Fabr. n. s. Kbg. (Ltz.).
S. cyaneus Payk. s. Allenstein, in faulenden Stämmen (Kugel.), Braunsberg (Stnr.), im Walde von Schwarzort, Juli (Ltz.), Oliva (Czw.).
S. similis Fabr. s. Dz. (Sieb.).
S. piepennis Fabr. n. s. im Moose, Fischhausen (Ltz.).
S. fuscatus Grav. n. h. Zoppot (Ltz.), Ggbg. (Kr.).
S. cupreus Rossi. n. h. Kbg. (Ltz.).
S. atro Grav. s. Ktzn. (Czw.).
S. morio Grav. s. in trockenen Gräben bei Gr. Zündler (Dommer), Kbg. (Ltz.).
Philonthus xantholoma Grav. an der Sammlnd. Seeküste unter Tang mitunter n. s. (Eld. Ltz.).
P. cinerascens Grav. n. s. Kbg. (Ltz.).
P. elongatulus Er. s. Kbg. auf Pregelwiesen (Czw., Stnr.).
P. procerulus Grav. Kbg. (Ltz., Stnr.).
P. prolixus Er. s. Rastenburg, am Kiesufer der Guber (Czw.).
P. splendens Febr. s. Kbg. (Ltz.), Schrb. (Czw.).
P. intermedius Lac. s. Dz. (Ltz.)
P. nitidus Febr. s. Kbg. (Ltz.).
P. proximus Kr. carbonarius Er. succicola Thoms. z. h. im Dünger, Dz. (Dommer), Kbg. (Ltz.).
P. carbonarius Gyll. tenuicornis Muls. n. s. Schromb. (Czw., Stnr.).
P. aeneus Rossi. s. h. überall.
P. punctus Grav. mit var. *binotatus* Grav. s. Schwarzort (Ltz.), Kbg. nasse Garten (Czw.)
P. puella Nordm. s. am Eichensaft, Schromb. (Czw.).
P. cephalotes Grav. n. s. Kbg. (Ltz.).
P. umbratilis Grav. s. Ludwigsort (Ltz.), Ktzn. (Czw.).
P. sordidus Grav. n. s. Conitz (Sieb.), Kbg. (Ltz.), Ktzn. (Czw.).
P. fuscus Grav. s. Dz., Grebbiner Wald am Eichensaft (Dommer, Ltz.), Schwarzort in Reitherneinstern (Czw.), Kbg. am Pappelsaft (Stnr.).
P. sanguinolentus Grav. n. s. am Aase (Kugel.), in frischem Dünger (Ltz.).
P. ventralis Grav. n. s. Kbg. (Ltz.).
P. debilis Er. s. ebenso.
P. discoideus Grav. n. s. unter faulenden Gewächsen (Kugel.), Dz., in Stubben (Dommer), Kbg. am Trenker Waldhause (Ltz.).
P. laminatus Creutz. n. s. Dirschau an der Weichselbrücke (Ltz.).
P. atratus Grav. ebenso.
P. laevicollis Lac. s. Kbg. (Ltz., Sauter).
P. dimidiatus Sahlb. s. am Weichsel- und Haffauer, Juli (Dommer).
P. ebeninus Grav. in allen Größen g. Die var. *coruscus* Grav. seltener, Kbg. (Ltz.), Ggbg. (Kr.).
P. quisquiliarius Gyll. n. s. Kbg. (Ltz.), die var. *rubidus* Er. Ggbg. (Kr.).
P. splendidulus Grav. n. s. Conitz (Sieb.), Kbg. (Ltz.).
P. simetarius Grav. ebenso, Dz. (Kumm.).
P. nigritulus Grav. trossulus Nordm. s. h. Kbg. (Ltz.).
P. decorus Grav. n. h. Kapkeim (Ltz.).
P. politus Fabr. h. Kbg. (Ltz.).
P. lepidus Grav. s. im Frühjahr, Putzig (Stf.), Dz. (Czw.).
P. nitidulus Grav. s. Dz. auf der Krähenschanze (Czw.).
P. varius Gyll. n. s. Kbg. (Ltz.), die var. *bimaculatus* Grav. s. Putzig (Stf.).
P. tenuis Fabr. im Süden der Prov. n. s. bei Osterode auf Aeckern unter Steinen (Kugel.), Conitz (Sieb.), Blaustein (Ltz.).
P. marginatus Müll. h. im frischen Dünger, Kbg. (Ltz.).
P. bipustulatus Panz. n. h. Kbg. (Ltz.).
P. seybalarius Nordm. n. h. ebenso, Dz. (Czw.).
P. varians Payk. opacus Thoms. in frischem Dünger g. auch die var. *agilis* Gray. Kbg. (Ltz.).
P. albipes Gray. s. Ggbg. (Kr.).
P. sumarius Grav. s. in abgefallenem Laube, Kbg. (Ltz.), am Dammteich, Juni (Czw.).
P. nigrita Gray. s. h. ebenso.
P. micaeus Gray. g. ebenso.
P. fulvipes Fabr. n. s. an Flussufern (Czw.).
P. virgo Gray. s. s. Kbg. (Pfeil).
P. vernalis Grav. n. s. unter abgefallenem Laube, Kbg. (Ltz.).
Xantholinus reliquens Grav. s. Ggbg. (Kr.).
X. glaber Nordm. s. in fetter Erde (Kugel.), Juditten (Stnr.).

X. rufipennis Er. s. Kbg. an Birkenstübben
in Wilkie (Pfeil).

X. tricolor Fabr. n. s. in Fanggräben der
Forsten und unter Moos (Dommer, Frantzius,
Ltz.).

X. distans Rey. ebenso, Kbg. (Czw., Ltz.).

X. linearis Oliv. *longiventris* Heer. h.
unter Laub, Kbg. (Ltz.), Dz. (Helm).

X. punctulatus Payk. *ochraceus* Gyll. h.
ebenso.

X. fulgidus Fabr. s. in Wäldern unter fau-
lendem Holz, Osterode (Kugel.), Dz. (Dommer),
Kbg. im Tharauer Walde (Ltz.).

X. lenius Grav. bei Rastenburg im Walde
von Blaustein n. s. unter Abiesrinde (Ltz.).

Leptacinus batyphrus Gyll. *linearis* Grav. n.
s. Gbg. (Kr.), Kbg. Plantage (Stnr.).

L. formicetorum Mürk. h. unter Ameisen,
Kbg. (Eld., Ltz.).

Baptolimus pilicornis Payk. s. Dz. in einer
Sägegrube (Dommer), Kbg. in Abiesstübben
(Ltz.).

B. alternans Grav. s. Loppehnen (Eld.),
Schwarzort im Pilz einer alten Weide (Ltz.),
unter Kiefernrinde Kbg. (Czw.).

Othius fulvipennis Fabr. n. s. unter abge-
fallenem Loube und Nadeln, Dz. (Dommer), Kbg.
(Ltz.).

O. melanoccephalus Grav. h. in feuchtem
Moos u. Baummoder Kbg. (Ltz., Stnr.).

O. lapidicola Ksw. s. Ludwigsort (Ltz.),
Wilkie (Pfeil).

O. myrmecophilus Ksw. s. Dz. aus Laub
gesiebt neben dem Carlsberg bei Oliva (Czw.),
Kbg. (Ltz.).

Lathrobium brunnipes Fabr. h. Kbg. (Ltz.).

L. elongatum L. s. h. unter Laub, Kbg.
(Ltz.).

L. boreale Hochh. s. s. F. F. (Czw.).

L. fulvipenne Grav. n. s. Kbg. (Ltz.).

L. rufipenne Gyll. s. Dz. (Dommer).

L. filiforme Grav. s. Kbg. (Ltz.).

L. longulum Grav. s. aus Moos (Eld.), Putzig
Juni (Stf.).

L. multipunctum Grav. Dz. auf Feldern
n. s. (Dommer), Corjeiten (Ltz.).

L. scutellare Nordm. s. s. auf einem Felde
neben der F. F. (Czw.).

L. quadratum Payk. n. s. unter Laub, Kbg.
(Ltz.).

L. terminatum Grav. ebenso, bei Putzig s.
(Stf.). bei Kbg. h. Wernsdorf (Kuwert). Ich kann
mich von der Identität mit *quadratum* nicht
überzeugen, letzteres ist stets grösser, breiter
und überhaupt plumper gebaut; auch habe ich
terminatum ohne rothe Punkte hier noch nicht
gesehen. Czw. sagt darüber folgendes: Auch
ich würde nach den bei uns vorkommenden
Stücken die Arten sicher trennen; aber aus Italien
(Vallombrosa) habe ich wirkliche Mittelformen
mitgebracht und bin seitdem Fauvels Ansicht
von der Nothwendigkeit der Vereinigung beige-
treten. Es scheinen werdende Arten (Darwin),
die bei uns schon getrennt sind.

L. punctatum Zett. n. h. Kbg. (Ltz.).

L. pallidum Nordm. s. in trocknen Gräben,
Gr. Zünder (Dommer), Kbg. Holzwiesen (Stnr.).

L. seabriocolle Er. s. s. Kbg. in Birken-
stübben bei Wilkie (Pfeil).

Cryptobium fracticorne Pk. n. s. auf alten
Baumwurzeln unter Moos (Kugel.), Dz. (Dommer),
Kbg. (Ltz., Stnr.).

Lithocharis ochracea Grav. s. aus Moos Dz.
(Frantz.), Kbg. (Ltz.), Ktzn. (Czw.).

L. obsoleta Nordm. *obscurella* Er. s.
Ktzn. (Czw.).

L. melanocephala F. s. Dz. (Dommer),
Wilke in Abiesstübben (Ltz.).

Scopacis laevigatus Gyll. n. s. Gbg. (Kr.),
Kbg. (Sauter, Stnr.).

S. cognatus Rey. s. unter Röhricht, Kbg.
(Ltz.), Rauschen (Stnr.).

S. sulcicollis Steph. *minutus* Er. s. in
einer Sandgrube, Ktzn. (Czw.).

Stilicis fragilis Grav. s. am Seestrande bei
Adlershorst, Juni (Dommer).

S. orbiculatus Payk. h. unter faulendem
Heu, Kbg. (Ltz.).

S. geniculatus Er. s. Kbg. auf der Plantage
I d (Czw.).

S. similis Er. s. Kbg., in der Brandenburger
Haide (Ltz.).

S. rufipes Germ. s. h. mit *orbiculatus*.

S. subtilis Er. s. Dz. (Sieb.).

Sunius filiformis Latr. s. Seestrand bei
Kahlberg (Dommer), Gbg. (Kr.).

S. angustatus Payk. n. s. Putzig, unter
Steinen (Stf.), Kbg. im Moose (Sauter, Czw., Ltz.).

Puederus riparius L. h. auf saudigen Ufern
unter Schilf, Kbg. (Ltz.).

- P. littoralis* Grav. ebenso.
P. longipennis Er. ebenso.
P. limnophilus Er. s. Rauschen (Stnr.).
P. ruficollis Fabr. s. Osterode (Kugel.), Dz. (Sieb.).
Dianous coeruleoceans Gyll. s. Putzig, am Seeufer unter Tang, im ersten Frühjahr (Stf.).
Stenus biguttatus L. s. h. unter feuchtem Laub in Gärten.
S. bipunctatus Er. weniger h. Kbg. (Ltz.).
S. guttula Müll. s. Dz. (Dommer).
S. aterrimus Er. n. h. Putzig, bei Ameisen, April—Juni (Stf.), F. F. (Stnr.).
S. nanus Steph. declaratus Er. n. h. Kbg., aus Röhricht (Sauter).
S. stigmula Er. s. Ktzn. am Nogatuser (Czw.).
S. bimaculatus Gyll. s. Kbg. (Dommer, Ltz.).
S. speculator Lac. n. s. Conitz (Sieb.); Kbg. Dammhof unter Schilf (Ltz.).
S. providus Er. h. Kbg. (Ltz.).
S. lustrator Er. s. Kbg. (Ltz.).
S. silvester Er. s. F. F. 2 ♂ (Czw., Stnr.).
S. calcaratus Serib. s. Glettka, Schromb. Neue Bleiche (Czw.), am Pregel (Stnr.).
S. Juno Fabr. s. h. überall.
S. atro Munnh. n. s. F. F. (Stnr.), Dz. (Czw.).
S. longitarsis Thoms. s. Kbg. Pregelwiesen (Czw.).
S. circularis Grav. n. s. Kbg. (Ltz.).
S. palposus Zett. *argentellus* Thoms. s. Glettka (Czw.).
S. bupthalmus Grav. h. Kbg. (Ltz.).
S. inerassatus Er. s. Kbg. Pregelwiesen (Czw.), Dammhof (Stnr.).
S. melanarius Steph. *einerascens* Er. n. h. Kbg. (Ltz.).
S. canaliculatus Gyll. n. h. Conitz (Sieb.).
S. nitens Steph. *aemulus* Er. s. Blaustein (Ltz.).
S. melanopus Marsh. *nitidus* Lac. s. Ktzn. unter Spreu (Czw.), Kbg. (Stnr.).
S. atratulus Er. n. s. Kbg. (Sauter, Ltz.).
S. morio Grav. h. ebenso.
S. variolus Er. s. Kbg. Pregelwiesen (Czw.).
S. cautus Er. s. ebenso.
S. fuscipes Grav. g.
S. crassiventris Thoms. s. Schwarzort (Stnr.).
S. opticus Grav. s. Putzig (Stf.), Pregelufer, Dammhof (Stnr.).
S. argus Grav. s. Kbg. (Ltz., Schieffdr.).
S. humilis Er. s. h.
S. carbonarius Gyll. *niger* Mannh. n. s. Kbg. (Ltz.).
S. nigritulus Gyll. s. ebenso.
S. latifrons Er. s. ebenso.
S. paganus Er. s. Dz. am Seestrande (Dommer).
S. tarsalis Ljung. g. auf Wasserpflanzen.
S. oculatus Grav. h. ebenso.
S. eleindeloides Schall. n. h. Putzig (Stf.), Kbg. Holzwiesen (Stnr.), Rastenbg. (Czw.).
S. contractus Er. s. Radauemeuer (Dommer), Kbg. (Czw., Stnr.).
S. subimpressus Er. s. Blaustein (Ltz.), Kbg. Pregewiesen (Czw.), Neuhausen (Stnr.).
S. binotatus Ljung. n. s. Kbg. (Ltz.).
S. plantaris Er. s. h. wie *tarsalis*.
S. picipes Steph. *rusticus* Er. n. s. Kbg. (Ltz.).
S. bifoveolatus Gyll. s. Kbg. (Czw.).
S. tempestivus Er. s. Oliva, Juli (Czw.).
S. filum Er. n. s. auf feuchten Waldwiesen, F. F. (Czw.), Horst am Pregel (Ltz.).
S. impressus Germ. n. s. im Waldmoose, Kbg. (Ltz.).
S. geniculatus Grav. s. Oliva, Schrb. (Czw., Stnr.).
S. pallipes Grav. n. s. Kbg. (Ltz.).
S. palustris Er. s. Ktzn. (Czw.).
S. flavipes Er. n. s. F. F. (Stnr.), Kbg. (Sauter).
Euaesthetus scaber Grav. n. s. Putzig (Stf.) Kbg. Pregeldann (Ltz.).
E. ruficapillus Lac. n. s. Teichrand von Dammhof (Eld.), Kbg. (Ltz.).
E. laeviusculus Munnh. n. h. wie *scaber*.
Oxypporus rufus L. h. in Blätterpilzen.
O. maxillosus Fabr. s. Elbing (Ltz.), Rauschen, Georgenswalde (Stnr.).
Bledius tricornis Hbst. Osterode in fetter Gartenerde (Kugel.), Hlgbl. (Stnr.), Pregelwiesen (Czw.).
B. arenarius Payk. n. h. Tilsit (Ltz.), Glettka (Czw.).
B. tulpa Gyll. einmal im Mai in Menge gefunden, am Ufer des Ottominer Sees, sonst nicht wieder (Dommer).

- B. subterraneus** Er. h. Kbg. (Ltz., Stnr.).
B. pallipes Grav. terebrans Schiödt. s.
Dz. am Seestrande (Dommer), Loppehnen (Stnr.).
B. erraticus Er. h. daselbst; Cranz (Ltz.).
B. atricapillus Germ. nanus Er. s. Neu-häuser (Stnr.).
B. opacus Block. n. h. in trocknen Gräben (Dommer).
B. longulus Er. s. Dz. (Sieb.).
B. crassicollis Lac. ebenso (Dommer).
B. procerulus Er. s. Kbg. Pregeldamm (Czw., Stnr.).
B. fracticornis Payk. n. s. Kbg. Trenker Waldhaus (Ltz.).
Platytelus morsitans Payk. g. im Dünger.
P. cornutus Gyll. n. h. Conitz (Sieb.), Kbg. (Ltz.).
P. capito Heer. s. Kbg. (Ltz.)
P. nodifrons Sahlb. n. h. ebenso.
P. nitens Sahlb. n. s. Kbg. Neuhäuser (Ltz., Stnr.).
Oxytelus rugosus Fabr. g. im Dünger.
O. Eppelsheimii Bethe. s. Dz., F. F. (Czw., Stnr.).
O. insectatus Grav. s. Kbg. Liep (Ltz.).
O. fulvipes Er. s. s. besitzt aus Pr. Schiffdr.
O. luteipennis Er. s. Dz. im Pferdedünger (Dommer), Neuhausen (Stnr.).
O. piceus L. h. Conitz (Sieb.), Marienburg (Ltz.), Neuhausen (Stnr.).
O. sculptus Grav. s. Kbg. (Ltz., Stnr.).
O. inustus Grav. s. ebenso.
O. sculpturatus Grav. s. im Pferdedünger (Dommer).
O. nitidulus Grav. g.
O. complanatus Er. g.
O. Saulcyi Pand. s. Kbg. auf dem Polnischen Kirchhof, Ktzn. (Czw.).
O. transversalis Czw., n. h. Berl. Ent. Zt. 1870 p. 411, unter Laub, Kbg., Ktzn. Dz. (Czw.).
O. depressus Grav. g.
O. affinis Czw. s. Kbg., Ktzn. (Czw.).
O. tetratoma Czw. s. s. Kbg. auf dem Poln. Kirchhof (Czw.).
Haploclerus caelatus Grav. n. h. Putzig (Stf.), Zinten (Ltz.).
H. caesus Er. s. Rauschen (Ltz.).
Troglophloeus bilineatus Steph. *riparius* Lac. n. h. Putzig (Stf.), Wilkie (Eld.), Ktzn. (Czw.).
T. obesus Ksw. s. Ggbg. (Kr.).
T. fuliginosus Grav. s. Putzig (Stf.).
T. inquillinus Er. s. Kbg. (Eld.)
T. corticinus Grav. g.
T. elongatulus Er. n. s. Ggbg. (Kr.), Vier-brkr. (Stnr.), Ktzn. (Czw.).
T. foveolatus Sahlb. s. Putzig (Stf.), Heub. (Czw.).
T. exiguum Er. n. h. im Pferdedünger (Dommer), Kbg. (Stnr.).
T. pusillus Grav. n. s. Putzig (Stf.), Kbg. (Czw.).
T. tenellus Er. s. Loppehnen (Eld.), Ggbg. (Kr.), Kbg. (Czw.).
T. subtilis Er. s. Kbg. Pregelwiesen (Czw., Stnr.), Zinten (Ltz.).
Thinobius longipennis Heer. s. Rastenburg, an der Guber (Czw.).
T. brevipennis Ksw. s. Kbg. (Sauter), Heub. (Czw.).
Syntomium aeneum Müll. s. Neuhäuser (Stnr.), Ktzn. an einem Grabenrande unter Blättern, October (Czw.).
Coprophilus striatulus Fabr. n. s. Seestrand bei Zoppot, Mal (Dommer), Zinten (Ltz.).
Compsachila palpalis Er. Ggbg. (Kr.), Pregel-wiesen (Czw.).
Acrognathus mandibularis Gyll. s. Ggbg. (Kr.).
Doleaster dichrous Grav. s. Dz., am See-strande (Dommer, Helm), die var. *adustus* Küst. ebenda (Kumm.).
Anthophagus caraboides L. *abbreviatus* Fabr. s. h.
A. testaceus Grav. ebenso.
Geodromicus plagiatus Er. aus der Sammlung Nanke's von Kugel. angeführt, aber nicht weiter gefunden.
Lestera pubescens Mannh. n. s. Kbg. aus Röhricht (Ltz.).
L. bicolor Fabr. s. von Büschen am See-strande geschöpft (Dommer).
Olophrum piceum Gyll. s. unter Moos im Spitzerste bei Heub. (Dommer); Dammhof, Jüttendorf (Stnr.).
O. fuscum Grav. s. besitzt aus Pr. Schiffdr.
O. assimile Payk. n. s. unter Laub, Reu-schen (Ltz.), Ktzn. (Czw.).
O. consimile Gyll. s. Ggbg. (Kr.), Heub. (Fritzen), Pregeluser (Czw.).

Lathraea squamaria melanocephalum Illig. n. s. Osterode, an verwundeten Stellen der Eichen und Buchen, auch unter deren Rinde (Kugel.); Dz. unter feuchtem Laub, besonders in Gräben (Dommer).

L. atrocephalum Gyll. s. Dz. unter Schilf (Dommer), Juditten (Star.).

L. fuscum Er. s. Dz. im Moose (Dommer).

Deliphrum tectum Payk. n. h. Osterode am ausquellenden Saft von Buchen und Birken (Kugel.); Kbg. (Ltz.).

Acidota erenata Fabr. s. Osterode, im Herbste an Zäunen und Mauern (Kugel.); Kbg. bei Rosenau (Ltz.).

A. eruentata Mannh. s. s. Putzig (Stf.).

Arpedium quadratum Grav. s. Dz. unter Moos (Dommer), Ggbg. (Kr.).

Homalium rivulare Payk. n. s. Osterode an schattigen Stellen unter faulenden Gewächsen (Kugel.), Ggbg. (Kr.).

H. fossulatum Er. ebenso, Putzig (Stf.), Kbg. (Ltz.), F. F. (Star.).

H. caesum Grav. ebenso. Dz. (Dommer), Ggbg. (Kr.).

H. oxyacanthae Grav. s. besitzt aus Pr. Schiffdr.

H. exiguum Gyll. s. Kbg. (Ltz.).

H. minimum Er. s. wie oxyac.

H. pusillum Grav. h. auf Ebereschenblüthen bei Liep (Ltz.). Dz. (Dommer).

H. moniliforme Gyll. s. Kbg. (Ltz.).

H. planum Payk. h. wie pusillum.

H. conformatum Kr. pineti Thoms. s. unter Carpinusrinde, F. F. (Czw., Sauter, Star.).

H. concinnum Marsh. s. wie pusillum.

H. deplanatum Gyll. s. Conitz (Sieb.), Dz. (Dommer).

H. testaceum Er. s. Kleinhaide (Star.).

H. lucidum Er. h. wie pusillum, auch unter Eichenrinde bei Ludwigsort (Ltz.).

H. brunneum Payk. n. h. Osterode (Kugel.), Dz. (Dommer), Kbg. (Ltz.).

H. florale Er. ruficorne Steph. h. an Gartenspiränen, Kbg. (Ltz.).

H. salicis Gyll. s. Kbg. Rosenau (Ltz.).

H. pygmaeum Payk. s. Neuhäuser (Ltz.).

H. striatum Grav. s. Dz. (Dommer), Kbg. (Star.).

H. inflatum Gyll. s. wie oxyacanthae.

Pycnoglypta lurida Gyll. einmal h. unter Röhricht am Pregeldamm (Pfeil, Ltz., Star.). *Anthobium florale* Panz. s. besitzt aus Pr. Schiffdr.

A. primulae Steph. triviale Er. h. in Pilzen (Dommer).

A. ophthalmicum Payk. im Radaunethal h. auf Spiraea ulmaria (Dommer).

A. minutum Fabr. g. auf Wiesen.

A. luteipeum Er. s. Blaustein (Ltz.).

A. longipenne Er. s. im Moose (Dommer).

A. sorbi Gyll. n. s. Putzig, Juni—Aug. (Stf.).

Prosthus brachypterus Fabr. n. h. im Moose, Cranz (Ltz.).

P. macropterus Gyll. ebenso.

P. atomarius Er. s. in Blätterpilzen, Hirschau (Star.), Neuhäuser (Ltz.).

Megarthrus depressus Payk. n. h. aus Moos, Kbg. (Ltz.).

M. nitidulus Kr. s. Kbg. (Sauter), Poln. Kirchhof (Czw.).

M. sinuatocollis Lac. n. s. an Abiesstubbchen, Blaustein (Ltz.).

M. denticollis Beck. marginicollis Er. s. Dz. in Pilzen (Dommer).

M. hemipterus Ill. s. Osterode unter Eichen- und Buchenrinde (Kugel.), Dz. in Pilzen (Dommer), im Walde von Kleinhaide (Eld.).

Phlococharis subtilissima Mannh. n. s. im Moose und unter Rinde, Kbg. (Eld., Ltz.), F. F. (Star.).

Prognatha quadricornis Krb. Osterode, in Schwämme (Kugel.), aber bisher nicht wieder gefunden.

Micropodus porcatus Fabr. n. h. Rouschen (Ltz.), Dz. Ktz. (Czw.).

M. caelatus Er. n. h. auf Pregelwiesen (Pfeil, Czw., Star.).

M. fulvus Er. s. in verrottendem Stroh (Czw.).

Pselaphidae.

Batriscus Delaportei Aub. s. in Masuren unter morscher Baumrinde, Eichen, Kiefern, Birken (Mühl.).

B. venustus Rehb. s. aus Moos von Karlsburg (Eld.), Masuren (Mühl.).

Trichonyx sulcicollis Rehb. s. unter Kiefernrinde, Osterode (Kugel.), Kbg. unter Mistbeetbrettern (Ltz.).

Typhus mucronatus Panz. s. Putzig, aus Moos (Stf.), Weblau (Ltz.).

Pocadius Heisei Hbst. n. s. aus Moos (Ltz., Czw.).

P. dresdensis Hbst. s. aus Moos von Gr. Karschau (Eld.), Masuren, Juni (Mühl.).

Tychus niger Payk. h. Kbg. (Ltz.).

Bryaxis fossulata Rehb. h. Blaustein (Ltz.).

B. haematica Rehb. n. h. ebenso

B. juncorum Leach. n. h. Zoppot (Czw.).

Ggbg. (Kr.), Kbg. Holzwiesen (Stnr.).

B. impressa Panz. s. Kbg. (Sauter).

B. sanguinea L. h. im Waldmoose (Ltz.).

Bythinus puncticollis Denny. n. s. aus Moos von Wundlack (Eld.).

B. validus Aub. s. ebenso (Sauter).

B. bulbifer Rehb. ♀ *glabriocollis* Aub. n. s. Kbg. (Ltz.).

B. glabriocollis Rehb. s. Kbg. in Erde (Eld.) Seidl. Fn. Balt. p. 220; fehlt im Catalog. von St. u. W.

B. Curtisi Denny. s. Kbg. in Gartenerde (Eld.).

B. Burellii Denny s. Kopkeim (Ltz.), Karschau (Eld.).

Euplectus Erichsonii Aub. s. s. einmal unter einem Steine, Kbg. (Ltz.).

E. signatus Rehb. s. unter Ameisen, Kbg. (Eld.), Putzig (Stf.).

E. sanguineus Denny s. im Moose, Dz. (Dommer), Kbg. Holzwiesen (Stnr.).

E. Karstenii Rehb. *gracilis* Chaud. n. s. Kbg. (Eld.), Dz. (Dommer, Frantz.).

E. nanus Rehb. s. unter Ameisen u. Baumrinde (Stf., Eld.), Ggbg. (Kr.), F. F. (Stnr.).

E. ambiguus Rehb. s. h. im Moose.

Trinum brevicorne Rehb. n. s. im Moose (Dommer), Kbg. (Ltz.).

T. brevipenne Chaud. n. s. aus Moos von Zimmerbude (Eld.), F. F. (Czw.).

Clavigeridae.

Claviger testaceus Preissler. *foveolatus* Müll. n. s. unter Ameisen, Kbg. (Sauter).

C. longicornis Müll. s. s. Lyck, auf den Schedlisker Bergen unter einem Stein (Santo).

Seydmaenidae.

Cypridium thoracicum Müll. n. s. Zimmerbude (Eld.), Morgen (Ltz.), Dammhol, F. F. (Stnr.).

Endia plicata Gyll. s. in einem Stalle in Wernsdorf, Neuhausen (Stnr.).

E. abbreviatella Er. n. h. Kbg. unter Gartenbrettern (Ltz.), Holzwiesen am Pregel, Juni (Czw.), im Moose von Karschau (Eld.).

Seydmaena Godarti Latr. s. Kbg. (Eld.), Putzig, Mai (Stf.), Rastenburg (Czw.).

S. scutellaris Müll. h. unter Laub; Wundlack (Eld.).

S. collaris Müll. h. ebenso. Kbg. (Ltz.).

S. pusillus Müll. unter Kiefernrinde Osterode (Kugel.), aber bisher nicht wiedergefunden.

S. exilis Er. s. im Moose von Karschau (Eld.).

S. angulatus Müll. s. unter Ameisen, Kbg. (Eld.), Putzig (Stf.), Ktzn. (Czw.).

S. elongatus Müll. s. Putzig (Bogeng). Schrb. (Czw.).

S. pumilio Schaum. s. Kbg. unter Ameisen (Dommer).

S. Motschulskyi St. s. 1 ♂ im Moose auf der F. F. (Stnr.), Jäschkenthal bei Dz. (Czw.).

S. denticornis Müll. s. F. F. (Czw.).

S. rutilipennis Müll. s. Ggbg. (Kr.), am Dammteich (Stnr.).

S. hirticollis Illig. h. unter Mistbeetbrettern und leichtem Steingerölle (Ltz.).

S. claviger Müll. s. im Moose, Dz. (Dommer), F. F. (Stnr.).

S. Mäklint Mannh. s. Kbg. (Eld.), Putzig (Stf.).

S. Wetterhalli Gyll. s. Putzig, Mai, aus Moos (Stf.).

S. nanus Schpum. s. Kbg. (Eld.).

S. tarsatus Müll. n. s. Kbg. (Ltz.), Dz. (Frantz.).

S. Hellwigii Fabr. s. unter Kiefernrinde und Ameisen, Kbg. (Eld.).

S. rufus Müll. n. s. im Moose, Dz. (Dommer), unter Mistbeetbrettern Liep (Stnr., Ltz.).

Silphidae.

Leptinus testaceus Müll. s. s. aus Laub, Putzig (Stf., Bogeng).

Choleva intermedia Kr. s. unter trockenem Laube, im Samlande (Hagen, Ltz.), Putzig (Stf.).

C. angustata Fabr. s. ebenso (Ltz.).

C. cisteloides Fröhl. *castanea* St. s. s. unter Pilzen im Grebbiner Walde (Dommer), Kbg. Kleinhalde (Eld.).

C. agilis Illig. s. Osterode, Kbg. unter Eichen- und Buchenrinde (Kugel.), Samland (Ltz.).

C. velox Spence. wird von Zebe als preussisch angeführt ist jedoch zweifelhaft.

C. praecox Er. s. Loppehnen unter trockenem Laube (Eld.).

Calope pictipes Fabr. s. im Grebbiner Walde in einem faulen Eichenstübben (Dommer), Fuchshöfen (Stnr.).

C. fuscus Panz. h. Ggbg. (Kr.), Loppehnen (Eld.), Klzn. (Czw.).

C. nigricans Spence. s. Dz., unter verwesenden Pflanzenstoffen (Dommer), die var. *fulliginosus* Er. daselbst (Kumm.).

C. morio Fabr. n. h. Blaustein (Ltz.).

C. nigrita Er. h. unter Pilzen (Dommer,

Frantz.).

C. tristis Pz. s. in Pilzen einer Kieferwaldung, Pr. Stargard (Schmidt).

C. Watsoni Spence. *fumatus* Er. g. am Aase.

C. fumatus Spence. *scitulus* Er. s. unter faulen Holze (Dommer, Czw.).

C. sericeus F. n. s. wie Watsoni.

Colon viennense Hbst. s. s. Masuren (Mühl.), F. F. (Czw., Stnr.).

C. bidentatum Sahlb. s. Loppehnen in trockenem Laube (Eld.).

C. serripes Sahlb. n. h. wie viennense.

C. clavigerum Hbst. s. s. Glettkau (Czw.), Neustadt (Fritzen).

C. fuscicorne Kraatz. s. s. Neustadt (Fritzen).

C. dentipes Sahlb. s. Ggbg. (Kr.).

C. appendiculatum Sahlb. s. Masuren (Mühl.); Rastenbg., Glettkau, Oliva (Czw.).

C. armipes Kraatz. s. s. Glettkau (Czw.).

C. denticulatum Kraatz. s. s. ebenso.

C. affine St. s. Neustadt (Fritzen).

C. brunneum Latr. n. s. Neuhausen, Hlgbl. (Stnr.), F. F. Oliva (Czw.).

C. latum Kraatz. s. Ggbg. (Kr.), Kbg. (Ltz., Stnr.).

Phosphuga laevigata Fabr. s. Kug. Sieb.

P. atrata L. mit var. *brunnea* Hbst. h. Kbg. (Ltz.).

P. opaca L. n. s. am Aase, Loppehnen (Eld.).

P. reticulata Fabr. n. s. Rauschen (Ltz.), Glettkau (Czw.).

Thanatophilus thoracicus L. h. in Wäldern am Aase.

T. rugosus L. h. ebenso.

T. sinuatus Fabr. n. h. ebenso

T. dispar Hbst. s. Pregelwiesen (Czw.).

Xylodrepa quadripunctata L. n. s. sucht auf Bäumen (Eichen) nach Insecten, Osterode (Kugel.), Gallgarben (Ltz.), F. F. (Czw.), Hlgbl. (Stnr.).

Silpha tristis Illig. n. h. Leesen und Gr. Zünder (Dommer), Tilsit, Pillau (Eld.), Schwarzort (Ltz.).

S. obscura L. h. Kbg. (Ltz.).

S. carinata Illig. n. s. Schwarzort (Ltz.).

S. littoralis L. ebenso, an todten grösseren Säugetieren.

Necrophorus Germanicus L. n. h. am Aase, Rauschen (Ltz.).

N. humator Goeze, n. s. ebenso.

N. vespillo h. ebenso.

N. vestigator n. h. ebenso

N. ruspator Er. *microcephalus* Thoma h. Fischhausen (Ltz.), Dz. (Czw.).

N. interruptus Steph. *fessor* Er. n. h. Loppehnen (Eld.).

N. sepultor Charp. s. Dz. (Dommer), Kalkstein bei Fischhausen (Ltz.), Hlgbl. (Stnr.).

N. mortuorum Fabr. n. h. in Pilzen, Neuhäuser (Ltz.), Dz. Kbg. (Czw.).

Agrytes castaneus Pk. s. s. Dz. Kleinhalde (Stf.).

Sphaerites glabratus Febr. s. Fchst. am Birkenasto (Sauter), Schrb. Oliva (Czw.), Vierbrüderkrug (Stnr.).

Triatlytron Märkelii Schm. s. s. Putzig im Stadtwalde (Stf.), Hochwasser bei Oliva Juli 78 1 Ex. (Czw.).

Anisotoma cinnamomea Pz. s. Sieb. Die Arten an unterirdischen Pilzen (Tuber), Neustadt (Fritzen).

A. oblonga Er. s. s. Osterode (Kugel.), Er. K. D. III p. 53 Ann.

A. Triepkili Schm. s. Lyek (Sanio), Dz. (Czw., Helm.).

A. picca Illig. s. Rauschen (Ltz.).

A. obesa Schm. s. Dz. (Kumm.).

A. brunnea St. s. Dz. (Helm.), Neustadt (Fritzen).

A. dubia Kugel. n. s. Osterode, an trocknen Weidenschwämmen, Ggbg. (Kr.).

A. silesiaca Kr. s. s. ein St. in der Sammlung der pr. Küfer des Museums. Dz.

A. ciliaris Schm. s. s. Kbg. (Ltz.), Higbl. (Stnr.).

A. ovalis Schm. s. Dz. (Frantz.).

A. rubiginosa Schm. s. s. Dz. Sieb.

A. calcarata Er. n. s. bei Fuchshöfen von Gräsern geschöpft, Juni 69 (Ltz.), Danziger Glacis, Oliva (Czw.).

A. badia St. s Schwarzort (Ltz.), Dammhof (Stnr.).

A. parvula Sahlb. n. s. in Laubwäldern des Abends von Gräsern geschöpft, Kadinen (Stf.), Masuren (Mühl.), F. F., Fuchshöfen (Sauter, Ltz., Czw.).

Cyrtusa subtetacea Gyll. s. an Baum schwämmen, Putzig (Stf.), Loppehnen (Eld.), Dammkrug (Stnr.).

C. minuta Ahr. s. Dz. (Kumm.).

C. pauxilla Schm. s. s. F. F. Juni 67 (Czw.).

Coleos dentipes Gyll. n. s. im Moose, Creuzburg (Eld.), Kadinen (Stf.), F. F., Oliva (Czw.)

Liodes humeralis Kug. n. h. in Schwämmen an alten Eichenstübben, zuweilen unter Kiefern rinde, Osterode, Warnicken (Ltz.).

L. glaber Kug. n. h. ebenso.

L. axillaris Gyll. s. ebenso.

L. serricornis Gyll. s. s. in rothfaulen Eichenstübben, Föddersdorf Mai 68 (Mühl.).

L. castaneus Hbst. s. Masuren (Mühl.).

L. orbicularis Hbst. s. aus Moos von Wund lack (Eld.), Putzig, Dz. (Stf.), Kbg. (Czw.), Hirschau (Stnr.).

Amphicydia globus Fabr. s. unter Kiefern rinde, Putzig Mai — Juni (Stf.), Vierbrüderkrug (Sauter, Stnr.).

A. globiformis Sahlb. bei Ggbg. n. s. (Kr.), F. F. (Czw.).

Agathidium nigripenne Kug. s. Osterode, in Eichenschwämmen; Memel (Nanke), Dz. (Dommer), Wehlau (Sauter), F. F. (Stnr.).

A. atrum Pk. s. Ggbg. (Kr.), F. F. Vier brüderkr. (Stnr.).

A. seminulum L. h. unter Eichen- und Kiefernrinde, Kbg. (Ltz.).

A. laevigatum Er. s. Wilkie (Eld.); Putzig, im Frühjahr an Schwämmen (Stf.).

A. badium Er. s. F. F., Vierbrkr. (Stnr.).

A. mandibulare St. s. Kbg. (Ltz.).

A. rotundatum Gyll. s. Ggbg. (Kr.), Vier brüderkrug (Stnr.).

A. nigrinum St. s. F. F. (Stnr.).

A. piceum Er. s. 1 St. in der Sammlung von Eld.

A. marginatum St. wie laevigatum.

A. haemorrhoum Er. s. Kbg. aus Moos (Eld.).

Clambidae.

Cybocephalus exiguus Sahlb. s. an Pappel stümmen, Ggbg. (Kr.), Wernsdorf (Kuwert).

Clampus minutus St. s. an faulenden Vegetabilien, Kbg. Aweiden (Stnr.).

C. Armadillo Deg. punctulum Beck. n. s. in Schwämmen, Putzig (Stf.), Dz. (Dommer).

C. pubescens Redt. n. h. Kbg. (Sauter, Ltz., Stnr.).

C. punctulum Gyll. s. Rastenburg (Czw.), Schromb. (Stnr.).

Sphaeriidae.

Sphaerius acaroides Wallt. s. Dz. (Kumm.), Kitzn., Rastenburg am Ufer der Guber unter Kies (Czw.).

Trichopterygidae.

Ptenidium formicetorum Kr. apicale Er. h. unter Ameisen und im Moose, Loppehnen (Eld.), Putzig (Stf.).

P. laevigatum Gillm. n. s. Kbg. (Ltz.).

P. pusillum Gyll. ebenso.

Ptilium elongatum Thoms. n. s. Kbg. Liep (Czw.), Plantage unter Mistbeetbrettern (Stnr.).

P. transversale Er. s. s. Heub. (Czw.).

P. minutissimum Ljung. n. s. unter Spreu, Kitzn. (Czw.).

P. inquinatum Gillm. s. h. unter Ameisen, Kbg. (Sauter, Eld.).

P. canaliculatum Gillm. n. s. ebenso.

P. angustatum Er. s. Dz. (Zebe), Kbg. Aweiden (Stnr.).

P. fuscum Gillm. s. Loppehnen (Eld.).

P. Kunzel Heer. n. s. Kbg. (Sauter, Czw., Stnr.).

Trichopteryx pumila Er. s. Kbg. aus Gerölle vom chemaligen Philosophendamm (Sauter).

T. brevipennis Er. s. ebenso (Stnr.).

T. sericans Heer. h. Kbg. (Ltz.), Putzig (Bogeng.).

T. fascicularis Hbst. h. unter feuchtem Laub (Dommer).

T. grandicollis Mannh. h. Kbg. (Czw.), F. F. (Stnr.).

T. atomaria Dej. s. h. überall.

T. thoracica Walli. n. s. Putzig, Mai — Juli (Stf.), Dammhof (Stnr.).

Pteryx suturalis Heer. s. unter Ameisen, Kbg. (Eld.).

Scaphidiidae.

Scaphidium 4-maculatum Ol. n. h. an Baumschwämmen, Zinten (Ltz.).

Scaphisoma agaricinum L. s. h. unter Rinde an Pilzen, überall.

S. boleti Pz. s. Kbg. aus Gerüsse (Sauter).

S. assimile Er. s. Kbg. Holzwiesen, Neuhausen (Stnr.).

Histeridae.

Hololepta plana Füssly. s. s. bei der Allensteinschen Glashütte in dem vermoderten Baste alter gefällter Pappeln und Birken, einige St. Mai 1793 (Kugel.); Dammhof (Dossow).

Platysoma frontale Pk. s. unter Buchenrinde (Kugel.), Zinten (Ltz.), Pr. Stargardt (Schmidt).

P. depressum Fabr. n. s. unter Abiesrinde, Zinten (Ltz.)

P. oblongum Fabr. s. Grebbiner Wald, in Eichenstubben (Dommer), Masuren (Mühl.), Schromb. (Stnr.).

P. lineare Er. s. Osterode (Kugel.), Zinten (Ltz.), Frauenburg (Czw.), Metgethen (Stnr.), an Pinustubben Neustadt (Fritzen).

P. angustatum Hoffm. s. (Sieb.)

P. filiforme Er. s. s. Kbg., unter Abiesrinde (Pfeil.).

Hister 4-maculatus L. n. h. Putzig (Stf.)

H. unicolor L. h. Kbg. (Ltz.).

H. cadaverinus Hoffm., striola Sahib. ebenso, Schromb. (Stnr.).

H. succicola Thoms. n. h. am austriesenden Eichensaft, Schrb. (Czw.).

H. terricola Germ. s. Kbg. (Ltz.).

H. merdarius Hoffm. n. s. ebenso.

H. simetarius Hbst. *sinuatus* Fabr. n. s. Loppehnen (Eld.).

H. neglectus Germ. n. h. Kbg. (Ltz.).

H. carbonarius Illig. h. ebenso.

H. ventralis Marsh. n. s. Lyck (Sanio), Dz. (Helm.).

H. purpurascens Hbst. n. s. auf sandigen Wegen im Mist, Kbg. (Ltz.).

H. marginatus Er. s. in Wäldern unter faulenden Vegetabilien, unter Rinde von Baumstübben, Dz., Putzig (Stf.), Pillau, Loppehnen (Eld.).

H. stercorarius Hoffm. h. Kbg. (Ltz.).

H. sinuatus Illig. *uncinatus* Illig. s. Dz. (Dommer), Cranz (Eld.).

H. 4-notatus Scrib. bei Lyck h. (Sanio).

H. bissexstriatus Fabr. n. s. Kbg. (Ltz.).

H. arenicola Thoms. s. Kbg. 2. St. (Stnr.).

H. bimaculatus L. s. Kapkeim (Ltz.), Glettka (Czw.).

H. 12-striatus Schrk. n. s. Tilsit, Kbg., Elbing, Putzig (Stf.), die var. *14-striatus* Gyll. seltener, Loppehnen (Eld.), Tilsit (Stf.).

H. corvinus Germ. n. h. Loppehnen (Eld.), Putzig, Mai (Stf.), Neuhiuser (Stnr.).

Carcinops pumilio Er. n. s. Seestrand, in Sandgruben (Eld., Ltz.); Putzig (Stf.), Ktz. (Czw.).

Paromalus complanatus Pz. s. unter Eichen- und Buchenrinde, Osterode (Kug.), Orteburg unter Espenrinde (Mühl.).

P. parallelepipedus Hbst. unter Kiefern-rinde (Eld., Ltz.).

P. flaviguttatus Hbst. n. h. ebenso.

Netacrius sesquicornis Preyssl. n. h. unter Ameisen, Kbg. (Eld.), unter Birkenrinde (Kugel.), Pilzenkrug (Stur.).

H. Sartorii Redt. s. s. Ggbg. (Kr.), Berl. E. Z. VII. 233.

Dendrophilus punctatus Hbst. n. h. im Kaninchendünger, Dz. (Dommer), Kbg., Pillau (Eld.); bei Ameisen, Putzig (Stf.), Ktz. (Czw.).

D. pygmaeus L. s. Dz. (Dommer), F. F. bei Ameisen (Stnr.).

Saprinus nitidulus Pk. s. h. an sandigen Ufern im Miste (Kugel.), Kbg. (Ltz.).

S. immundus Gyll. s. Conitz (Sieb.), Rauschen (Ltz.).

S. rugifer Pk. s. am Seestrande, Putzig (Stf.).

S. speculifer Latr. s. Loppehnen, Pillau (Eld.).

S. aeneus Fabr. h. an Exrementen am See-
strande (Ltz.).

S. virescens Pk. s. Gbg. (Kr.), Westpr.
(Strübing B. E. Z. IV. 322), Neuhäuser (Strn.),
Dz. (Helm).

S. conjungens Pk. s. ebenso

S. rufipes Pk. s. Schwarzort (Ltz.), Lop-
pehnen (Eld.), Insterburg (Bachmann), Dz. (Helm).

S. antiquulus Illig. wird zwar von Sieb.
angegeben, doch ist die Bestimmung wahrsch.
unrichtig gewesen. Kraatz B. E. Z. XII. 336.

S. 4-striatus Hoffm. n. s. auf der kurischen
Nehrung. Rossitten (Nanke), Schwarzort (Ltz.),
Glettkau (Czw.).

S. rugifrons Pk. g. wie aeneus.

S. metallicus Hbst. h. in sandigen Gegen-
den beim Aase u. im Miste (Kugel.), Schwarz-
ort (Ltz.), Dz. (Helm).

Gnathoncus rotundatus Kugel. n. s. Nord-
strand (Eld., Ltz., Strn.).

G. punctulatus Thoms. n. h. Dz. (Czw.,
Helm); aus Reihernestern bei Schwarzort, Pfing-
sten 78 (Czw.).

Myrmeces piceus Pk. s. im faulenden Holze
(Dommer), Putzig (Stf.), Kbg. (Strn.).

Terebrinus picipes Fabr. s. unter Buchen- u.
Eichenrinde (Kugel.), Cadinen (Stf.), in Bohr-
löchern alter Weiden auf der Pregeltrift bei
Fehstein, Juni (Pfeil, Ltz.), Kbg. neue Reiserbahn
(Czw.).

Plegaderus saucius Er. s. s. unter Baumrinde,
Dammhof (Ltz.).

P. vulneratus Pz. n. s. unter Eichen- und
Pappelrinde (Kug.), Juditten (Eld.), Dammhof
(Ltz.).

P. caesus Illig. s. unter Pappelrinde (Kug.),
Kbg. (Ltz.).

P. dissectus Er. s. s. einmal an der Wurzel
einer alten Eiche bei Schwarzort, Juli (Ltz.).

P. discisus Er. s. s. in faulendem Kasta-
nenholze (Dommer).

Onthophilus sulcatus Fabr. s. Osterode (Kug.),
Putzig (Stf.).

O. striatus Forst. s. ebenso.

Abraxas globulus Creutz. n. s. unter Mist-
beetbrettern, Kbg. (Ltz.).

A. globosus Hoffm. s. Kbg. im botan.
Garten unter Blumentöpfen (Eld.), Putzig unter
Ameisen (Stf.).

Acritus sulcipennis Fuss. s. s. einmal zwei
Stück unter einem Mistbeetbrette, Liep bei
Kbg. (Ltz.), ist nicht = punctum Aub. Reitt.
Dt. Ent. Zt. XXII. p. 50.

A. minutus Hbst. g. unter faulenden Vege-
tabilien.

Phalacridae.

Phalacrus corruscus Pk. h. auf Blumen u.
Sträuchern, Kbg. (Ltz.).

P. grossus Er. s. Kbg. aus Moos (Eld.).

P. substriatus Gyll. s. Loppehnen (Eld.).

P. caricis St. s. Neuhäuser (Strn.), Putzig
(Stf.).

Olibrus corticalis Pz. n. s. Kbg. (Ltz.), Dz.
(Fritzen, Czw.).

O. aeneus Fabr. h. überall.

O. bicolor Fabr. n. s. Kbg. (Ltz.).

O. liquidus Er. s. Neustadt (Fritzen).

O. affinis St. s. Dammhof (Strn.).

O. millefolii Pk. h. auf Syngenesisten,
überall.

O. pygmaeus St. s. Neuhäuser (Ltz.), auf
Epilob. angustif. Neustadt (Fritzen).

O. testaceus Pz. geminus Illig. h. Kbg.
(Ltz.).

O. atomarius L. piceus Steph. n. h.
ebenso, F. F. (Czw.). Neustadt (Fritzen).

Nitidulariae.

Cercus pedicularius L. g. auf Thymus,
Rauschen (Ltz.).

Brachypterus pubescens Er. n. h. Kbg. (Ltz.).

B. urticae Fabr. g. auf blühender Urtica
dioica.

B. gravidus Illig. n. h. wie pubescens.

B. cinereus Heer. Schwarzort, ausschlie-
lich in den Blüthen der Linaria Loeselii zahlreich
(Czw.).

Carpophorus hemipterus L. s. s. Putzig (Stf.).

Euparaea limbata Fabr. n. s. unter Rinde
von Apfel- und Birnbäumen (Kugel.), Putzig, in
Löcherpilzen (Stf.).

E. 10-guttata Fabr. s. am Saft v. Eichen
und Buchen (Kugel), Blaustein (Ltz.), Neuhausen
(Strn.).

- E. silacea* Hbst. s. (Sieb.).
E. aestiva L. mit var. *bisignata* St. s. h. auf Blüthen.
E. melina Er. ebenso.
E. delete Kr. s. am Seestrande (Eld.).
E. immunda Er. s. ebenso (Eld., Ltz.).
E. neglecta Heer. n. s. am Birkenasten, Apr. Mai (Dommer, Ltz.).
E. variegata Hbst. h. Kbg. (Ltz.).
E. obsoleta Fabr. h. ebenso.
E. borealis Zett. s. s. aus einer Ostpr. Forst (Dossow).
E. pygmaea Gyll. h. Zinten (Ltz.).
E. pusilla Illig. s. Osterode, unter Weidenrinde (Kugel.), Ludwigsort (Ltz.), Dz. (Helm).
E. florea Er. h. Osterode an Birnbäumen (Kugel.), Kbg. (Ltz.).
Nitidula bipustulata L. s. an thierischen Stoffen, Kbg. (Ltz., Stnr.).
N. obscura Fabr. n. h. im Grebbiner Walde, einmal an einem toden Igel zahlreich (Dommer), Kbg. aus Moos (Eld.).
N. 4-pustulata Fabr. s. Gr. Zündler, in toden Maulwürfen (Dommer), Rauschen (Ltz.).
Omorita depressa L. s. am Eichensaste (Dommer), aus Moos von Rosenberg (Eld.), an einem toden Reiher in Schwarzort (Czw.).
O. colon L. g. überall.
O. discoidea Fabr. s. Osterode unter Eichenrinde (Kugel.), Elbing (Ltz.).
Soronia punctatissima Illig. n. s. am Saft von Eichen, Birken, Espen (Kugel., Dommer); Liep, Georgenswalde (Ltz.), Dz. (Helm), Fehst. (Stnr.).
S. grisea L. g. an Wiesen u. am Eichenasten.
Amphotis marginata Fabr. s. Masuren (Mühl.), Oliva (Czw.).
Ipidia 4-notata Fabr. s. Masuren, unter morscher Birkenrinde, Septbr. (Mühl.)
Pris dulcamarae Scop. s. Dz., im Frühjahr am Seestrande (Dommer), Rosenberg (Eld.), Rauschen (Ltz.), Osterode s. h. auf *Lyium europ.* (Kugel.).
Meligethes rufipes Gyll. s. Sieb.
M. hebes Er. s. Dz. (Frantz.).
M. pumilus Er. s. Kbg. (Czw.).
M. coracinus St. n. s. ebenso, Dz. (Dommer).
M. coeruleovirens Forst. n. s. Kbg. auf Weizen (Czw.).
M. aeneus Fabr. g. überall.
M. viridescens Fabr. h. Kbg. (Ltz.), var. *azoreus* s. Kbg. (Czw.).
M. symphyti Heer. h. ebenso.
M. subrugosus Gyll. s. Dx. Aug. (Czw.).
M. serripes Gyll. s. ebenso.
M. umbrosus St. s. Georgenswalde (Czw.).
M. maurus St. s. Dz., Hlgbl. (Czw.).
M. incanus St. s. Kbg. (Czw.).
M. picipes St. h. ebenso.
M. memnonius Er. n. s. ebenso.
M. ochropus St. n. s. auf *Lamium album*, Dz. (Czw.).
M. difficilis Heer. mit var. *Kunzei* Er. n. s. ebenso.
M. morosus Er. h. wie *ochropus*, Dirschau (Czw.).
M. viduatus St. h. Dz. (Czw.).
M. pedicularius Gyll. n. s. ebenso.
M. assimilis St. s. ebenso.
M. aestimabilis Reitt. s. Ggbg. (Kr.) B. E. Z. XVI. 133. II.
M. tristis St. h. auf *Echium vulgare*, Lyck (Sanio), Kbg. (Czw.).
M. gagatinus Er. h. Kbg. (Ltz.).
M. exilis St. s. Dz. (Czw.).
M. erythropus Gyll. s. Ggbg. (Kr.).
M. solidus St. Osterode (Kug.), aber nicht wieder gefunden.
Thalygra sericea St. n. h. auf *Spiraea ulm.* Craan (Ltz.), Oliva (Czw.).
Pocadius ferrugineus Fabr. n. s. in Staubpilzen, Rauschen (Ltz.), Dz. (Czw.), Hlgbl. (Stnr.).
Cychramus 4-punctatus Hbst. n. h. von Abies geklopft, Löwenhagen (Ltz.).
C. fungicola Heer. h. in Pilzen, Dz., Putsig (Stf.), Kleinhalde (Eld.).
C. luteus Fabr. s. h. auf *Spiraea ulm.*
Strongylus (Cylloides) ater s. s. in morschem Kieferholz, Masuren (Mühl.), Wilkie an einem Birkenstubben (Pfeil).
Cryptarca strigata Fabr. n. s. am Eichenasten, Dz. (Dommer, Helm), Georgenswalde (Ltz.), Mehlsack (Eld.).
C. imperialis Fabr. n. s. ebenso, Neuhäusen (Stnr.).
Ips 4-guttatus Fabr. s. unter Eichenrinde (Kugel.), Kbg. Holzstellen (Stnr.), Damshof (Kuwert).

I. 4-punctatus Oliv. n. s. im Frühjahr auf Stubben, Kbg. (Ltz.).

I. 4-pustulatus L. n. s. ebenso.

I. ferrugineus Fabr. n. s. an Eichen, Kbg. (Ltz.), Vierbrüderkr. (Strn.).

Rhizophagus grandis Gyll. s. s. Putzig (Stf.).

R. depressus Fabr. s. h. unter Rinde von Abiesstubbchen.

R. cibratus Gyll. s. Dammhof unter Abiesrinde 2 St. (Ltz.).

R. ferrugineus Pk. n. s. Wilkie (Eld.), Vierbrüderkr. (Strn.).

R. parallelocollis Gyll. einmal h. an einem schönen Sommerabend auf dem Altrossg. Kirchhof umherfliegend, Kbg. (Ltz.).

R. nitidulus Fabr. n. s. Margen an Birkenstubbchen (Ltz.).

R. dispar Pk. n. s. Loppehnen (Eld.), Putzig (Stf.).

R. bipustulatus Fabr. s. h. unter Eichen-, Abiesrinde, Kbg. (Ltz.).

R. politus Hellw. s. unter Abiesrinde, Osterode (Kugel.), Mehlsack (Eld.).

R. coeruleipennis Sahlb. s. Kbg. bei Moosbude 2 St. (Ltz.), Pregelwiesen (Czw., Strn.).

R. parvulus Pk. s. unter Pappelrinde Kbg. (Ltz.), Albrechtsthal bei Wehlau (Sauter).

Trogositidae.

Nemorema elongatum L. n. h. unter Kiefern-, Buchen-, Weidenrinde, Dahlheim (Wohlfroth), Perkkappen (Ltz.), Putzig (Stf.), Kbg. (Eld.).

Tenuochila coerulea Oliv. von 3 pr. St. berichtet Kugel., wovon 1 bei Kbg., aber nicht wieder gefunden.

Trogosita mauritanica L. caraboides Fabr. s. s. durch den Handel eingeführt bei Apothekern (Naumann), aber auch unter Weidenrinde (Sieb.).

Peltis dentata Fabr. s. s. unter Rinde von Kiefernstubbchen, Cadienen (Stf.).

P. grossa L. s. unter Eichenrinde, Elbing (Sieb.), Zinten (Ltz.).

P. ferruginea L. s. in Falten der Baum-schwämme, in altem Holze (Kugel.), Dz. (Czw.)

P. oblonga L. n. s. an Weidenschwämmen, Kbg. (Ltz.).

Thymalus limbatus Fabr. s. s. Osterode unter Kiefernrinde (Kug.), Masuren unter Eichenrinde 3 St. (Mühl.).

Celydiidae.

Sarrotrium clavicone L. h. bei Loppehnen in Sandgruben (Eld.), Rauschen, Neuhäuser (Strn.).

Ditoma crenata Hbst. h. unter Birkenrinde, Löwenhagen (Ltz.).

Synchila juglandis Fabr. obscura Redt. s. unter Rinde von Birnbäumen (Kug.), Birken, Erlen und Linden (Ltz., Czw., Fritzen).

Cleones variegatus Hellw. s. s. Stadtwald zu Neustadt, aus einer abgestorbenen Buche (Fritzen).

Colydium elongatum Fabr. Osterode, in altem Eichenholz (Kug.), aber seitdem nicht wieder gefunden.

C. filiforme Fabr. s. Putzig, unter Eichenrinde (Stf.); einige alte Eichen bei Liep und Moosbude haben mir zahlreiche Stücke geliefert, wo sie in Bohrlöchern wohnen, Juni (Ltz.).

Aglenus brunneus Gyll. s. an Mistbeeten bei Dz. und Putzig (Stf.), Kbg., Liep (Czw.).

Bothrideres contractus Fabr. s. Kug., Sieb.

Cryphon hysteroides Fabr. h. unter Buchen-, Kiefern- und Eichenrinde, Kbg. (Ltz.).

C. angustum Er. s. Blaustein aus Buchenstubbchen (Ltz.), Neustadt (Fritzen).

C. impressum Er. s. Hlgbl., unter Rinde von Kiefern (Czw.), von Buchen, Neustadt (Fritzen).

C. deplanatum Gyll. s. unter Pappelrinde, Kbg. (Sauter), unter Carpinusrinde, Fehst. (Ltz.).

Cucujidae.

Prostomis mandibularis Fabr. von Senator Schneider als preussischen Käfer erhalten unter dem Namen Cucujus maxillosus (Kug.), später nicht wieder gefunden.

Cucujus haematodes Er. s. s. unter Kiefern- und Eichenrinde (Kug.), Putzig (Stf.).

Dendrophagus cronatus Pk. s. unter Eichenrinde in Masuren (Mühl.), unter Birkenrinde in einem Holzgarten in Kbg. (Ltz.), Domzin bei Labiau (Wahnschaffe).

Brontes planatus L. *flavipes* Fabr. unter versch. Rinden (Kug.). Memel (Nanke), Kbg. auf den Holzwiesen (Ltz., Strn.).

Laemophloeus denticulatus Preyssl. *monilis* Fabr. s. unter Lindenrinde, Putzig (Stf.), Domnau (Sauter), Liep (Ltz.), Fehstein. (Strn.).

L. muticus Fabr. unter Birnbaumrinde (Kug.), nachher nicht wieder gefunden.

L. himaculatus Pk. s. unter Birkenrinde, Putzig (Stf.).

L. testaceus Fabr. s. unter Baumrinde, Kadinen (Stf.).

L. duplicatus Wall. s. unter Abiesrinde, Loppehnen (Eld.), Dz. (Kumm.).

L. ferrugineus Steph. s. s. Kbg. an Birkenholz auf der Altstädtischen Holzwiese, 1 Stück (Ltz.).

L. ater Oliv. s. s. am Harzausfluss einer Abies in Masuren, Juli 03 (Mühl), und zwar die rothe Var., Dz. in Speichern an altem Brode (Fritzen), Ggbg. (Kr.).

L. corticinus Er. s. s. unter Baumrinde Putzig (Stf.).

Pediocaea dermestoides Fabr. s. s. nur einmal bei Osterode unter Eichenrinde (Kugel.), ein preuss. St. besitzt Schleiferdecker.

Pramnoechus bipunctatus Fabr. bei Osterode s. h. in einer feuchten Gegend unter abgemüthetem Schilf (Kugel.), Kitzn. (Czw.), Neuhäusen (Strn.).

Nausibius dentatus Marsh. s. s. einmal unter Buchenrinde bei Putzig (Stf.), einmal Dz. (Helm).

Silvanus frumentarius Fabr. *sex dentatus* Febr. s. Kbg. in einem Garten (Eld.).

S. bidentatus Fabr. n. h. aus Moos von Wundlack (Eld.), Wilkie, Blaustein (Ltz.).

S. unidentatus Fabr. n. s. unter Buchen- und Eichenrinde (Kug.), Fehstein (Ltz.), Kbg. Holzwiesen (Strn.).

S. similis Er. s. s. Holstein an der Pregel-mündung 1 St. (Czw.).

Airaphilus elongatus Gyll. bei Dz. auf dem Dünengraste h. (Erichs. K. D. III, 340. 7).

Monotoma conicollis Aub. *angusticollis* Thoms. h. in Ameisenhaufen, Kbg. (Eld.).

M. angusticollis Gyll. *formicetorum* Thoms. s. Cranz (Ltz.).

M. spinicollis Aub. n. s. an Scheunen-wänden, Liep (Ltz.).

M. 4-foveolata Motsch. s. s. Dz. (Helm).

M. brevicollis Aub. s. in trocknem Miste, Putzig (Stf.).

M. picipes Hbst. n. s. Ggbg. (Kr.), Neustadt (Fritzen), Cranz (Ltz.).

M. longicollis Gyll. s. Neustadt (Fritzen), Putzig (Stf.).

Hypocoprus lathridioides Motsch. s. in den Dünen von Glettkauf, bei Oliva in trocknem Ziegenmiste (Czw.).

Cryptophagidae.

Telmatophilus caricis Oliv. u. s. Dzer. Neh-rung, Putzig (Stf.), Kbg. (Ltz.).

T. brevicollis Aub. n. s. auf *Typha*, Bleu-stein (Ltz.), Kbg. Holzwiesen (Strn.).

T. typhae Fall. s. von Blumen und Schilf geschöpft (Dommer), am Pregel (Czw., Strn.).

T. pumilus Reitt. s. von einer Pregelwiese 1 St. (Czw.).

T. Schönherri Gyll. s. bei Glettkauf 1 St. (Czw.).

Anthrophagus nigricornis Fabr. s. (Sieb.).

A. silaceus Hbst. n. h. Galtgarben (Eld.), Putzig auf Umbellaten (Stf.), Warnicken (Ltz.).

A. pallens Oliv. n. h. Löwenhagen (Ltz.).

Emphyllus glaber Gyll. s. von Blumen ge-schöpft (Dommer), unter Ameisen Putzig (Stf.), F. F. (Strn.).

Henoticus (Paramecosoma) serratus Gyll. s. Dz. (Sieb.).

Cryptophagus crenatus Gyll. *crenulatus* Er. s. Kbg. aus Moos (Eld.), Putzig (Stf.), F. F. (Strn.).

C. Lycoperdi Hbst. n. s. in Staubpilzen (Kug.), Rauschen (Ltz.).

C. pilosus Gyll. n. s. Kbg. (Ltz.).

C. setulosus St. s. ebenso (Ltz., Czw.), in Blätterpilzen an Buchen, Neustadt (Fritzen).

C. Schmidii St. s. ebenso.

C. affinis St. n. s. Loppehnen (Eld.), Putzig (Stf.).

C. cellaris Scop. n. h. im Moos aus der Caporn. Hajde (Eld.), Putzig (Stf.).

C. acutangulus Gyll. ebenso, Kitzn. in Spreu (Czw.).

C. fumatus Marsh. s. Putzig (Stf.).

C. quercinus Kraatz h. Kbg. (Ltz.).

C. badius St. s. Kbg. (Sauter), Putzig (Stf.).

- C. labilis* Er. s. Kbg. (Ltz.); unter Spreu, Ktnz. (Czw.).
- C. bicolor* St. n. s. unter Ameisen (Eld.), Putzig (Stf.), Ggbg. (Kr.).
- C. saginatus* St. s. Dz. (Frantz.).
- C. dentatus* Hbst. n. s. wie affinis.
- C. scanicus* L. mit var. *cellaris* St. h. in Hilzern, auch unter Baumrinde (Kug.), Kbg. (Ltz.).
- C. dorsalis* Sahlb. s. wie affinis, Schwarzort (Czw.).
- C. subdepressus* Gyll. s. Kbg. (Ltz., Czw.), Neustadt (Fritzen).
- C. lapponicus* Gyll. pubescens St. s. s. Glettka (Czw.).
- C. bimaculatus* Pz. s. Dz. (Dommer), Oliva (Czw.), Kbg. (Ltz.).
- C. vini* Pz. s. Kbg. von einer Abies geklopft (Ltz.)
- Paramecosoma abietis* Pk. h. von Abies geklopft (Ltz.), Loppehnen (Eld.), Putzig (Stf.).
- P. pilosulum* Er. n. s. Ggbg. (Kr.), nach Thoms. = *Cryptophagus vini* Pz.
- P. melanoccephalum* Hbst. n. h. aus Moos (Sauter), Putzig (Stf.), Pregelwiesen (Czw.).
- Atomaria fimetarii* Hbst. s. s. Dz. (Czw.).
- A. umbrina* Gyll. sumata Er. z. h. an Baumschwämmen bei Schrb. (Czw., Star.).
- A. linearis* Steph. n. s. Kbg. (Ltz.).
- A. elongatula* Er. s. Ggbg. (Kr.), Pregelwiesen (Czw.).
- A. nana* Er. h. aus Moos von Zimmerbude (Eld.), Putzig (Stf.).
- A. impressa* Er. s. Kbg. (Czw.), Neustadt (Fritzen).
- A. munda* Er. n. s. wie nana.
- A. nigripennis* Pk. s. Dz. (Kumm.).
- A. cognata* Er. s. aus Moos, Kbg. (Sauter).
- A. gravidula* Kr. s. ebenso (Eld.).
- A. fuscata* Schh. h. ebenso, Putzig (Stf.).
- A. pusilla* Pk. n. s. ebenso.
- A. atricapilla* Steph. *nigriceps* Er. s. Dz. (Czw., Fritzen).
- A. atra* Hbst. n. s. Kbg. (Ltz.).
- A. basalis* Er. n. h. Putzig (Stf.).
- A. mesomelas* Hbst. h. Kbg. (Ltz.).
- A. gutta* Steph. h. Kbg. Holzwiesen (Star., Ltz.).
- A. fuscipes* Gyll. n. h. wie basalis, Kbg. (Star.).
- A. turgida* Er. s. wie nana.
- A. versicolor* Er. s. wie basalis.
- A. analis* Er. n. s. ebenso.
- A. apicalis* Er. n. h. wie nana.
- A. ruficornis* Marsh. *terminata* Com. h. ebenso.
- A. gibbula* Er. s. ebenso.
- Ephistemus globosus* Waltl. s. Dz. (Czw.).
- F. F. (Star.).**
- E. globulus* Pk. *ovulum* Er. *dimidiatus* St. h. im Moose von Zimmerbude (Eld.), unter faulenden Vegetabilien Putzig (Stf.), Kbg. Holzwiesen (Star.).
- E. exiguum* Er. seltener, ebenso.

Lathridiidae.

Myrmecoxenus subterraneus Chevr. h. unter den kleinen gelben Ameisen (Dommer, Stf., Eld.); F. F., Dammhof (Star.).

M. vaporariorum Gnér. einmal h. bei Ggbg. in einem auf Ameisen liegenden Unkrauthausen (Kr.).

Lathridius lardarius Deg. s. h. im Moose.

L. angulatus Mannh. s. Masuren (Mühl.).

L. angusticollis Humm. n. s. Dz. (Frantz.), Bloustein (Ltz.), Kbg. (Czw.).

L. alternans Mannh. s. Loppehnen (Eld.), Neuhäuser im Eichenschwamm 2 St. (Ltz.).

L. rugicollis Oliv. Ludwigsort (Ltz.).

L. carinatus Gyll. s. s. Dz. 1 St. (Helm.).

L. constrictus Humm. s. s. (Sleb.).

L. hirtus Gyll. n. s. Kbg. an Weidenstümmen (Ltz.).

L. minutus L. g. überall.

L. anthracinus Mannh. s. ist eigene Art (Seidl. Fn. Balt. p. 167). Ggbg. (Kr.), Neustadt (Fritzen).

L. rugosus Hbst. n. s. Kbg. (Ltz.).

L. transversus Oliv. n. s. an Scheunenwinden (Dommer, Ltz.).

L. elongatus Curt. s. Putzig (Stf.).

L. liliiputanus Villa. n. s. wie E. transversus, Liep (Ltz.).

L. collaris Mannh. s. Loppehnen (Eld.).

L. filiformis Gyll. n. h. Putzig (Stf.).

Corticaria pubescens Gyll. *piliger* Mannh. n. s. im Moose, Kbg. (Ltz.).

C. cylindrica Mannh. s. Neustadt (Fritzen).

- C. crenulata* Gyll. h. Kbg. (Ltz.).
C. fulva Com. s. wie cylindrica.
C. denticulata Gyll. n. h. ebenso.
C. longicornis Hbst. s. Dz. (Frantz., Fritzen).
C. formicetorum Mannh. n. s. Kbg. (Ltz.), Putzig (Stf.); unter Ameisen, Vierbrkr. (Stnr.).
C. serrata Pk. h. Kbg. (Ltz.).
C. linearis Pk. s. Sieb.
C. soveola Beck. n. h. Dz. an Gebäuden (Dommer).
C. elongata Humm. n. h. Loppehinen (Eld.).
C. gibbosa Hbst. g. überall.
C. transversalis Gyll. h. Dz. (Frantz.), Ggbg. (Kr.).
C. distinguenda Com. s. Kbg. aus Baummoos (Sauter).
C. similata Gyll. parvula Mannh. s. Neustadt (Fritzen).
C. fuscula Humm. trifoveolata Redt. n. s. wie *distinguenda*, Kbg. (Ltz.).
C. truncatella Mannh. s. ebenso.

Mycetophagidae.

- Mycetophagus 4-pustulatus* s. h. in Weiden-schwämmen.
M. piceus Fabr. variabilis Hellw. n. s. F. F. (Stnr.), Kbg. (Ltz.).
M. 10-punctatus Fabr. s. Dz. (Helm), Wernsdorf (Kuwert).
M. atomarius Fabr. n. s. Wilkie (Eld.), Kleinhalde (Stnr.).
M. multipunctatus Hellw. n. s. im Eichen- und Weidenschwamm, Morgen (Ltz.).
M. fulvicollis Fabr. s. Wicken, an alten Kastanienbäumen (Sauter), Kopkeim (Ltz.).
M. populi Fabr. s. F. F. (Stnr.).
M. 4-guttatus Müll. s. Spittelhof (Eld., Ltz.), Kbg. Holzwiesen (Stnr.), Dz. (Helm).
Triphyllus punctatus Fabr. s. Warnicken (Ltz.), Dz. (Czw.).
Litargus bifasciatus Fabr. h. an Birken, Morgen, Kbg. Holzwiesen (Czw., Stnr., Ltz.).
Typhaea sumata L. g. an Ställen u. Scheunen überall.
Diphyllus lunatus Fabr. s. s. einmal bei Putzig, Juni (Stf.).

Dermestidae.

- Dermestes vulpinus* Fabr. s. Lyck (Sanio).
D. Frischii Kug. s. Osterode einmal an Aase angetroffen (Kugel.), Dz. (Fritzen, Czw.).
D. murinus L. n. s. am Aase, Rauschen (Ltz.), Schwarzort in Reihernestern (Czw.).
D. atomarius Er. z. h. unter Pflanzenresten am sandigen Ufer des frischen Hasses, Morgen (Ltz.), Neuhäuser (Stnr.).
D. mustelinus Er. s. Grebbiner Wald, an einem todteten Fuchse (Dommer).
D. laniarius Illig. affinis Gyll. n. s. Morgen (Ltz.); merkw. kleine Expl. Dz. (Helm).
D. cadaverinus Fabr. s. Ggbg. (Kr.), Lyck (Sanio).
D. lardarius L. g. überall.
D. bicolor Fabr. in Taubenschlägen n. s. (Dommer), Ktzn. (Czw.). Die Larven leben zum Theil parasitisch im Fleische der Vögel, auch an Stockfisch in Speichern (Fritzen).
Attagenus pellio L. g. überall.
A. Schüfferi Hbst. n. s. Osterode, auf Umbellaten (Kug.), Moosbude an Schwämmen (Ltz.).
A. megatomia Fabr. n. s. an Weidenblüthen Loppehinen, Kobbelbude (Eld., Ltz.).
A. 20-guttatus Fabr. s. s. Tolkemit am frischen Haff (Sieb.).
A. pantherinus Ahr. s. s. einmal Ludwigsdorf bei Ggbg. an Käsekästen (Kr.).
Megatoma undata L. n. s. auf blühenden Obstbäumen; die Larven nähren sich von Blatt-wespenlarven, Wernsdorf (Kuwert).
Hadrotoma marginata Pk. n. h. Moosbude (Ltz.), Schwarzort (Czw.).
Trogoderma elongatum Dst. s. s. Osterode, an alten Zäunen (Kug., Sieb.).
T. nigrum Hbst. s. s. auf Umbellaten, Putzig (Stf.).
Tiresias serra Fabr. s. Osterode an alten Buchen (Kug.), Dz. (Czw.), Kbg. an alten Weiden (Pfeil, Ltz.), Kahlberg (Stnr.).
Anthonomus scrophulariae L. s. h. auf Garten-blumen, namentlich *Saxifraga caespitosa* (Ltz.)
A. pimpinellae Fabr. s. Dz. (Czw.), Osterode (Kug.).
A. verbasci L. varius Fabr. s. Putzig (Stf.).
A. signatus Er. s. s. in der F. F. 1 Stück (Czw.).

A. museorum L. leider überall g.
A. claviger Er. s. Kbg. (Star.), auf Umbeljäten in Gärten, Neustadt (Fritzen).
Trimodes hirtus Fabr. n. s. Osterode auf *Corylus* (Kug.), Kbg. auf Eichen und Weiden (Ltz.), Oliva an Ulmen (Czw.).

Byrrhidae.

Nosodendron fasciculare Oliv. s. s. Sieb.
Syneclypta setigera Illig. s. an feuchten Stellen im Felde, Ggbg. (Kr.), Loppehnen (Star.).
S. spinosa Rossi. s. ebenso.
Byrrhus Dennyi Curt. s. s. Lyck 1 Stück (Sanio).
B. pilula L. h. Rauschen auf Sandboden (Ltz.).
B. fasciatus Fabr. h. ebenso.
B. dorsalis Fabr. n. s. ebenso.
B. murinus Fabr. h. ebenso.
Cytius varius F. h. in trocknen sandigen Waldgegenden (Kug.), Dz. (Helm); die var? *suriconus* Dft., Kbg. Pregelwiesen (Czw., Df. Ent. Z. XXII. 205).
Morychus aeneus F. n. s. Rauschen in Sandgruben (Ltz.), Dz. (Czw.).

M. nitens Pz. s. Ggbg. (Kr.), Neuhäuser (Star.).

Simplicaria metallica St. s. Putzig (Stf.), Ggbg. (Kr.).

S. semistriata Fabr. n. s. Kbg. bei Rosenau (Ltz.).

Limnichus pygmaeus St. s. Loppehnen (Eld.), Kbg. Neue Bleiche (Czw.).

L. sericeus Dft. s. am Seeufer bei Fischhausen 2 St. (Ltz.), am Pregel (Star.).

Geoyssidae.

Geoyssus pygmaeus Fabr. n. s. am Ufer des Lauthschen Teiches (Eld., Ltz.), Dz., Gießkau (Czw.), Radaune (Helm).

Parmidae.

Parmus prolifericornis Fabr. g. in Wasserpfützen auf Wiesen. Die var. *bicolor* Curt. Ggbg. (Kr.).

P. griseus Er. s. Kbg. Dammhol (Pfeil).
P. lutulentus Er. n. s. Kbg. Neue Bleiche (Czw.).
P. auriculatus Pz. n. s. Kbg. (Ltz.), Memel (Star.).
P. nitidulus Heer. s. Dz. (Helm).
Limnus tuberculatus Müll. s. Masuren (Mühl.).
L. troglodytes Gyll. s. in einem Waldbach unter Steinen, im Frühjahr, Putzig (Stf.).
Elnis aenous Müll. h. Rauschen, Loppehnen im Mühlbach (Eld., Ltz.); Dz., Neustadt, Putzig (Stf.).
E. obscurus Müll. s. s. Osterode (Kug.), aber nicht wieder gefunden.
E. cupreus Müll. s. Dz. im Mühlensieße bei Brentau (Fritzen, Helm.).
E. Volkmarii Pz. h. mit *aeneus* (Eld., Stf.).
E. opacus Müll. s. mit *aeneus* (Stf.).
E. Müllerii Er. s. Pohibels (Sauter).
Macronychus 4-tuberculatus Müll. s. s. in Pfützen, die mit Chara gefüllt sind: durch Rühren mit einem Stocke bringt man das träge Thier in Bewegung, Osterode im Spätsommer (Kug.), aber bisher nicht wieder gefunden.

Heteroceridae.

Heterocerus marginatus Fabr. s. macht wie die Maulwürfe Gänge im Lehm und Sand, welche man auf der Oberfläche bezeichnet findet (Kug.), Schwarzt (Ltz.).

H. intermedius Ksw. s. am Radauneuer (Dommer, Fritzen).

H. hispidulus Ksw. n. s. ebenso, Rhedathal bei Neustadt (Fritzen).

H. obsoletus Curt. s. am Seestrande bei Schwarzt (Ltz.).

H. laevigatus Pz. s. ebenso, Dz. (Fritzen).

H. fusculus Ksw. n. s. am Rande von Lehmpfützen, Wernsdorf (Kuwert), Kbg (Czw.), Dz. (Helm.).

Lucanidae.

Lucanus cervus L. s. an Eichen in der Warnecker Forst, Geltgarben (Ltz.), die var. *hircus* Hbst. auf Kartoffelfeldern bei Rauschen (Ltz.).

Dorcus parallelepipedus L. n. s. ebenso.

Platycerina caraboides L. *rufipes* Hbst.
Osterode, an Eiern und Eichen s. h. (Kug.),
sonst n. h. Warnicken (Ltz.).

Cruculus tenebrioides Fabr. s. s. Lötzen
(Eld.), Tilsit (Sieb.).

Sinodendron cylindricum L. n. s. im Mulf
alter Weiden, Eichen und Buchen, Rauschen
(Ltz.).

Scarabaeidae.

Copris lunaris L. n. s. im Pferdedünger auf
den Wiesen am Galtgarben (Ltz.), Higbl. (Stnr.).

Onthophagus Schreberi L. n. s. im Rinder-
düniger, Rauschen (Ltz.), Higbl. (Stnr.).

O. taurus L. n. h. im Rinderdüniger, Pillau,
Kahlberg (Ltz.).

O. nutans Fabr. s. s. bei Kbg. (Kug., Sieb.).

O. austriatus Pz. bei Lyck im Kuhdüniger
auf sandigen Feldern h. (Sanlo). Tilsit am Rom-
binus (Nanke).

O. vacca L. *medius* Pz. g. überall.

O. coenobita Hbst. n. s. Kbg. Sternwarte
an Exrementen (Ltz.).

O. fracticornis Preyssl. h. wie vacca.

O. nuchicornis L. h. Neuhäuser (Ltz.,
Stnr.).

O. camelus Fabr. s. s. bei der Allenstein-
schen Glashütte auf sandigem Wege, Juni 1780
(Kug.), aber nicht wieder gefunden.

O. ovatus L. n. h. Kbg. (Kug., Sieb.).

Oniticellus flavipes Fabr. s. s. Osterode
(Kug.), Thorn (Czw.), im Kuhdüniger, Ohra bei
Dz. (Fritzen).

Aphodius erraticus L. h. Kbg. (Ltz.).

A. subterraneus L. h. ebenso.

A. fossor L. mit var. *sylvaticus* Ahr. n. s.
ebenso.

A. haemorrhoidalis L. h. im Schafmist,
Loppehnen (Eld.), Lyck (Sanlo).

A. scybularius Fabr. bei Osterode g. (Kug.),
bei Kbg. nicht bemerkt, bei Dz. s. (Helm.).

A. foetens Fabr. g. überall.

A. simetarius L. ebenso.

A. ater Deg. *terrestris* Fabr. n. s. im
Pferdedünger Dz. (Dommer), Neuhäuser (Stnr.).

A. constans Dr. s. Nehrung bei Pillau
(Sauter).

A. granarius L. h. Kbg. (Ltz.).

A. putridus Hbst. *foetidus* Fabr. n. s.
wie ater, Ggbg. (Kr.), Fahrwasser bei Dz.
(Dommer), Galtgarben (Eld.).

A. sordidus Fabr. h. Kbg. (Ltz.).

A. rufescens Fabr. s. Danziger Sanddünen
(Czw.).

A. lugens Creutz. s. frische Nehrung bei
Pillau (Sauter), Ggbg. (Kr.).

A. nitidulus Fabr. n. s. Kbg. (Ltz.).

A. immundus Creutz. s. ebenso.

A. bimaculatus Fabr. n. s. im Schafdünger,
Dz. (Dommer).

A. niger Pz. s. Damnhof, Neuhäuser (Stnr.),
Schwarzort (Czw.).

A. plagiatus L. n. s. am Pregeldamm (Ltz.),
Neuhäuser (Stnr.).

A. inquinatus Fabr. g. überall.

A. melanostictus Schm. n. s. im Pferde-
düniger Kbg. (Ltz.), Lyck (Sanlo).

A. sticticus Pz. n. h. Putzig (Stf.), Kbg.
(Ltz.)

A. conspurcatus L. s. Blaustein (Ltz.).

A. tessulatus Pk. s. (Sieb.).

A. maculatus St. s. Neustadt (Fritzen).

A. Zenkeri s. s. 1 St. Juli 78 im Walde
bei Oliva (Czw.).

A. lutarius Pk. s. s. Grebbiner Wald (Dom-
mer), Bludauer Forst (Eld.), Masuren (Mühl.).

A. scofa Fabr. s. s. Osterode (Kug.), Lyck
im Schafsmist (Sanlo), Dz. (Helm.), Neustadt
(Fritzen).

A. tristis Pz. s. Dz. (Czw.).

A. pusillus Hbst. h. Kbg. (Ltz.).

A. 4-guttatus Hbst. s. auf den Rauschener
Dünen im Pferdedünger (Ltz.).

A. 4-maculatus L. s. ebenso, Caporn.
Haido (Nanke), Nahrungsforst im Rehdünger
(Dommer), Galtgarben (Eld.).

A. merdarius Fabr. h. Kbg. (Ltz.).

A. prodromus Brahm. g.

A. punctatosulcatus St. g.

A. contaminatus Hbst. s. s. Osterode
(Kug.), aber bisher nicht wieder gefunden.

A. rufipes L. n. h. Warnicken (Ltz.).

A. bipunctatus Fabr. Osterode auf sandi-
gen Wegen im Pferdedünger (Kug.), war bis
etwa 1840 bei Braunsberg nicht gerade selten,
ist aber seitdem verschwunden.

A. liridus Pk. mit der ganz schwarzen
var. g.

A. depressus Kug. n. s. im Pferde- und Rinderdünger, Osterode, Dz., Lyck (Kug., Dommer, Sanio).

A. pecari Fabr. s. an Exrementen Dz. (Dommer).

A. arenarius Oliv. h. Kbg. (Ltz.).

Oxyomus sus Hbst. n. h. an Exrementen, Rauschen (Ltz.).

O. testudinarius Fabr. s. in trockenem Pferdedünger, Morgen (Ltz.).

O. villosus Gyll. s. s. 2 St. Juli 78 im Walde bei Oliva (Czw.).

O. porcatus Fabr. s. h. Kbg. in den Speicherställen (Ltz.).

Rhyssomus germanus L. asper Fabr. n. h. Kapkoim (Ltz.), Dz. (Helm).

Praemodius vulneratus St. n. s. in Sandgruben bei Ludwigsort (Ltz.), Hlgbl. (Stnr.).

P. sulcicollis Illig. z. s. Schwarzort (Ltz.), Dz. (Helm), Hlgbl. (Stnr.).

Aegialia sabuleti Pk. s. s. Kug., Sieb., von Fritzen bezweifelt.

A. rufa Fabr. s. Kbg. (Erichs. K. D. III. 910); bei Pasewark auf der Nehrung (Dommer).

A. arenaria Fabr. *globosa* Kug. n. h. auf den Sanddünen bei Pillau und Neuhäuser (Ltz.), unter ausgeworfenem Seegras (Sieb.), Gleitkau, Schwarzort (Czw.).

Ochodaetus chrysomelinus Fabr. s. s. Dz., unter altem trockenem Kuhdüniger (Fritzen).

Odontoceras mobilicornis Fabr. s. s. Insterburg (Buchmann).

Geotrypes Typhoeus L. s. s. Kbg., Dz., Rastenburg (Sieb.).

G. stercorarius L. *putridarius* Er. g. in Pferdedünger.

G. spiniger Marsh. *stercorarius* Er. h. ebenso.

G. mutator Marsh. g. ebenso.

G. sylvaticus Pz. h. Rauschen (Ltz.).

G. vernalis L. n. s. mit var. *autumnalis* Er. ebenso.

Lethrus cephalotes Fabr. nach Kug. bei Schwarzort am Meeresufer unter verfaulten Geäckchen, auch im Dünger gefunden, nachher nicht wieder; dürfte in Pr. nicht vorkommen.

Trox concinnus Er. s. s. Putzig (Stf., von Fritzen bezweifelt).

T. hispidus Pontopp. s. Kbg. vor dem Sackheimer Thore, in Lumpen (Pfeil).

T. cadaverinus Illig. s. Putzig (Stf.).

T. sabulosus L. n. s. in Lumpen, in Haaren von Thierfellen (Kug.). Kbg. (Ltz.).

T. scaber L. h. Wernsdorf (Kuwert).

Hoplia philanthus Füssl. *argentea* Fabr. s. s. Rhedathal bei Neustadt (Fritzen), Gleitkau (Czw.).

H. farinosa L. *squamosa* Fabr. s. s. Kbg. (Sieb.).

H. pollinosa Er. *minuta* Illig. n. s. auf den Dünen zwischen Pillau u. Neuhäuser, Juni (Ltz.), Bohnsack bis zur Pommerschen Grenze (Fritzen), Dünengräser bei Fahrwasser (Dommer), Memel (Stnr.).

H. graminicola Fabr. n. s. ein Dünenkäfer (Ltz.), aber auch auf dem Quednauer Berge (Stnr.).

Homaloplia ruricola Fabr. n. s. Braunsbg., Kbg. in den Strandgegenden auf Weiden (Ltz.).

Sericia holosericea Scop. n. h. auf Brachäckern, an den Wurzeln versch. Pflanzen, Scheranthus, Erica, Osterode (Kug.), am Soestrande (Ltz.).

S. brunnea L. h. in den Strandgegenden, Cranz, Rauschen (Ltz.).

Rhizotrogus solstitialis L. n. s. auf Brachäckern, Kbg. (Ltz.), Hlgbl. (Stnr.).

R. ruficornis Fabr. s. Putzig (Stf.), Lyck (Gortitz), Ggbg. (Kr.).

R. aequinoctialis Hbst. 2 St. von Kugel. an Hellwig übersandt u. von diesem als aequin. bestimmt, aber bisher nicht wieder gefunden.

Polyphylla fullo L. n. s. in den Strandgegenden von Pillau bis Cranz auf Kiefern (Ltz.), Dz., Rastenbg., Lyck (Sieb.).

Melolontha vulgaris Fabr. mit var. *albida* Friv. h. überall, letzterer am besten auf Sandböden, der beim Ausschlüpfen keinen Widerstand bietet und das Haarkleid nicht abreißt.

M. hippocastani Fabr. h. ebenso.

Anisoplia fruticola Fabr. s. Kug., Sieb.

A. agricola Fabr. sand Kugel. in 2 versch. Sammlungen vaterländ. Insecten: bis jetzt nicht wieder gefunden.

A. crucifera Hbst. s. von Stf. in Lithauen gefangen (Dommer), von Fritzen bezweifelt.

A. austriaca Hbst. s. Braunsbg. (Sieb.), von Fritzen bezweifelt.

Phyllopertha horticola L. g. überall.

Anomalia Frischii Fabr. g., namentlich in den Strandgegenden auf Weiden.

Oryctes nasicornis L. n. s. in Gerberlohe,
Kbg. (Ltz.).

Oxythyrea stictica L. s. bei der Allenstein-
schen Glashütte auf jungen Eichen (Kug.), Ca-
dinen (Dommer, Frantzius).

Cetonia hirtella L. s. Braunsbg. (Seydlér),
Dz. (Sieb.).

C. speciosissima Scop. *fastuosa* Fabr.
s. s. Osterode 1 St. auf *Thalictrum flavum* (Kug.),
Thorn (Eld.), Pelpin, wo die Larve im Mulme
alter Linden wohnt (Fritzen).

C. marmorata Fabr. n. h. an alten Weiden
Fchstein. (Ltz.), Dz. (Czw.), Higbl. (Stnr.).

C. aenea Gyll. *metallica* Fabr. h. Lyck
(Sanio).

C. aurata L. s. h. auf *Spiraea ulmaria* und
auf Rosenblüthen, überall.

Oenotherma eremita Scop. n. h. an alten
Birnbäumen u. Weidenstümnen, August (Kug.),
Dz. (Czw.), Kbg. (Ltz., Stnr.).

Gnorimus variabilis s. an Eichenstubben
Osterode (Kug.), Carmitten (Ltz.), Neuhausen
(Stnr.).

G. nobilis L. n. s. auf blühendem *Cirsium*
oleraceum, Warnicken in der Wolfsschlucht (Ltz.),
Neuhausen, Kleinheide (Stnr.).

Trichius fasciatus L. n. s. auf blühendem
Chrysanthemum, Warnicker Forst (Ltz.), F. F.
(Stnr.).

Valgus hemipterus L. s. Osterode (Kug.),
Pillau (Nanke), Dz., Thorn (Sieb.).

Buprestidae.

Chalcosoma Mariana L. fehlt in den Strand-
gegenden, ist aber tiefer nach Süden in Kiefer-
wältern n. s. Osterode (Kug.), Elbing, Rasten-
burg, Tucheler Haide, Lyck (Sieb.).

Dicerca Berolinensis Hbst. *calcarata* Fabr.
s. s. an Baumstümnen der Laubwälder, Osterode
(Kug.), Kbg. (Sieb.), Dz. (Helm.).

D. aenea L. s. s. Jäschkenthal 2 St. 1871
(Helm.).

D. acuminata Pall. s. s. auf der frischen
Nehrung bei Pröbbernau 1 St. (Stf.).

D. alni Fisch. *fagi* Lep. s. s. Orteburg
(Mühl.).

Psephenota conspersa Fabr. einmal bei Pe-
lonken (Dz.) auf Buchen und Pappeln zahlreich

(Stf.), sonst s., zuerst 1790 bei Kbg. an alten
Pappelstümnen (Kug.).

P. rutilans Fabr. s. bei Liebmühl an den
Knorren alter Lindenstümme (Kug.). Rastenbg.
(Sieb.), einmal in Mehrzahl an alten Linden in
Catharinenhof bei Kbg. (Bender).

P. decipiens Mannh. s. Rastenbg. (Mühl.).

Ancylodera rusticana s. in Kieferwäldern an
der Mittagsseite der Stümme bei heißem stillem
Wetter sich sonnend, Osterode (Kug.), Kahlberg
(Ltz.).

A. punctata Fabr. n. h. Kahlberg (Bach-
mann, Ltz.).

A. flavomaculata Fabr. ebenso, Tuchelsche
Haide (Sieb.).

A. octoguttata L. s. Braunsbg., Heilsbg.,
Rastenbg., Tuchel. Haide (Sieb.), Schwarzort (Ltz.).

A. splendida Pk. s. s. Thorn (Sieb.).

Eurythyrea austriaca L. s. s. Osterode im
Lubinschen Wälchen auf einer gefüllten Buche
Juli 1789 (Kug.), ein zweites St. Juli 1877 von
einem Gymnasialschüler (Stadie) bei Neukuhren
gef. (Czw.).

E. carniolica Hbst. s. s. ein von einem
Schüler in den Holzgärten in Kgb. gef. St. be-
sitzt Kuwert-Wernsdorf.

Melanophila cyanea Fabr. *tarda* Fabr. n. s.
im Kiefernwalde von Schwarzort (Ltz.).

M. appendiculata Fabr. s. ebenso.
Anthaxia nitida Rossi. s. Cadinen (Stf.).

A. nitidula L. *laeta* Fabr. s. in Wältern
auf Blumen, Osterode (Kug.), Elbing (Sieb.).

A. morio Fabr. s. s. in einer ostpr. Forst
(Dossow).

A. sepulchralis Fabr. s. s. Braunsberg
(Eld.).

A. 4-punctata L. h. auf Syngenesien, bes.
Hieracium, Loppehnen (Eld. Ltz.).

Chrysobothris chrysostigma L. s. an alten
Weidenstümnen (Kug.), Braunsbg. (Sieb.).

C. affinis Fabr. s. Osterode (Kug.), Elbing
(Sieb.), Ggbg. (Kr.).

C. Solieri Lep. s. s. in Masuren auf Kie-
fernholz (Mühl.).

Agrius sexguttatus Hbst. s. Greibensche
Forst (Ltz.).

A. biguttatus Fabr. n. h. auf jungen Eichen,
Elbing, Braunsbg. (Sieb.), Wilkie (Ltz.).

A. mendax Mannh. s. in *Sorbus*-Stümnen,
Warnicken (Dossow).

A. subauratus Gebl. coryli Ratz. s. s.
Dammhof (Pfeil).

A. viridis L. h. auf Haseln und Eichen,
Braunsbg., Kbg. (Ltz.); var. *linearis* Fabr. h.
auf Weiden (Kug. Eld.); var. *nocivus* Kbg.
(Ltz.); var. *fagi* Ratz., Aubei Lap., *quercinus*
Ratz. (Qossow, Sauter).

A. betuleti Ratz. s. Elbing, Kbg. (Sieb.).

A. pratensis Ratz. n. h. Löwenhagen (Ltz.).

A. tenuis Ratz. n. h. Kbg. (Ltz.).

A. angustulus Ill. n. s. ebenso.

A. laticornis Ill. n. h an den Beeren von
Daphne mezereum (Dommer), Brandenburger
Heide (Ltz.), Oliva (Czw.).

A. olivicolor Ksw. h. Braunsbg. (Mühl.),
auf Rüstern in Westpr. (Strübing, Berl. Ent.
Ztg. IV. 322).

A. integerimus Ratz. s. Lyck (Sanio).

A. hyperici Creutz. s. Albrechtsthal bei
Wehlau (Sauter).

Aphanisticus pusillus Oliv. s. s. Waldenburg
bei Neustadt auf einer feuchten Wiese, August
(Fritzen).

Trachys minutus L. s. h. auf blühenden
Weiden, Kbg. (Ltz.).

T. pygmaeus Fabr. s. Ggbg. (Kr.).

T. troglodytes Gyll. s. Lyck (Sanio).

T. nanus Hbst. s. Cadinenen (Stf.), Gelguhnen
(Ltz.).

Eucnemidae.

Throscus dermestoides L. s. h. auf Eichen,
Kbg. (Ltz.).

T. carinifrons Bonv. n. s. Dammhof (Ltz.,
Czw.).

T. elateroides Heer. s. ebenso; Kbg.
(Pfeil).

T. obtusus Curt. s. ebenso; an Weiden am
Pregel (Stnr.), Neustadt (Fritzen).

T. Duvalli Bonv. n. s. bei Dz. an Wiesen-
räldern unter alten Weiden (Czw.).

Drapetes equestris Fabr. s. s. Osterode (Kug.),
Ggbg. (Kr.).

Melasis buprestoides L. s. s. Osterode, im
Holze eines alten Kastanienbaumes, dann auf
Blumen im Eichen- u. Buchenwalde (Kug.), seit-
dem nicht wieder gefunden.

Thaumus metasoides Lap. s. s. Kbg. in einem
Garten (Borgien).

Euenemis capucinus Ahr. s. Kbg. in alten
Weiden bei Fort Friedrichsburg (Pfeil, Ltz.),
Löwenhagen (Czw.).

Microrrhagus pygmaeus Fabr. s., zuerst 1795
an alten Pappelstümmen (Kug.), dann Putzig
(Stf.), Warnicker Park (Ltz.).

M. clypeatus Hampe in Pr. von Kug. ent-
deckt (als *Euenemis gibbicollis*), aber bisher
nicht wiedergefunden, vergl. Erichs. K. D. IV.
p. 205.

Xylobius alni Fabr. s. s. unter Buchen- und
Eichenrinde (Kug.), frische Nehrung, Cadinenen
(Stf.), Ggbg. (Kr.).

Hylochares cruentatus Gyll. s. s. Elbing
(Eld.).

Blateridae.

Adelocera lepidoptera Pz. s. s. Elbing (Sieb.).

A. fasciata L. s. s. Kbg., Rastenbg. (Sieb.).

A. varia Oliv. s. s. einmal an einer Tanne
bei Labiau (Nanke teste Kug.), sonst nicht
wieder gefunden.

Lacon mutilus L. h Kbg. (Ltz.).

Drasterius bimaculatus s. s. Pillauer Strand
(Sauter).

Elater (Ampedus) sanguineus L. n. h. auf
Birken, Lyck (Sanio), Zinten (Ltz.).

E. lythropterus Germ. *satrapa* Ksw. n.
h. ebenso.

E. ephippium Oliv. n. h. Kbg. (Ltz.).

E. pomonae Steph. h. Dz. (Helm.), Kbg.
(Ltz.), ist hier wie in Livland die häufigste Art
(Seidl. Fn. Balt. p. 119).

E. praeustus Fabr. s. Dz. (Ltz.).

E. pomorum Hbst. s. Kbg. (Ltz.).

E. crocatus Lac. n. h. ebenso.

E. balteatus L. n. s. auf Nadelholz Kbg.
(Ltz.); auf Birken, Lyck (Sanio).

E. elongatus Fabr. s. Neustadt (Fritzen).

E. erythronogonus Müll. n. h. auf Tannen,
Bludauer Forst (Pfeil, Eld., Ltz.).

E. scrofa Germ. s. Kbg. (Pfeil).

E. nigrinus Pk. n. Wilkie (Ltz.).

Megapenthes subcarinatus Germ. s. s. auf
Tannen, Kbg. (Pfeil).

Cryptophygnus riparius Fabr. n. h. Palmburg
am Pregel (Ltz.).

C. 4 pustulatus Fabr. h. auf den Dünen,
Pillau-Cranz (Ltz.), Hlgbl. (Stnr.).

- C. elongatus* Redt. s. Dz. (Helm).
C. pulchellus L. n. s. am Fuss der Dünen unter trockenen Blättern, Schwarzort, Cranz (Ltz.).
C. sabulicola Boh. n. s. ebenso, Dz. (Helm, Czw.).
C. dermestoides Hbst. *tetraphraphus* Germ. s. Putzig, am Seestrande (Stl.), Pillau (Sauter).
C. lapidicola Germ. wird von Zebe als pr. angeführt.
Cardiophorus thoracicus Fabr. s. Sieb.
C. ruficollis L. n. s. auf Tannen, Bludauer Forst (Ltz.).
C. rufipes Fourer. s. Dz. (Ltz.).
C. ebeninus Germ. s. Dz., im Grebbiner Walde (Dommer).
C. atramentarius Er. wird von Zebe als pr. angeführt.
C. musculus Er. n. s. bei Pillau auf den mit spärlichem Grase bewachsenen Dünen, Juni (Ltz.), Neuhäuser (Stnr.).
C. asellus Er. n. h. Dz. (Helm), Neuhäuser (Hensche), Neustadt (Fritzen) auf jungen Kiefern im Mai, Juni.
C. cinereus Hbst. n. s. Pillau (Sauter, Stnr.), Ludwigsort auf Sandboden (Ltz.).
C. equisetii Hbst. n. s. ebenso.
Melanotus (Cratonychus) niger Fabr. s. Kug. Sieb.
M. brunnipes Germ. s. Sieb.
M. castanipes Pk. h. auf *Corylus*, Kbg. (Sauter, Ltz.).
M. rufipes Hbst. mit var. *bicolor* Fabr. n. s. ebenso, F. F. (Stnr.), Neustadt (Fritzen).
M. crassicollis Er. s. Neustadt (Fritzen).
Limonius nigripes Gyll. s. h. auf Weidengestrüch, Kbg. (Ltz.).
L. cylindricus Pk. s. h. ebenso.
L. minutus L. s. Sieb.
L. parvulus Pz. s. Neumark in Westpr. (Janko teste Kramer).
L. lythrodies Germ. s. Gggbg. (Kr.).
L. Brueteri Pz. s. im Radaunethal auf Blumen (Dommer).
Athous rufus Deg. s. unter Kiefernholzstapeln, Dz., Elbing, Thorn (Sieb.); Kahlberg, Schwarzort (Ltz.).
A. niger L. *hirtus* Hbst. *pubescens* Koch mit var. *serutator* Hbst. h. auf Gebüschen, Kbg. (Ltz.).
A. haemorrhoidalis Fabr. g. überall.
A. vittatus Fabr. n. s. Kbg. (Ltz.), var. *semipallens* Muls. Neustadt (Fritzen).
A. longicollis Oliv. s. Sieb.
A. trifasciatus Hbst. *bifasciatus* Gyll. s. s. Kbg. (Kug.), Ohre bei Danzig (Sieb.).
A. subfuscus Müll. analis Fabr. g. überall.
A. Zebei Bach. n. s. bei Putzig (Stl.).
Corymbites pectinicornis L. n. s. auf blühenden Ripsfeldern Kbg. (Ltz.).
C. aeruginosus Fabr. s. Pröbbernau auf d. frischen Nehrung (Schindowsky), Dz. (Helm).
C. haematodes Fabr. s. s. in den Wäldern bei der Allensteinschen Glashütte (Kug.), Cadinen (Sieb.).
C. castaneus L. s. Rossitten (Nanke), Dammhof, Blaustein (Ltz.).
C. tessellatus Eabr. *assimilis* Gyll. s. h. auf Gebüschen und Wiesen Kbg. (Ltz.).
C. holosericeus Oliv. h. ebenso.
Diacanthus impressus Fabr. n. h Dammhof (Ltz.), Dz. (Dommer, Frantzius).
D. metallicus Pk. n. s. auf jungem Nadelholz Kbg. (Ltz.), Putzig (Stl.).
D. melancholicus Fabr. s. Dz. auf Blumen (Dommer).
D. aeneus L. h. unter Steinen, Kbg. (Ltz.), ebenso die var. *germanus* L. u. *nitens* Scop.
D. latus Fabr. n. s. bei Gggbg. (Kr.), Dz., Ktzn. (Czw.), var. *milo* Germ. Neustadt (Fritzen).
D. cruciatus L. n. s. Neuhausen, Fuchs höfen (Ltz.).
D. bipustulatus L. n. h. Conitz (Sieb.), Neustadt (Fritzen), an laufenden Birkenstellen im Mai, Blaustein (Ltz.). Aweiden (Stnr.), ebenso die ganz rothgelbe var., die häufiger zu sein scheint, Echstein (Ltz.).
Ludius ferrugineus L. s. s. Kug. Sieb.
Ectinus aterrimus L. h. auf Gebüschen (Ltz.).
Agriotes sputator L. *graminicola* Redt. s. auf Wiesen (Ltz.).
A. lineatus L. h. ebenso.
A. obscurus L. h. ebenso.
A. ustulatus Schall. var. *sputator* Redt. s. Neustadt (Fritzen).
Dolopius marginatus L. h. auf Gebüschen.
Sericosomus brunneus L. *fugax* Fbbr. n. s. Conitz (Sieb.), auf Nadelholz, Margen (Ltz.).
Synaptus filiformis Fabr. n. h. Elbing (Eld.), Cranz (Ltz.).

Adrastus pallens Fabr. *limbatus* Pk. *pussillus* Hbst. s. h. überall.

A. lateralis Er. s. Kbg. (Ltz.). Wehlau (Sauter), fehlt bei Stein u. W.

Campylus linearis L. *mesomelas* L. n. h. auf Weiden, Erlen, Eschen (Kug.), Dammhof (Ltz.).

Dascillidae.

Dascillus cervinus L. n. h. auf Buchenstubben (Kug.), am Seestrande (Ltz., Eld.).

Helodes pallidus Fabr. h. Kbg. (Ltz.).

H. marginatus Fabr. s. Kbg. (Kug.), Dz. (Dommer).

H. lividus Fabr. n. s. Lyck, in der Milchbuder Forst (Sanio), Kbg. (Ltz.).

H. Bohemanni Mannh. s. bei Neuhäuser von einem Gymnasialschüler (Hensche) gefunden, Neustadt (Fritzen).

Cyphon coarctatus Pk. n. s. Kbg. (Ltz.).

C. nitidulus Thoms. s. Neustadt (Fritzen).

C. palustris Thoms. s. ebenso.

C. fuscicornis Thoms. s. ebenso (fehlt bei Stein u. W.).

C. padl L. g. überall auf Nadelholz.

C. variabilis Thunb. *pubescens* Fabr. ebenso.

C. pallidulus Boh. n. h. auf Weiden, Rauschen (Ltz.), F. F. (Czw.).

Trioncyphon sorricornis Müll. s. Schellemühle bei Danzig (Dommer, Frantzius).

Hydrocyphon deflexicollis Müll. s. Fehstein (Sauter).

Sirites hemisphaericus L. h. Kbg. auf Pregelwiesen (Ltz.)

S. orbicularis Pz. h. ebenso, wahrscheinlich nicht eigene Art, da Uebergänge vorhanden (Czw.).

Eucinotus haemorrhoidalis n. h. auf den Dünen bei Heub. unterdürrem Laube (Dommer, Helm), Ggbg. (Kr.), unter verrottendem Stroh, Ktz. (Czw.).

Eubria palustris Germ. n. h. auf Wasser- pflanzen an sumpfigen Stellen, Pampauer Thal bei Leesen (Dommer), Ggbg. (Kr.).

Thelephoridae.

Dictyoptera sanguinea L. n. s. F. F., Katharinenhof (Ltz.).

Eros Aurora Hbst. n. s. ebenso, einmal bei Osterode auf Buchenstöcken s. h. (Kug.), Dammhof (Stnr.).

E. minutus Fabr. n. h. in altem Buchenholz (Kug.), Kbg. (Ltz., Stnr.).

E. affinis Pk. s. Heilsberg (Sieb.), Higbl. (Stnr.).

Lampyris noctiluca L. n. s. unter Gebüschen im Moose, Georgenswalde (Ltz.), durch die ganze Prov. verbreitet, var. *Bellieri* Reiche Neustadt (Fritzen).

L. splendidula L. n. s. ebenso, Reimannsfelde (Ltz.).

Phosphaenus hemipterus Geofr. s. Leesen bei Danzig (Sieb.), Schromb. (Czw.), Warnicker Park (Ltz.), Kbg. Landgraben (Eld.), nasser Garten (Czw.), var. *brachypterus* Motsch. Neustadt (Fritzen).

Podabrus alpinus Pk. n. s. auf jungen Kiefern, Capornsche Heide (Ltz.), Oliva, Zoppot (Helm), var. *rubens* F. Neustadt (Fritzen).

Thelephorus violaceus Pk. s. Kbg. im botanischen Garten, Georgenswalde (Czw.).

T. fuscus L. g. überall, bes. auf Doldengewächsen u. an Kornähren.

T. rusticus Fall. g. ebenso.

T. obscurus L. g. ebenso.

T. nigricans Müll. h. Margen (Ltz.).

T. pellucidus Fabr. h. Kbg. (Ltz.).

T. lividus L. *dispar* Fabr. h. ebenso.

T. assimilis Pk. *dilatatus* Redt. s. Putzig (Stf.).

T. clypeatus Illig. n. s. Kbg. (Ltz.).

T. figuratus Mannh. s. Dz., Heub. auf torögen Waldwiesen, Neustadt (Czw., Fritzen).

T. rufus L. *lituratus* Fall. *bicolor* Pz. h. Kbg. (Ltz.), Lyck (Sanio).

T. thoracicus Oliv. *fulvicollis* Redt. g. überall.

T. flavilabris Fall. s. Dz. (Dommer).

T. paludosus Fall. n. s. Dammhof (Ltz., Stnr.), Neustadt (Fritzen).

T. oralis Germ. *lateralis* Gyll. h. Wicken bei Domnau (Sauter), F. F. (Stnr.).

T. pilosus Pk. n. h. Wilkie (Sauter), Putzig (Stf.), Masuren (Mühl.).

T. prolixus Märk. s. Neustadt (Fritzen).

- T. fulvicollis** F. ebenso.
Rhagonycha melanura Oliv. g. auf Garten-spirälen.
R. fuscicornis Oliv. n. h. Kbg., Eichen-krug, Oliva (Czw.).
R. testacea L. g. überall.
R. pallipes Fabr., pallida Fabr. h. Kbg. (Ltz.).
R. atra L. n. s. Dammhof (Ltz.).
R. elongata Fall. paludosa Redt. n. h. Metgethen (Ltz., Stnr.).
Silix nitidula Fabr. spinicollis Charp. n. h., die ♀ s. Dammhof (Ltz.).
S. ruficollis Fabr. s. s. Kbg. auf einer Holzwiese (Czw.).
Malthinus slaveolus Pk. h. auf jungen Eichen (Ltz.).
M. fasciatus Oliv. s. Neustadt (Fritzen).
M. biguttulus Pk. h. ebenso.
M. frontalis Marsh. s. Ggbg. (Kr.)
Malthodus sanguinolentus Fall. n. s. Dz. (Dommer), Kbg. (Ltz.).
M. pellucidus Ksw. s. Sieb.
M. nigellus Ksw. s. Schromb. (Czw., Stnr.)
M. marginatus Latr. n. s. Kbg. (Ltz.).
M. crassicornis Mäkl. s. Neustadt (Fritzen).
M. dispar Germ. ebenso.
M. flavoguttatus Ksw. s. Oliva (Czw.).
M. misellus Ksw. n. s. auf Doldengewächsen, Kbg. (Sauter, Ltz.).
M. fibulatus Ksw. s. 2 ♂ Juni 1867 Geor-genswalde (Czw.).
M. mysticus Ksw. n. h. Kbg. (Ltz.).
M. trisulcatus Ksw. s. F. F. Juli 1867 (Czw.).
M. guttifer Ksw. s. Neustadt (Fritzen).
M. brevicollis Pk. h. auf Vaccinium. Kbg. (Ltz.).
M. spathifer Ksw. n. s. F. F., Oliva (Czw., Stnr.), Neustadt (Fritzen).
Driopa concolor Ahr. s. s. Dz. (Sieb.), Rau-schen (Stnr.).
Hoplochrus femoralis Er. s. vom Dünen-grase geschöpft, Heub. (Heim), Schwarzort, Cranz (Ltz.), Memel (Stnr.); bei Glettkau hat ihn Czw. mit Tabaksdampf aus dichten Büscheln von *Elymus arenarius* erhalten.
Malachius aeneus L. auf Blumen g. überall.
M. bipustulatus L. ebenso.
M. scutellaris Er. s. Dz. (Stf.).
- M. viridis** Fabr. h. Kbg. (Ltz.).
M. marginellus Oliv. n. h. Rosenau bei Kbg. (Ltz.), Neuhausen (Stnr.).
M. elegans Oliv. n. h. ebenso, Wehlau (Sauter).
M. pulicarius Fabr. s. h. Kbg. (Ltz.).
M. rubricollis Marsh. s. Dz. (Dommer).
Anthocomus sanguinolentus Fabr. n. h. Juditten, Wilkie (Eld.), Ggbg. (Kr.).
A. equestris Fabr. s. h. Kbg. (Ltz.).
A. fasciatus L. h. ebenso.
Ebaeus pedicularius Schrk. g. überall.
E. appendiculatus Er. s. s. Westpr. (Strübing, Berl. Ent. Z. IV. p. 322) I ♂.
E. slavipes Fabr. s. Sieb.
Charopus pallipes Oliv. s. h. überall.
C. slavipes Pk. s. Neustadt (Fritzen).
Dasytes niger L. n. s. Kbg. (Ltz.), Neustadt (Fritzen).
D. coeruleus Deg. cyaneus Fabr. s. Trenker Waldhaus (Ltz.).
D. plumbeus Müll. slavipes Fabr. g. überall.
D. fusculus Illig. n. h. Kbg. (Ltz.); Ra-dauenthal, bei Kahlbude (Dommer).
Dolichosoma lineare Rossi. s. h. auf Dünen-grisern, Rauschen, Schwarzort, Cranz (Ltz.).
Haplocrenus tarsalis Sahlib. n. h. Putzig (Stf.), Kbg. (Ltz.).
H. nigricornis F. n. s. Pampauer Thal (Dommer), Kbg. (Ltz.), Schromb. (Czw.).
H. basalis Küst. s. s. Lyck, 1 St. (Sanio).
Julistus floralis Oliv. s. Conitz (Sieb.).
J. memnonius Ksw. s. Schwarzort auf einer blühenden Linde u. auf Espen (Ltz.), Heub. (Czw.).
Byturnus fumatus Fabr. h. auf *Rubus idaeus*, Kbg. (Ltz.).
B. tomentosus Fabr. h. ebenso.

Cleridae.

- Tillus elongatus** L. n. h. Osterode, auf Chaerophyllum silvestre (Kug.), Rauschen (Ltz.).
Opilo mollis L. n. s. in Häusern auf frischen Dielen, Kbg. (Ltz.), im Freien an einer Pappel bei Putzig (Czw.).
O. domesticus St. n. h. ebenso, Dz. (Czw.), Neustadt (Fritzen).

Clerus mutillarius Fabr. Osterode, auf Behirmblumen (Kug.), aber bisher nicht wieder gefunden.

C. formicarius L. s. h. an Kiefern-Klafterholz (Ltz.).

C. rufipes Brahm. substriatus Gebl. s. ebenso, Blaustein (Ltz.), Putzig (Stf.).

Tarrostenus (*Opilo*) *univittatus* Rossi. s. s.

Danzig, aus morschem Weidenholz erzogen (Stf.).

Trichodes alvearius Fabr. s. s. Osterode (Kug.), Dz. (Kumm.).

T. aptarius L. h. auf Gartenspiräen (Ltz.).

Corynetes coeruleus Deg. n. s. Kbg. (Ltz.).

Necrobia violacea L. h. in thierischen Abfällen (Ltz.).

Opetiopalpus scutellaris Panz. n. h. Osterode, auf *Coronilla varia* (Kug.); an Scheunenwänden, Liep, Margon (Ltz.), Ktzn. (Czw.).

Hylecoetus dermestoides L. proboscideus

F. morio F. s. Cadienen, Pr. Holland, Braunsbg. (Sieb.), h. in Buchenstubben bei Neustadt (Fritzen).

H. flabellicornis Uddm. s. in Bohrlöchern der zweijährigen Abiesstubbchen, Mai. Zinten, Dammhof, Blaustein (Ltz.), F. F. (Czw.), Higbl. (Stnr.).

Lymexylon navale L. s. im Holze alter Eichen, Moosbude, Elbing auf dem Schiffsbauplatze (Ltz.), Putzig, aus morschem Holz erzogen (Stf.).

Ptinidae.

Hedobia imperialis L. s. Osterode, in alten Weiden u. Linden (Kug.), Fehstein (Ltz.).

Ptinus dubius St. *crenatus* Pk. s. ♂ im Harzfluss einer Abies, F. F. (Czw.), im Winter unter Pinusrinde Neustadt (Fritzen).

P. rufipes Fabr. elegans Illig. h. auf Eichen, Pilzenkrug (Ltz.).

P. coarcticollis St. s. s. in einem Hause in Danzig, Ostern 78, 1 St. ♂ (Czw.).

P. bicinctus St. s. Ggbg. (Kr.).

P. fur L. g. leider überall.

P. pilosus Müll. *pallipes* Dr. s. Dz. Schweißköpfe, unter Eichenrinde (Heim), Schwarzkort (Czw.).

P. latro Fabr. s. ebenso, und in Häusern (Fritzen).

P. raptor St. *bidens* Thoms. s. Neustadt (Fritzen), Löwenhagen an einer alten Weide (Ltz.).

P. pusillus St. s. Liep (Ltz.), Jäschkenthal (Czw.).

P. suppilosus St. s. i. Häusern, Dz. (Fritzen).

Niptus crenatus Fabr. n. h. Dz. (Ltz., Czw.).
N. hololeucus Falda. s. s. Neustadt (Fritzen) in einem Spinnweben.

Merium affine Boield. s. s. einmal in einem alten Herbarium gefunden (Sieb.).

Gibbum scotias Fabr. s. s. Dz. (Kug., Sieb.).

Anobiidae.

Dryophilus pusillus Gyll. n. s. Putzig auf Kiefernprossen (Stf.), Schwarzkort (Ltz.), Neuhäusern, F. F., Vierbrkr. (Stnr.).

Priobium castaneum Fabr. s. s. Osterode, an alten Eichen (Kug., Sieb.).

Anobium pertinax L. h. in Häusern (Ltz.).

A. striatum Oliv. h. ebenso.

A. fulvicorne St. h. an Buchen u. Ellern Neustadt (Fritzen); var. *rufipenne* Dr. s. Kbg. (Ltz.).

A. nitidum Hbst. n. s. Dz. (Dommer), Glettka (Czw.), Kbg. (Ltz.).

A. emarginatum Dr. s. Wehlau (Sauter), Blaustein (Ltz.).

A. rufipes Fabr. n. h. an Eichen, Rauschen (Ltz.), an Erlen, Glettka (Czw.).

A. paniceum L. h. bei Bückern u. Brauern (Ltz.).

A. tessellatum Fabr. n. h. Osterode, in altem Weidenholz (Kug.); auf Linden u. Eichen, Kbg. (Ltz.), Vierbrkr. (Stnr.).

A. plumbeum Illig. s. s. Osterode (Kug.), aus Fichtenzweigen gezogen, aus denen der Käfer im April erschien, Neustadt (Fritzen).

Ernobius abietinus Gyll. s. Blaustein, auf Abies (Ltz.), Putzig (Stf.), F. F. (Stnr.).

E. angusticollis Ratz. s. Dz. (Heim.).

E. abietis Fabr. n. s. Wilkie (Eld.), Rauschen, Arnau (Stnr.).

E. mollis L. n. s. ebenso, Blaustein (Ltz.), Kbg. (Stnr.).

E. pini Muls. s. Kbg. (Sauter), Dz. (Heim.).

E. parens Muls. s. s. Schromb. 1 St. (Czw.), Neustadt (Fritzen).

E. parvicollis Muls. s. Kbg. (Ltz.), F. F. (Stnr.).

E. longicornis St. s. Kbg. (Ltz., Sauter), Neustadt (Fritzen), aus *Pinus* gezogen.

E. fuscus Muls. s. Kbg. Plantage (Czw.),
Ggbg. (Kr.).

E. nigrinus St. s. Pr. Stargard (Sieb.),
Ggbg. (Kr.), Dz. (Helm).

Oligomerus brunneus Oliv. s. an alten Eichen,
Moosbude (Ltz.).

Gastrallus laevigatus Oliv. *immarginatus*
Rödt. s. ebenso.

G. sericatus Lap. s. s. Kbg. (Ltz.).

Philinus pectinicornis L. s. h. in Bohr-
löchern alter Weiden, Juli, Cranz, Rauschen
(Ltz.).

P. costatus Gyll. h. ebenso.

Tritypolites carpini Hbst. *serricornis* Dft.
s. Moosbude, Margin (Ltz.), Neuhausen, Met-
gethen (Stnr.).

Xyletinus ater Pz. s. in faulem Holze, Putzig
(Stf.), Schwarzort (Ltz.).

X. pectinatus Fabr. n. s. in vermodertem
Eichenholz, Osterode (Kug.), Moosbude (Ltz.),
Pr. Stargard (Schnidt.).

X. laticollis Dft. s. Pampsauer Thal
(Dommer).

Dorcotoma dresdensis Hbst. s. in Schwäm-
men an Eichen und Buchen, Osterode (Kug.),
Schwarzort, Blaustein (Ltz.).

D. chrysomelina St. n. s. auf Eichen, Neu-
kuhren, Schwarzort, Moosbude (Eld., Ltz.).

D. flavicornis Fabr. n. s. ebenso.

D. bovistae Hoffm. s. Cadinen (Stf.),
Blaustein (Ltz.), Memel (Stnr.).

D. affinis St. s. s. auf Eichen, Wehlau
(Mühl.), Ggbg. (Kr.).

D. subglobosa Muls. s. Kbg. (Kraetz Berl.
E. Z. XV. p. 148); auf Eichen, Loppehnen (Eld.).

D. rubens Hoffm. s. s. aus faulem Eichen-
holz gezogen, Putzig (Stf.), aus Buchen (Fritzen).

Sphindus dubius Gyll. *Gyllenhalii* Chevrol.
s. in Staubpilzen auf alten Stubben, Sperlings
(Eld.), Warnicken, Fuchshöfen (Ltz.), F. F.
(Stnr.).

Aspidiphorus orbiculatus Gyll. n. s. Lop-
pehnen, Fuchshöfen (Eld., Ltz.), Putzig (Stf.),
F. F., Vierbrkr. (Stnr.).

Apate capucina L. n. h. in altem Eichenholz.
Elbing, Braunsberg (Sieb.), Wernsdorf, Craam
(Ltz.), Hilgl. (Stnr.).

Dinoderus elongatus Pk. Osterode in
altem Eichenholz (Kug.), bisher nicht wieder
gefunden.

Lyctus fuscus L. *canaliculatus* Fabr.
pubescens Pz. Dft. n. s. in alten Weiden,
Löwenhagen (Ltz.).

Cis boleti Scop. g. in Schwämmen.

C. micans Hbst. h. Grebbiner Wald (Dom-
mer), Kbg. (Ltz.).

C. hispidus Pk. g. wie boleti.

C. elongatus Gyll. s. Neustadt (Fritzen).

C. laminatus Mell. s. in faulendem Holze,
Putzig (Stf.).

C. bidentatus Oliv. s. Osterode (Kug.),
Warnicken (Ltz.).

C. nitidus Hbst. n. s. Kbg. im Schwamm
einer alten Esche (Pfeil), Warnicken (Ltz.).

C. Jaquemartii Mellé. s. Neustadt (Fritzen).

C. alni Gyll. n. h. auf Erlen, Warnicken
(Ltz.).

C. festivus Pz. h. wie boleti: auffallend ist
im Catalog die Bezeichnung Alp. P., da das
Thier in Dtschld. sehr häufig ist. Kiesw. K.
D. IV. 186.

Rhopalodontus perforatus Gyll. s. in einem
Birkenschwamm, Labiau (Mühl.).

R. fronticornis Pz. h. Kbg. (Ltz.).

Ennearthron affine Gyll. h. ebenso.

E. cornutum Gyll. n. s. Wicken bei Dom-
nau (Sauter), Kbg. (Ltz.).

Octotemnus mandibularis Gyll. s. ebenso.
O. glabriculus Gyll. h. Kbg. (Ltz.).

Tenebrionidae.

Blaps mortisaga L. n. s. in stockigen Stuben,
Kellern, Rauschen (Ltz.).

B. fatidica St. *obtusa* Curt. s. Culmsee
(Janke teste Kramer), Dz. (Ltz.).

Crypticus quisquilius L. h. auf dem Dünen-
sando kriechend, Pillau (Ltz.).

Pedinus somoralis L. wird zwar von Kug.
aus „Südpreußen“ angeführt, dies gehörte je-
doch nicht zu dem jetzigen Pr.; er ist auch in
der Prov. nicht weiter gefunden worden.

Heliopates gibbus Fabr. s. h. auf den Sand-
dünen, Pillau u. Dz. (Ltz., Czw.).

Opatrium sabulosum L. s. h. überall.

Microsomus tibiale Fabr. h. Dünenläufer.

Bolitophagus reticulatus L. *crenatus* Fabr.
s. in Baumchwämmen (Kug.), Warnicken (Ltz.).

Heledona agaricola Pz. s. h. ebenso.

Diaperis boleti L. n. s. ebenso, Georgenswalde (Ltz.).

Hoplocephala haemorrhoidalis Fabr. s. s. im zunderartigen Schwamm einer alten Buche bei der Allensteinschen Glashütte (Kug.), aber bisher nicht wieder gefunden.

Scoephidema bicolor Fabr. s. s., zuerst 1794 in Angerburg unter der Rinde eines abgestorbenen Pflaumenbaumes gefunden (Nanke), Kbg. (Dommer, Ltz.), Aweiden (Stnr.).

Platydema violaceum Fabr. s. Grebbiner Wald, in Moos an Eichen (Dommer), Putziger Stadtwald (Stf.), Neustadt (Fritzen).

Alphitophagus 4-pustulatus Steph. einmal h. Gggb. (Kr.).

Pentaphyllus testaceus Hellw. n. h. in morschem Eichenholz, Moosbude (Ltz.), Bantau (Dommer), in alten Weiden, Neustadt (Fritzen).

Tribolium ferrugineum Fabr. *castaneum* Hbst. s. Putzig (Stf.), in Kleie bei Bäckern in Neustadt (Fritzen).

T. madens Chorp. s. lebt in Scheunen und Strohdächern (Dommer, Fritzen).

Hypophloeus depresso Fabr. an alten Eichen Moosbude (Ltz.), Dz. (Helm).

H. castaneus Fabr. n. h. unter Buchenrinde, auch in Schwämmen, Osterode (Kug.), Warwicken, Elbing (Eld.).

H. fraxini Kug. n. s. im Holz alter Eschen, Osterode (Kug.); unter Tannenrinde, Samitten (Ltz.).

H. plini Pz. s. s. Lyck (Sanio).

H. suturalis Pk. s. Kapkelin (Ltz.), Masuren (Mühl), Grünhöfchen bei Hlgbl. (Czw.).

H. bicolor Oliv. s. Hlgbl. (Seydler), Putzig (Stf.).

H. fasciatus Fabr. s. an Eichen bei Moosbude (Pfeil, Ltz.).

H. linearis Fabr. s. Kbg. (Pfeil), Gggb. (Kr.).

Uloma culinaris L. s. in altem Holz und unter Rinde (Kug.), unter Holzspänen in der Tucheler Heide (Schmidt), unter Pinusrinde bei Hels (Fritzen).

Heterophaena dia perina Pz. s. s. Kbg. unter Kiefernrinde (Kug.), Gr. Zündor an einem hölzernen Gebäude (Dommer).

Upis ceramboides L. in einer Sammlung pr. Käfer 4 St. gesehen (Kug.), aber nicht wieder gefunden.

Tenebrio obscurus Fabr. s. Masuren, Mai 1863 (Mühl), Neustadt (Fritzen).

T. molitor L. s. h. bei Bäckern im Mehl.

T. picipes Hbst. *transversalis* Dr. s. unter morscher Eichenrinde, Masuren (Mühl), Neustadt (Fritzen).

Menechilus curvipes Fabr. *Ioripes* Illig. s. s. Osterode, an einem Elehenstubben, Kbg. unter Weidenrinde (Kug.), Dz. (Sieb.).

Melops lanipes L. s. s. in Wäldern, Osterode (Kug.), aber bisher nicht wieder gefunden.

H. quisquilius Fabr. s. Lyck (Sanio), Gggb. (Kr.), Heub. (Sieb.).

Cistelidae.

Allecula morio Fabr. s. in faulem Eichenholz, Oliva, Putzig (Stf.).

Cistela fulvipes Fabr. s. Kug., Sieb.

C. ceramboides L. s. Schwarzort (Luz.), Vierbrkr. (Stnr.).

C. saperdoides Küst. s. s. Sieb.

C. rufipes Fabr. s. Dz. (Ltz.).

C. murina L. *thoracica* Fabr. *evonymi* Fabr. n. s. auf *Evonymus europ.*, Kbg. (Ltz.).

Prionychus ater Fabr. n. h. Fuchshöfen (Ltz.), Glettkau an alten Weiden (Czw.).

Hymenorius Doublieri Muls. s. s. einmal im Januar 1802 in Masuren in morschem Eichenholz (Mühl); das Vaterland ist das südliche Frankreich (Berl. Ent. Z. VII. 233).

Mycetochares axillaris Pk. *morio* Redt. s. Moosbude (Pfeil), an Eichenschwämmen, Liep (Ltz.).

M. slavipes Fabr. *humeralis* Fabr. *bimaculata* Mannh. s. Moosbude (Ltz.), Neustadt (Fritzen).

M. bipustulata Illig. *scapularis* Gyll. n. s. an Weiden- und Hainbuchenstämmen, ebenso.

M. barbata Latr. *brevis* Pz. n. s. ebenso, Arnau (Stnr.).

Cteniopus sulphureus L. h. Osterode, Zoppot, Elbing (Ltz.); seltener ist var. *bicolor* Fabr. auf *Matricaria*, Westpr. (Strübing Berl. Ent. Z. IV. 322).

Omophlus pinicola Redt. n. h. Ludwigsort (Sauter), Gggb. (Kr.), Dz. (Ltz.), Braunsbq. (Stnr.).

O. lepturoides Fabr. s. Osterode (Kug.), auf jungen Kiefern Dz. (Sieb.), von Fritzen bezweifelt.

Lagriidae.

Lagria hirta L. h. auf Gesträuchen.

Melandryidae.

Tetratoma fungorum Fabr. s. im Schwamm einer alten Birke, Osterode (Kug.), Dz. (Helm., Ltz.).

T. ancora Fabr. s. an *Carpinus*, Grebbiner Wald (Dommer), Kleinheide (Eld.), Neustadt (Fritzen).

Eustrophus dermestoides Fabr. n. s. in Schwämmen an Weiden und Eichen, Osterode (Kug.), Moosbude (Ltz.), Glettkauf (Czw.), Holstein (Stnr.).

Orchesia micans Pz. s. in Buchenschwämmen, Osterode (Kug.), Dz. (Dommer), Wilkie (Eld.), Dammhof (Stnr.).

O. luteipalpis Muls. s. s. aus einem Baumchwamm gezogen, Neustadt (Fritzen).

O. sepicola Rosenh. s. aus trocknem Laub Ggbg. (Kr.), Dz. (Helm.).

O. fasciata Pk. n. h. von einer *Carpinus* geklopft, Fehstein (Ltz.), Osterode (Kug.), Dz. (Dommer), Wilkie (Eld.).

Hallomenus humeralis Pz. n. h. in Schwämmen an versch. Bäumen, Gr. Zünder (Dommer), Kbg. nasser Garten (Ltz., Stnr.).

H. fuscus Gyll. s. Ggbg. (Kr.).

Abdera 4-fasciata Curt. s. s. 2 St. von einer Eiche in der Brandenburger Heide geklopft, Juli 1870 (Ltz.).

A. triguttata Gyll. s. s. unter Kiefernrinde bei Pr. Stargard (Schmidt).

A. affinis Pk. s. s. an Ellern in einem den Stamm überziehenden Pilz, aus welchem der Käfer im April und Mai sich entwickelt, Putzig (Stt.), Neustadt (Fritzen).

A. flexuosa Pk. s. in morschen Erlenstücken, Masuren (Mühl.), Corjeiten (Ltz.), Dz. (Helm.).

Anisoxya fuscula Illig. Osterode (Kug.), aber bisher nicht wieder gefunden.

Dircina 4-maculata Illig. 4-guttata Pk. ebenso.

D. discolor Fabr. n. h. an Stubben in der Caporn, Haide, Medenauer Wald, Wilkie (Eld.), Putzig (Stt.), Wehlau (Mühl.), Vierbrkr. (Stnr.).
Seropalpus barbatus Schall. s. Osterode (Kug.), Kbg. (Ltz.), Hgbl. (Fritzen).

Hypulus quercinus Quens. s. an alten Eichen u. Ahorn im Grebbiner Walde (Dommer), Wehlau (Mühl.), Neustadt (Fritzen).

H. bifasciatus Fabr. s. Braunsbg., Conitz (Sieb.), Dammhof (Ltz.), F. F. (Stnr.).

Melandrya caraboides L. s. Elbing (Sieb.), Gelguhnen (Ltz.).

M. canaliculata Fabr. s. Labiau (Nanke., Eld.); unter Pappel- und Birkenrinde, Masuren (Mühl.).

M. flavicornis Dfl. s. Kug., Sieb.

Phryganophilus nigritiventris Hampe s. s. 1 St. in der Forst Klein-Nuhr (Dossow).

Scaptia fuscula Müll. s. am Abende fliegend in Kiefernwaldungen (Dommer).

Anthicidae.

Notouxia monoceros L. s. h. überall.

Anthicus humilis Germ. s. Rauschen, Juli (Ltz.).

A. bimaculatus Illig. n. h. Dünen bei Heub. (Sieb.), Haffußer bei Schwarzort (Ltz.).

A. floralis L. h. an Scheunenwänden, Liep (Ltz.), Ktzn. (Czw.).

A. bifasciatus Rossi. s. im Sande, überwinternd an Kastaniengärten (Dommer).

A. sellatus Pz. n. s. Schwarzort am Haffstrande (Ltz., Stnr.), Pillau (Nanke., Eld.), Dz. (Dommer).

A. gracilis Pz. s. Ktzn. (Czw.), Neuhäuser (Stnr.).

A. antherinus L. n. h. Georgenswalde (Ltz.).

A. 4-guttatus Rossi. s. Sieb.

A. hispidus Rossi. s. s. Cranz, am Seestrande (Stf.).

A. ater Pz. s. einmal 3 St. am Seestrande bei Zoppot (Ltz.), Kbg. (Sauter, Stnr.).

A. luteicornis Schmidt s. s. 1 St. am Pregeldamm (Ltz.).

A. flavipes Pz. h. am Haffstrande, Pillau, Schwarzort, Neuhäuser (Ltz., Stnr.).

Xylophilus amabilis Sahib. s. s. Ggbg. (Kr.) Berl. Ent. Z. VII. 233, Masuren (Mühl.).

X. pygmaeus Deg. **fennicus** Mohnh. s. s.
auf einer Weide bei Glettkau 1 St. Juli 1871,
ein zweites auf einer Pregelwiese 1874 (Czw.),
auf Eichenstrauch einmal Neustadt (Fritzen).

X. populneus Pz. s. Liep (Ltz.), Putzig
(Stf.), Kbg. Plantage (Stnr.).

X. nigrinus Germ. n. h. Danziger Nehrung,
Putzig (Dommer, Stf.), Schwarzort (Ltz.), Vier-
brkr. (Stnr.).

X. tyrolensis Gredl. s. s. unter abgefallenen
Flechtentadeln auf Sandboden Neustadt (Fritzen).

Pyrochroidae.

Pyrochroa coccinea L. n. s. Higbl., Neu-
hausen (Stnr.), Elbing, Braunsbg., Pr Holland
(Sieb.), Morgen (Ltz.).

P. rubens Schall. s. Dz. (Helm), Elbing
(Sieb.).

P. poecilicornis L. s. Elbing, Braunsbg.
(Sieb.), Trenker Waldhaus, Neuhäuser (Ltz.),
Dz. (Helm).

Mordellidae.

Tomoxia biguttata Gyll. n. h. an morschen
Welen und Eschen Dz. (Helm), an einer ab-
gestorbenen Sorbus Fehstein (Ltz.), Dammhof
(Stnr.).

Mordella guttata Pk. n. s. in Pilzen auf
Eichenstubben, Samitten (Eld., Ltz.), Löwen-
hagen (Ltz., Czw.).

M. fasciata Fabr. h. auf *Spiraea ulmaria*.

M. aculeata L. g. ebenso.

Mordellistena abdominalis Fabr. ventralis
Fabr. s. auf *Hypericum perf.* (Kug.); auf Um-
bellaten, Putzig (Stf.).

M. grisea Muls. s. Neustadt (Fritzen).

M. brunnea Fabr. s. Albrechtsthal, Wehlau
(Sauter), Dammhof (Stnr.).

M. humeralis L. n. s. Wagnicken, auf Spi-
raea ulm. (Ltz.), Dammhof (Stnr.).

M. variegata Fabr. u. s. ebenso, Glettkau
(Czw.).

M. parvula Gyll. *pusilla* Redt. *hiliputana*
Muls. h. Dz. (Czw., Helm), Kbg. (Ltz.).

M. subtruncata Muls. *brevicauda* Boh.
n. h. Kbg., Dz. (Czw.).

M. pumila Gyll. n. s. Kbg. (Ltz.).
M. episternalis Muls. s. Neustadt (Fritzen).
Anaspis phalerata Germ. s. s. F. F. (Czw.)
1 Stück.

A. frontalis L. *lateralis* Fabr. s. h. überall.
A. ruficollis Fabr. s. Dz. 1867 (Helm).
A. flava L. *thoracica* L. h. Kbg. (Ltz.).
A. rufilabris Gyll. s. h. überall.

A. varians Muls. s. auf blühendem Gra-
taegus Schromb., Dz. (Czw.).

A. brunnipes Muls. s. Horst bei Fehstein
(Stnr.).

Rhipiphoridae.

Pelecotaoma fennica Pk. s. in Bohrlöchern
alter Weiden und Eichen, bei Neue Bleiche
(Künow), Blaustein (Ltz.), Kbg. neue Reisfer-
bahn (Czw., Stnr.).

Meteocles paradoxus L. s. s. in einem Wes-
penneste (Frantzius), Landsberg i. Ostpr. (Ltz.).

Cantharidae.

Meloe proscarabaeus L. h. im Frühjahr
im Grase (Ltz.).

M. violaceus Marsh. n. s. ebenso.
M. variegatus Donov. n. s. Zinten (Ltz.),
Dz. (Czw.).

M. scabriusculus Brandt n. h. Lyck (Santio),
Kbg. (Ltz.).

M. brevicollis Pz. n. s. Kbg. (Ltz.).

Cerocomes Schaefferi L. n. s. auf Chrysanthemum,
Rauschen (Eld., Ltz.); Elbing, Dz.,
Braunsbg. (Sieb.).

Cantharis (Lyttia) vesicatoria L. im Süden
der Provinz, h. auf Syringa u. Fraxinus, Ggbg. (Kr.).

Oedemeridae.

Calopus serraticornis L. s. unter Baum-
rinde, Osterode, Dz., Memel (Kug.); Braunsbg.,
Lyck (Sieb.), Zinten (Ltz.).

Ditylus laevis Fabr. s. s. in Erlenstubben,
Kupstinen bei Lablau (Max Wahnseffage), Grei-
bener Forst bei Postnicken (Dossow).

Nacerdes (Anoncodes) melanura L. n. h. Kbg.
(Ltz.).

N. adusta Pz. s. auf Holzplätzen in Dz. (Frankfurt, Ltz.).

N. rufiventris Scop. einmal h. an einem Holzschuppen am Seeufer, Schwarzort (Ltz.), Elbing (Abs.).

N. ustulata Fabr. s. wie adusta, Kbg. Plantage in Dielen eines Wohnhauses schädlich (Stnr.).

N. viridipes Schmidt. s. s. Dz. (Sieb.).

Aclera coerulea L. s. Kug. Sieb.

Oedemera podagrariae L. n. s Kbg. (Ltz.).

O. flavescens L. h. ebenso.

O. marginata Fabr. s. bei Kobbelbude auf dem Silberberg (Kuwert).

O. croceicollis Gyll. s. s. am Saspersee bei Danzig (Sieb.).

O. flavipes Fabr. s. Sieb.

O. virescens L. h. auf Blüthen, Kbg. (Ltz.).

O. turida Marsh. g. überall.

Chrysomela viridissima L. s. Lyck (Gortzitz), Putziger Stadtwald (Stf.).

C. viridis Schmidt. h. in Laubwäldern im Grase, Schwarzort, Warnicken (Ltz.).

Pythidae.

Pytho depressus L. bei Osterode Ende März recht häufig unter der Rinde gefällter Fichtenstämme (Kug.), sonst s. Lyck (Eld.), Putzig (Stf.), Fuchshöfen (Ltz.), Hlgbl. (Stnr.).
Var. castaneus F. s. s. (Eld.).

Borus Schneideri Pz. corticalis Pk. s. s. beim Zersägen grosser Birkenklötze 2 St. gef. Osterode, auch vom Senator Schneider zugeschickt (Kug.), aber bis jetzt nicht wieder gefunden.

Salpingidae.

Lissodema denticolle Gyll. s. einmal unter Eichenrinde, Putziger Stadtwald (Stf.), Kbg. (Stnr.).

vor Gyll. s. Warnicken, 1 St. Juli 1860

Pk. s. Grebbiner Wald an unternd (Dommer), Dz. (Ltz.).

Geotrupes Pz. *piceus* Germ. n. s. Kbg. (Ltz.), Schwarzort (Stnr.).

S. viridipennis Latr. *ruficollis* Pz. s. Neustadt (Fritzen).

S. soveolatus Ijung. s. s. unter einem Steine bei einer Eiche im Frühjahr 1 St. Moosbudo (Ltz.).

Rhinocnemus ruficollis L. *roboris* Pk. n. s. an Eichenrinde, Dz. (Kumm), Kbg. (Ltz.), Neustadt (Fritzen).

R. planirostris Fabr. n. s. Kbg. (Ltz.); bei Osterode an Eichen (Kug.), auch an *Aesculus* Dz. (Fritzen).

R. viridipennis Steph. *ruficollis* Pz. s. Neustadt (Fritzen).

R. aeneus Oliv. einmal s. h. 280 St. an Eichenstämmen (Dommer, Berl. Ent. Zt. III. p. XXX), Böttchershöfchen (Ltz.), Juditten (Stnr.), an Ulmen Neustadt (Fritzen).

Cucujidae.

Mylaeus (Orias) rotundatus Fabr. s. Ggbg. (Kr.), Dz. (Czw.).

Otiarrhynchus tenebricosus Hbst. s. s. Pröbbernau auf der frischen Nehrung (Schindowsky).

O. niger Fabr. Osterode (Kug.), aber bisher nicht wieder gefunden.

O. irritans Hbst. Thorn am Weichselufer auf Haseln s. h. (Strübing, Berl. Ent. Zt. IV. p. 322).

O. laevigatus Fabr. s. Sieb.

O. atroapterus Deg. n. s. bei Putzig auf den Dünen, Juni-Aug. (Stf.), Dz. (Kumm, Czw., Helm).

O. raucus Fabr. n. s. auf Gebüschen, Kbg. (Ltz.).

O. porcatus Hbst. s. s. Sieb.

O. septentrionis Hbst. h. auf Nadelholz (Ltz.).

O. picipes Fabr. n. s. wie raucus.

O. gemmatus Fabr. Kug. im Berl. Manusc. p. 170 ohne Angabe des Fundorts, also sehr zweifelhaft, zumal da das Thier ein südeurop. Gebirgskäfer ist.

O. lepidopterus Fabr. wird von Zebe aus Pr. angegeben, möglicherweise richtig, da der Käfer weit verbreitet ist. Seidl. Fn. Balt. p. 400.

O. sulcatus Fabr. s. Warnicker Forst, Kbg. Plantage und im botan. Garten (Stnr., Eld.), an *Vitis vinifera* (Hensche).

- O. nigrita* Fabr. n. s. bei Kbg. (Ltz., Czw.),
b. bei Lyck (Sanio).
- O. ligustici* L. zuweilen h. am Seestrande,
Rauschen (Eld., Ltz.).
- O. ovatus* L. g. überall.
- O. rotundatus* Sieb. Dz. zuerst auf dem
Wege nach Heub. in Wagengeleisen von Sieb.
entdeckt (Stierlin Berl. Ent. Zt. XVI. 328), dann
auch von Helm u. Czw. gefunden, von letzterem
auch bei Oliva am Zaun des Königl. Gartens
neben dem Wege nach dem Karlsberge, Juli
1878 sehr zahlreich, aber erst nach Sonnen-
untergang vorkommend. Sieb. Pr. Prov.-Blätter
1847 p. 431.
- Pristidius hirticornis* Hbst. s. Dammhof
(Sauter).
- Phyllobius maculicornis* Germ. n. s. Kbg.
(Ltz.), Kleinhäide (Stnr.).
- P. glaucus* Scop. *calcaratus* Fabr. alneti
Fabr. *brevitalus* Thoms. s. h. auf *Urtica dioica*.
- P. psittacinus* Germ. h. Kbg. (Ltz.), Lyck
(Sanio).
- P. argentatus* L. g. auf *Carpinus*.
- P. betulae* Fabr. s. Ggbg. (Kr.).
- P. oblongus* L. g. auf Obstblümen.
- P. piri* L. *vespertinus* Fabr. s. h. ebenso.
- P. scutellaris* Redt. s. Ktzn. (Czw., Seidl.
Fn. Balt. p. 402).
- P. pomonae* Oliv. h. Kbg. (Ltz.).
- P. uniformis* Marsh. n. s. ebenso, auf
Eichen (Dommer, Frantzius).
- P. viridicollis* Fabr. n. s. Putzig (Stf.),
Lyck auf der Karbogin (Sanio).
- P. cinercus* Gyll. n. s. Kbg. (Ltz.).
- P. brevis* Gyll. s. Dz., Neustadt auf *Gallium
verum* (Fritzen).
- P. mus* Fabr. s. s. (Ktzn.) auf Weiden am
Nogatufser (Czw.), Neustadt (Fritzen).
- Polydrosus undatus* Fabr. h. auf jungen
Laubhölzern (Ltz.).
- P. fulvicornis* Fabr. Kug. im Manuscr. II.
122. II ohne Angabe des Fundorts, bisher nicht
wieder gefunden.
- P. impressifrons* Gyll. s. Dz. (Ltz.).
- P. flavipes* Deg. n. s. Kbg. (Ltz.).
- P. coruscus* Germ. n. s. (Helm), Kbg.
(Ltz.), Ktzn. (Czw.).
- P. bardus* Gyll. s. Neustadt (Fritzen).
- P. cervinus* L. h. Kbg., Blaustein (Ltz.).
- P. confluens* Steph. s. Ggbg. (Kr.).
- P. picus* Fabr. h. wie *undatus*.
- P. micans* Fabr. n. s. ebenso.
- P. sericeus* Schall. n. s. ebenso.
- Metallites atomarius* Oliv. n. h. auf Kiefern,
Prell (Stnr.), Lyck (Sanio), Glettka (Czw.).
- Seythropus mustela* Hbst. n. h. Kbg. (Ltz.).
- Scaphilus muricatus* Fabr. h. auf Nadelholz,
ebenso.
- Platytaurus (Orias) setiger* Gyll. *pruinosus*
Schh. n. s. Dz. (Helm, Fritzen).
- P. hirsutulus* Fabr. auf Gesträuchen, Kbg.
(Ltz.).
- Foucartia (Strophosoma) squamulata* Hbst.
s. Loppehnen (Eld.), Heub. (Czw.).
- Barypithes (Orias) mollicomus* Ahr. h.
Heiligenbrunn bei Dz. (Helm, Czw.), Heub.
(Fritzen).
- Strophosoma coryli* F. *obesus* Thoms. s. h.
auf allerlei Gebüschen.
- S. obesus* Marsh. g. ebenso.
- S. faber* Hbst. n. s. auf sandigen Bergen,
Osterode (Kug.), Ggbg. (Kr.).
- Euzonus ovulum* Illig. s. auf den Danziger
Dünen am Riedgrase (Dommer).
- Brachyderes incanus* L. h. auf Nadelholz,
Kbg. (Ltz.).
- Sitones griseus* Fabr. n. h. F. F. (Stnr.), auf
den Pillauer Dünen (Ltz.), Dz. an *Sarothaninus*
(Czw.).
- S. flavescens* Marsh. *8-punctatus* Germ.
s. h.
- S. sulcifrons* Thunb. *medicaginis* Redt.
h. Wehlau (Sauter), Kbg. (Ltz.).
- S. tibialis* Hbst. h. *ambiguus* Gyll. auf
den Danziger Dünen (Dommer), Loppehnen
(Eld.).
- S. crinitus* Oliv. *lineellus* Schh. g. auf
Kiefeldern.
- S. Regensteinensis* Hbst. s. Lyck (Sanio),
Kbg. (Ltz.).
- S. cambricus* Steph. s. Neustadt (Fritzen).
- S. puncticollis* Steph. s. im Braunsberger
Stadtwald (Schindowsky).
- S. lineatus* L. g. wie *crinitus*.
- S. lateralis* Gyll. s. Ggbg. (Kr.), Lyck
(Sanio), Neustadt (Fritzen).
- S. hispidulus* Fabr. h. wie *crinitus*.
- S. humeralis* Steph. s. Lyck, auf einer Feld-
wiese (Sanio).
- Trachypeltis spinimanus* Germ. Sieb.

T. scabriulus L. *setarius* Gyll. *erinaeus* Redt. n. s. Ggbg. (Kr.).

T. seaberl. *squamosus* Gyll. h. Kbg. (Ltz.).

T. aristatus Gyll. s. Kbg. (Grabowski teste Ltz.), Neustadt (Fritzen) unter *Erica vulg.*

T. squamulatus Oliv. n. h. Loppehnern (Eld.), Ggbg. (Kr.).

T. setiger Schh. s. Sieb.

Cneorhinus geminatus Fabr. s. h. auf den Pillauer und Danziger Dünen, Juni.

Barynotus obscurus Fabr. n. h. Kbg. (Ltz.), Dz. (Czw.).

Liophloctus nubilus Fabr. n. s. ebenso.

L. Herbstii Gyll., von Sieb. angegeben ohne Fundort; ist mir zweifelhaft; ich habe noch kein pr. St. gesehen.

Thylacites pilosus Fabr. s. s. Ggbg. (Kr.), Dz. (Helm).

Chlorophanus viridis L. n. s. auf Weiden, Kbg. (Ltz.), Blgl. (Stor.).

C. salicicola Germ. n. h. Dz. (Helm).

Tanyneucus palliatus Fabr. n. s. auf Nadelholz Kbg. (Ltz.).

Tropiphorus mercurialis Fabr. n. h. Dammhof (Ltz.).

T. carinatus Müll. s. s. 2 St. Loppehnern (Eld.).

Gronops lunata Fabr. s. in Sandgruben der Strandgegenden, Rauschen (Stor., Ltz.).

Alophus triguttatus Fabr. n. h. Kbg. (Eld., Ltz.).

Phytomyces (Hypera) punctatus n. s. ebenso, Dz. (Czw.).

P. fasciculatus Hbst. n. s. Vierbrüderkr. (König), Houb. (Helm).

P. Julini Sahib. s. aus Moos von Bersecken (Ltz.).

P. polygoni Fabr. h. Kbg. (Ltz.).

P. murinus Fabr. n. s. Dz. (Czw.).

P. variabilis Hbst. h. Lyck (Sanio).

P. plantaginis Deg. n. s. ebenso, Dammhof (Ltz.).

P. arundinis Pk. n. s. wohnt in Siium, Phellandrium u. ähnlichen Umbellaten, Brückenkopf bei Tilsit, Dammhof (Ltz.).

P. pollux Fabr. n. h. wie plantaginis.

P. rumicis L. s. h. überall.

P. contaminatus Hbst. s. Sieb.

P. striatus Boh. s. Kbg. (Ltz.), Neustadt (Fritzen).

P. metes Fabr. n. s. Lyck (Sanio), Kbg. (Ltz.).

P. posticus Gyl. s. Dz. (Dommer, Frantzius), Loppehnern (Eld.).

P. elongatus Pk. s. Dz. auf Wasserpflanzen (Dommer, Helm), Ggbg. (Kr.). (Berl. E. Z. XV. p. 100.)

P. suspiciosus Hbst. h. Lyck (Sanio).

P. viciae Gyll. n. s. Loppehnern (Eld.), Fuchsberg (Sauter), Hochwasser b. Dz. (Czw.).

P. nigrirostris Fabr. h. Kbg. (Ltz.).

Limobius dissimilis Hbst. s. s. Dz. (Czw.).

Cleonus albipennis Fabr. n. h. in Kiefernwäldern, in Fanggräben, Lyck (Sanio), Kbg. (Ltz., Grabowski).

C. nebulosus L. n. h. Dz. (Dommer).

C. turbatus Schh. *glaucus* Gyll. h. wie *albidus* (von *nebulosus* verschieden?).

C. ophthalmicus Rossi, einmal bei der Allensteinschen Glashütte gefunden (Kug.), aber nicht wieder.

C. varius Hbst. s. in einer pr. Forst (Dossow).

C. altornans Oliv. *cineraceus* Schrk. s. ebenso.

C. costatus Fabr. in Kug. Berl. Manuser. p. 174 durch Hellwig nachgetragen, ohne Angabe des Fundorts; neuerlich nicht wieder gefunden.

C. trisulcatus Hbst. s. Spittelhof 1843 (Eld.), Goldap, Lyck (Sanio).

C. marmoratus Fabr. n. h. wie *albidus*.

C. sulcirostris L. h. auf Sandboden.

Lixus paraplecticus L. h. wohnt in Phellandrium, Dammhof (Eld., Ltz.).

L. turbatus Gyll. n. s. ebenso; auf *Cicuta virosa*, Lyck (Sanio).

L. angustus Hbst. s. Lyck (Sanio).

L. ascanii L. s. zwischen Pillau u. Fischhausen (Nanke), Dz. (Sieb.).

L. angustatus Fabr. s. s. wie *angustus*.

L. bardanae Fabr. n. s. auf Rumex-Arten, Oletzko, Lyck (Sanio).

L. junci Boh. s. Oliva, Juli (Stf.).

L. pollinosus Germ. s. Dz. in Sandgruben (Dommer).

Larinus sturnus Schall. s. Neuhausen (Sauter), Bludauer Forst (Dossow), Pogrommen bei Darkehmen (Hensche).

L. jaceae Fabr. n. s. auf *Centaurea jacea*, Lyck (Sanio).

L. planus Fabr. u. var. *carlinae* Oliv.
(Kraatz B. E. Z. XVI. 144) n. h. Ggbg. (Kr.),
auf *Cirsium arvense* Lyck (Sanio), Dammhof
(Ltz.).

L. senilis Fabr. s. auf *Carlina vulgaris*, Lyck
(Sanio).

Molytes coronatus Goeze s. s. Sieb.

M. germanus L. s. s. Kug., Sieb.

M. carinaerostris Küst. n. h. Hlgbl. (Stnr.),
Tilsit (Ltz.).

Trachodes hispidus L. n. h. Putziger Stadt-
wald, Oliva (Stf.), Kbg. (Sauter, Czw.), Ggbg.
(Kr.) F. F. (Stnr.).

Lepyrus colon Fabr. h. auf Weiden.

L. binotatus Fabr. n. s. ebenso, Kbg.
(Ltz.).

Hylobius pineti Fabr. n. h. Galtgarben (Eld.),
Wilkie (Ltz.).

H. abietis L. g. überall auf Nadelholz.

H. pinastri Gyll. bei Kbg. h. (Ltz.), bei
Lyck s. (Sanio).

H. satuus Rossi. s. Ludwigsort (Sauter),
Dz. (Zebo).

Pissodes piceae Illig. s. Pr. Stürgard (Schmidt).

P. pini L. s. Lyck (Sanio), Wilkie (Eld., Ltz.).

P. notatus Fabr. s. h. auf Nadelholz.

P. strobili Redt. n. s. Kbg. (Ltz.), Loppehnen
(Eld.), Lyck Neuendorfer Wald (Sanio).

P. harcyniae Hbst. zuw. h. Galtgarben
(Eld., Ltz.).

P. piniphilus Hbst. s. Ggbg. (Kr.), Kbg.
Holzwiesen, Schwarzort (Czw.).

Grypidius equiseti Fabr., *atrirostris* Fabr.
n. s. Kbg. (Ltz.)

G. brunnirostris Fabr. n. h. ebenso.

Erikrinus bimaculatus Fabr. n. h. Damm-
hof (Pfeil, Ltz.), Dz. (Czw.).

E. secripi Fabr. h. Dammhof (Kuwert, Ltz.).

E. acridulus L. s. h. überall.

E. Märkellii Boh. n. h. Loppehnen (Eld.).

E. aethiops Fabr. n. h. ebenso, Palmburg
(Ltz.), Kbg. Pregelwiesen (Czw., Stnr.).

E. festucae Hbst. n. s. Dammhof (Stnr.,
Czw., Ltz.).

E. nereis Pk. n. s. ebenso.

E. scirrhosus Gyll. n. s. ebenso.

Dorylomus vorax Fabr. *macropus* Redt. n.
s. Kapkeim (Ltz.).

D. tremulae Pk. h. auf Erlen, Kbg. (Ltz.).

D. variegatus Gyll. s. Dz. Neustadt (Fritzen).

D. costirostris Gyll. *bituberculatus*
Zett. n. s. auf Weiden, Dammhof (Sauter,
Ltz.).

D. affinis Pk. s. Kbg. (Ltz.).

D. suratus Gyll. s. Kbg. Plantage (Stnr.),
Neustadt (Fritzen).

D. taeniatus Fabr. n. s. ebenso.

D. occalescens Gyll. s. Loppehnen (Eld.),
Dz. (Helm.).

D. flavipes Pz. s. Neustadt (Fritzen).

D. agnathus Boh. n. h. Ggbg. (Kr.), F. F.
(Stnr.).

D. majalis Pk. n. s. auf Weiden, Kbg.
(Ltz.), Lyck (Sanio).

D. pectoralis Pz. n. s. auf *Salix fragilis*,
ebenso.

D. tortrix L. n. s. wie *majalis*.

D. minutus Gyll. s. Dz. (Helm.), Wernsdorf
(Stnr.).

D. villosulus Gyll. s. Neustadt (Fritzen).

D. filirostris Gyll. s. Kbg. (Czw.), Kapkeim
(Ltz.), Neustadt (Fritzen).

D. dorsalis L. n. h. auf Weiden, Dammhof
(Ltz.).

Pseudostyphlus (Erikrinus) pflumnus Gyll.
n. h. Ggbg. (Kr.), Warnicker u. F. F. (Ltz.
Czw.).

Smirronyx politus Boh. s. aus Röhricht vom
Pregeldamm (Sauter, Ltz., Stnr.).

Brachonyx indigena Hbst. h. auf Nadelholz
(Ltz.).

Anoplus plantaris Naezen, *roboris* Sustr.
n. s. auf Birken, Kbg. (Ltz.).

Tanyphryrus lemnae Fabr. h. an Lemnaarten,
Dammhof (Ltz.).

Bagoes (Lepyrus) cylindrus Pk. n. s. Gold-
bach an der Deime (Ltz.), Dz. (Frantzius).

B. rotundicollis Boh. s. s. Dammhof
(Pfeil).

B. nodulosus Schh. s. Dz. auf nassen Wiesen
an der Weichsel (Fritzen).

B. binodulus Hbst. h. auf *Stratiotes aloides*,
Dammhof (Kuwert, Ltz.).

B. subcarinatus Gyll. s. Kbg. Pregelwiesen
am Holländer Baum (Czw.).

B. frit Hbst. s. Dammhof (Eld.).

B. diglyptus Boh. s. ebenso.

B. lutulosus Gyll. s. Lyck (Sanio). F. F.,
Neuhäuser (Stnr.).

B. tempestivus Hbst. s. Dz. (Ltz.).

B. limosus Gyll. s. an Sümpfen auf Wasser-pflanzen Dz. (Dommer, Frantzius). Dammhof (Czw.).

B. lutescens Gyll. s. Kbg. (Ltz.), Memel (Stnr.).

B. lutulentus Gyll. h. Dammhof (Eld., Stnr., Ltz.).

B. nigritarsis Thoms. s. Kbg. auf Pregel-wiesen, Dammhof (Czw.), Neustadt (Fritzen).

Hydrocharis alismatis Marsh. n. s. auf Wiesen Blaustein (Ltz.), Dz. (Helm), Kbg. (Sauter).

Cryptorhynchus lapathi Linn. n. s. am Stomme von Weidengestrüuch, Kbg. (Eld., Ltz.).

Acalypha camelus Fabr. s. fehlt im Norden; aus Laub gesiebt, Ggbg. (Kr.).

A. ptiloides Marsh. s. ebenso.

Magdalina membranous Falb. carbonarius Fabr. s. Nehrung bei Pillau (Sauter).

M. phlegmaticus Hbst. s. Ggbg. (Kr.).

M. linearis Gyll. s. Löwenhagen (Ltz.), Rauschen (Stnr.).

M. duplicatus Germ. n. s. ebenso, von Abies geklopft, Pr. Stargard (Schmidt).

M. frontalis Gyll. s. Schwarzort (Czw.).

M. violaceus L. n. h. Ludwigsort (Ltz.).

M. nitidus Gyll. einmal h. bei Fehstein (Ltz.), Dz. (Helm).

M. cerasi L. n. s. Kbg. (Ltz.).

M. aterrimus Fabr. stygius Gyll. s. Dz. (Frantzius), Pröbbernau (Schindowsky).

M. carbonarius L. atramentarius Germ. s. Warnicken (Ltz.).

M. flavicornis Gyll. s. Zoppot (Czw.).

M. barbicornis Latr. s. Dz. (Frantzius), Loppehnen (Eld.).

M. pruni L. h. namentlich auf Ebereschen, Liep (Ltz.).

Balanus venosus Germ. s. im Gutsgarten von Liep von Eichen geklopft Ende Mai (Ltz.).

B. nucum L. n. h. auf Corylus, Warnicken (Ltz.).

B. turbatus Gyll. s. s. Luckneiner See bei Nicolayken, 1 St. (Sanio).

B. villosus Fabr. n. h. auf Eichen, Neu-hausen, Arnau (Stnr.), Juditten (Ltz.), Oliva (Czw.).

B. erasorum Hbst. n. s. auf Birken und Erlen, Pillauer Plantage (Eld., Ltz.), Oliva (Czw.), Memel (Stnr.).

B. rubidus Gyll. s. Dz. (Dommer), Glettkaу (Czw.).

B. crux Fabr. h. Kbg. (Ltz.).

B. brassicae Fabr. h. ebenso.

B. pyrrhoceras Marsh. n. h. auf Weiden, Loppehnen (Eld.), Putzig (Stf.), Prell (Stnr.).

Anthonomus rubi Hbst. h. Kbg. (Ltz.).

A. pubescens Pk. h. im ganzen Sommer auf Nadelholz, Bludauer Forst (Ltz.), Schromb. (Stnr.).

A. varians Pk. n. h. ebenso.

A. cinctus Redt. s. Heub. Dünen (Fritzen).

A. ulmi Deg. s. Dz. (Ltz.).

A. pedicularius L. s. ebenso.

A. spilotus Redt. n. h. auf blühendem Crataegus, Schromb. (Czw., Stnr., Ltz.), Dz. (Helm).

A. pomorum L. n. s. an Obstbaumblüthen, Kbg. (Ltz.).

A. incurvus Pz. n. h. Putzig (Stf.), von Ebereschen geklopft, Dammhof (Sauter).

A. druparum L. g auf blühender Prunus padus, Arnau, Aweiden (Ltz.).

Acalyptus carpini Hbst. s. Kbg. (Ltz.), Dz. (Dommer).

Ellescus scanicus Pk. n. h. Schwarzort (Ltz.).

E. bipunctatus L. h. Fehstein, Morgen, auf Weiden (Ltz.).

Tychius 5-punctatus L. n. s. auf Poten-tilla verna, Loppehnen (Eld.), Rauschen (Ltz.).

T. polystylatus Germ. s. auf Anthyllis vulneraria, Pillauer Dünen Juli (Ltz., Stnr.).

T. Schneideri Hbst. s. Dz. (Zebe), Kbg. (Ltz.).

T. squamulatus Gyll. n. h. auf Melilotus, Cranz (Ltz.).

T. venustus Fabr. Dz. auf Sarothamnus h. (Ltz.), Kleinhalde (Stnr.).

T. medicaginis Brs. s. Ggbg. (Kr.).

T. junceus Reich. h. auf Lotus cornic. Pillau, auf Mellilotus vulgaris Arnau (Ltz.), Memel (Stnr.), Dz. (Czw.).

T. tomentosus Hbst. g überall.

T. picrotris Fabr. n. s. Dz. von Heide-kraut geschöpft (Dommer, Frantzius, Czw.), Kbg. (Ltz.), var. posticinus Schh. Neustadt (Fritzen).

Sibinia sodalis Germ. s. Ggbg. (Kr.).

S. primita Hbst. s. ebenso, Dz., Neustadt (Fritzen).

S. cana Hbst. n. s. auf gräsig sandigen Anhöhen, Loppehnen (Eld.), Lyck (Sanio).

- S. viscariae* L. s. Dz. (Dommer).
S. potentillae Germ. h. auf *Spergula arvensis*, Rauschen (Ltz.), Dammhof (Stnr.).
Mecinus piraster Hbst. n. h. Rauschen (Ltz.).
M. collaris Germ. n. h. in Sandgruben bei Ludwigsort (Pfeil); Kbg., Tilsit (Ltz.).
Gymnetron pascuorum Gyll. s. Loppehnen (Eld.). Kbg. (Ltz.).
G. villosulum Gyll. s. auf *Veronica beccabunga* Kbg. (Ltz.).
G. veronicae Germ. h. überall.
G. beccabungae L. n. h. Kbg. (Ltz.).
G. labile Hbst. n. h. Hirschau (Ltz.).
G. stimulosum Germ. s. s. 1 St. Lyck (Sanio).
G. rostellum Hbst. n. h. Palmburg (Ltz.), Ggbg. (Kr.), Neustadt (Fritzen).
G. netum Germ. s. am Seestrande (Ltz.).
G. linariae Pz. h. auf *Lin. vulgaris*, Rauschen (Ltz.).
G. tetrum Fabr. n. h. ebenso, Lyck (Sanio).
G. antirrhini Germ. h. wie *linariae*.
G. noctis Hbst. s. Rauschen (Ltz.).
G. pilosum Gyll. s. Kbg. (Sauter), Lyck (Sanio).
 Der als *G. thapsicola* Germ. von Stf. bezeichnete Käfer (Putzig) ist wahrsch. *asellus* Grav. gewesen (Seidl. Fn. Balt. p. 438 Anm.).
Miarus longirostris Gyll. s. 2 St. am Seestrande (Ltz.).
M. graminis Gyll. s. aus den Samenkapseln von *Campanula rapunculoides* gezogen (Sieb.), Lyck (Sanio).
M. campanulae L. s. h. in den Glocken von *Camp. latifolia*, Warnicker Park (Eld., Ltz.).
M. micros Germ. s. Neustadt (Fritzen).
M. plantarum Dej. s. Putzig (Stf.).
Cionus scrophulariae L. h. auf der Nährpflanze.
C. verbasci Fabr. h. ebenso.
C. Olivieri Chevr. s. Kbg. (Eld.).
C. thapsus Fabr. h. auf *Verbascum th.* Lyck (Sanio).
C. hortulanus Marsh. s. Dz. (Dommer) auf *Verbascum*.
C. biannulata Fabr. Hellwig im Berl. Mannaer. p. 172 bemerkte: „eines der von Kugel. als *Cure. thapsi* überschickten Expl. war *biannulata*“. Bis jetzt nicht wieder gefunden.
- C. pulchellus* Hbst. s. Dz. (Dommer, Frantzius), Ponarth (Ltz.).
C. fraxini Deg. s. auf jungen Eschen Putzig (Stf.), Fehstein (Ltz.).
Nanophyes gracilis Redt. s. Horst, auf einer Pregelwiese 4 St. (Kuwert), auf Rasenplätzen Neustadt (Fritzen), Juditten (Grabowski).
N. globulus Germ. s. auf *Populus tremula* Putzig (Stf.).
N. lythri Fabr. h. Kbg. (Ltz.).
Orchestes quercus L. h. auf Eichen, Warnicken (Ltz.).
O. rufus Oliv. s. auf Ulmen am Alleuer (Sauter), Dz. (Dommer).
O. scutellaris Fabr. n. s. F. F. (Stnr.), Loppehnen (Eld.) auf Birken; die var. *pubescens* Stev. s.
O. alni L. s. Friedland, am Alleuer, Wehlau (Sauter).
O. ilicis Fabr. h. auf Eichen, überall (Ltz.).
O. Jota Fabr. n. h. auf *Rubus saxatilis* (Kug.), Fehstein (Ltz.), Vierbrkr. (Stnr.).
O. sagi L. h. auf *Carpinus*, Kbg. (Ltz.).
O. pratensis Germ. n. h. Dz. (Frantzius), Luckneiner Forst bei Nikolayken (Sanio).
O. lonicerae Hbst. n. s. auf *Lon. xylosteum* Blaustein (Ltz.).
O. rusci Hbst. *bifasciatus* Gyll. h. auf Weiden Kbg. (Ltz.).
O. signifer Creutz. n. s. ebenso, Putzig (Stf.).
O. decoratus Germ. s. F. F., Juni (Czw.).
O. salicis L. h. wie *rusci*; die var. *rustaris* Germ. Loppehnen (Eld.), Lyck (Sanio).
O. stigma Germ. h. wie *rusci*.
O. populi Fabr. s. h. überall auf Pappeln.
O. saliceti Fabr. n. s. wie *rusci*.
Ramphus flavicornis Clairv. h. auf versch. Gesträuchen, bes. Ellern, Kbg. (Ltz.).
Mononychus pseudacori Fabr. n. h. auf *Iris*, Kbg. (Ltz.), Dz. (Dommer).
Cbeliodes quercus Fabr. h. auf Eichen, Warnicken (Ltz.).
C. rubicundus Pk. s. auf Birken, Putzig (Stf.), Loppehnen (Eld.), Lyck (Sanio).
C. epilobii Pk. h. auf *Epil. angustif.* Putzig (Stf.), Löwenhagen (Ltz.).
C. guttula Fabr. n. h. Ggbg. (Kr.), Lyck (Sanio), Neuhausen (Stnr.).

- C. subrufus* Hbst. h. F. F., Neuhäuser, Preß (Ltz., Star.).
C. didymus Fabr. g. überall auf Labiaten.
C. lamii Eab. h. punctulum Hbst. auf Lam. album, Kbg. (Ltz.).
C. geranii Pk. exiguum Oliv. im Süden n. s. Ggbg. (Kr.), Lyck (Sanio).
Scleropetalus serratus Germ. n. s. an sumpfigen Stellen der F. F. (Czw., Ltz.), Echstein, Liep (Eld.).
8. (*Rhytidosomus*) *globulus* Hbst. s. Dz. (Ltz., Czw.), F. F., Löwenhagen (Star.).
Rhinocoris castor Fabr. s. h. auf Rumex acetosella.
R. bruchoides Hbst. h. ebenso.
R. inconspectus Hbst. n. s. Pr. Holland (Sieb.), Kbg. (Ltz.).
R. pericarpinus L. h. wie castor, Kbg. (Ltz.).
R. guttalis Gray. subfasciatus Gyll. n. s. ebenso, Lyck (Sanio), Pregelwiesen (Czw.).
R. albicinctus Gyll. s. s. Sieb.
Phytobius Waltoni Boh. notula Germ. s. Dz. (Dommer), Ggbg. (Kr.), an sumpfigen Stellen der F. F. und Löwenhagen (Czw.).
P. canaliculatus Fabr. n. h. Kbg. (Ltz.).
P. 4-nodosus Gyll. s. Dz. (Frantzius), Lyck (Sanio).
P. comari Hbst. n. h. Dammhof (Ltz.).
P. 4-tuberculatus Fabr. h. Kbg. (Ltz.).
P. 4-cornis Gyll. s. wie 4-nodosus.
Litodactylus leucogaster Marsh. s. Lyck (Sanio), Neuhäuser (Star.).
L. velatus Beck. s. Blaustein (Ltz.).
Amalus scortillum Hbst. h. auf Cruciferen, Kbg. (Ltz.).
Orobis cyaneus L. s. Georgenswalde (Ltz.), F. F. (Star.), Heub. (Sieb.).
Onthophagus troglodytes Fabr. n. s. Kbg. (Ltz.).
C. apicalis Gyll. s. Sieb.
C. depressoicollis Gyll. s. Sieb.
C. melanarius Steph. convexicollis Boh. s. Loppehnen (Eld.).
C. querrieola Pk. s. Wehlau (Sauter), Lyck (Sanio).
C. floralis Pk. s. h. auf Cruciferen.
C. achilleae Gyll. s. Lyck (Sanio).
C. constrictus Marsh. s. Neustadt (Fritzen).
C. pulvinatus Gyll. s. Wehlau (Sauter).
C. pumilio Gyll. s. Ggbg. (Kr.).
C. querceti Gyll. n. h. Kbg. (Ltz.).
C. arator Gyll. s. wie pumilio.
C. syrites Germ. alauda Fabr. h. ebenso, Kbg. (Ltz.).
C. assimilis Pk. h. ebenso.
C. erysimi Fabr. h. auf Cruciferen, Kbg. (Ltz.).
C. contractus Marsh. hirtulus Germ. h. ebenso.
C. cochleariae Gyll. n. h. Putzig (Stf.), Wehlau (Sauter), Lyck (Sanio).
C. nanus Gyll. n. s. Lyck (Sanio).
C. ericae Gyll. n. h. auf Er. vulgaris, Rauschen (Star., Ltz.), Putzig (Stf.).
C. sphæerion Schb. s. Neustadt (Fritzen).
C. echii Fabr. s. Kbg. (Ltz.), häufiger bei Dz. (Czw.).
C. viduatus Gyll. s. Rosenau b. Kbg. (Ltz.).
C. raphani Fabr. s. Loppehnen (Eld.), Kbg. (Ltz.).
C. borraginis Fabr. s. s. Loppehnen (Eld.).
C. abbreviatulus Fabr. s. Dahlheim (Wohlfahrm), Kbg. (Ltz.).
C. cruciger Hbst. n. h. Kbg. (Ltz.).
C. litura Fabr. n. h. Lyck, Nicolayken (Sanio), Warnicken (Ltz.).
C. trimaculatus Fabr. s. Lyck (Sanio).
C. albosignatus Gyll. s. Löwenhagen (Ltz.).
C. asperifoliarum Gyll. n. s. ebenso, Dz. (Frantzius).
C. campestris Gyll. n. h. Kbg. (Ltz.), Lyck (Sanio), Neustadt (Fritzen).
C. pubicollis Gyll. s. F. F. (Czw.).
C. triangulum Boh. s. Lyck (Sanio), Ggbg. (Kr.), Kbg. (Grabowski).
C. chrysanthemi Gyll. figuratus Gyll. s. ebenso, Loppehnen (Eld.), Putzig (Stf.), Lyck (Sanio), F. F., Neuhausen (Star.).
C. rugulosus Hbst. s. Putzig (Stf.), Kbg. (Grabowski), wohl mit dem vorigen identisch (Thoms.).
C. arquatus Hbst. s. Ggbg. (Kr.).
C. melanostictus Marsh. s. Dz. Hochwasser (Czw.), var. lycopi Gyll. Ggbg. (Kr.).
C. quadridentis Pk. n. s. Kbg. (Ltz.).
C. marginatus Pk. punctiger Gyll. h. ebenso.
C. pollinarius Forst. n. h. ebenso.
C. obsoletus Gyll. s. Loppehnen (Eld.), Waldau (Ltz.).

- C. tarsalis* Boh. s. Loppehnenn (Eld.).
C. rapae Gyll. n. h. Dz. (Franzius), Lyck (Sanio).
C. barbarese Suffr. *cyanopterus* Redt. s. s. Lyck (Sanio).
C. ignitus Germ. s. Dz. (Czw.).
C. cyanipennis Germ. h. auf Brassica-Arten Kbg. (Ltz.).
C. suturellus Gyll. s. Lyck (Sanio).
C. chalybaeus Gyll. s. ebenso.
Poophagus sisymbrii Fabr. n. s. Dammhof (Ltz.).
Tapinotus sellatus Fabr. n. h. auf Moorbewiesen, Juditten, Dammhof (Ltz.), F. F. (Czw., Strn.).
Marnirotopus Besseri Gyll. s. Kbg. (Sauter).
Coryssomorus capucinus Beck. s. Kbg. Ausfallthor, Neuhiuser, Oliva (Strn., Czw.).
Baridius nitens Fabr. s. in den Danziger Dünen (Dommer, Franzius).
B. artemisiae Hbst. n. s. auf Artem. vulgaris Kbg. (Ltz., Strn.).
B. picinus Germ. n. s. Lyck (Sanio), Neuhiuser (Strn.).
B. chloris Fabr. s. Sieb.
B. lepidii Germ. n. s. wie picinus, Dz. (Franzius).
B. abrotani Germ. s. Kbg. (Ltz.), Dz. (Helm).
B. T-album L. n. s. auf Wiesen ebenso.
Sphenophorus abbreviatus Fabr. auf *Cornus sanguinea*, Osterodo (Kug.), aber bisher nicht wieder gefunden.
Calandra granaria L. zuw. h. an sonnigen Frühlingstagen an den Wänden der Kornspeicher (Ltz.).
Dryophthorus lymoxylon Fabr. s. Gelguhnen (Ltz.).
Cotaster uncipes Boh. s. s. Georgenswalde unter Seestadt Juli 1860 (Ltz.).
Cossonus linearis Fabr. n. s. im Mulf alter Wäldern und Linden, Osterode (Kug.), Kbg. (Nanke, Ltz.).
C. ferrugineus Clairy. s. in Holzwerk, Dz. (Schmidt).
C. cylindricus Sahib. n. s. wie linearis.
Phloeophagus spadix Hbst. s. s. Memel (Strn.).
Rhynchos chloropus Fabr. n. s. Kbg. (Ltz.).
R. elongatus Gyll. n. h. Prößbernau (Schindowski).
R. culinaris Germ. s. Kbg. Plantage (Eld., Strn.), Dz. (Franzius).
R. lignarius Marsh. *cylindrirostris* Oliv. s. Kbg. (Ltz.).
R. reflexus Boh. s. Dammhof, Wilkie (Sauter).
R. porcatus Germ. s. wie elongatus, Dz. (Helm).
R. truncorum Germ. s. Sieb.
Apion pomonae Febr. g. auf Nadelholz.
A. opeticum Bach. s. Ggbg. (Kr.), Dammhof, Neuhausen (Strn.).
A. craccae L. h. Kbg. (Ltz.).
A. cerdo Gerst. s. Ggbg. (Kr.), Lyck (Sanio).
A. subulatum Kirb. n. h. Milchbuder Forst bei Lyck (Sanio), F. F., Kleinhainde (Strn.).
A. ochropus Germ. s. s. Braunsbg., von jungen Buchen geklopft (Schindowsky).
A. carduorum Kirb. h. Kbg. (Ltz.).
A. basicorne Illig. s. Sieb.
A. tenue Kirb. s. Neustadt (Fritzen).
A. penetrans Germ. s. Westpr. (Strübing) Berl. Ent. Z. IV. p. 322; Lyck (Sanio).
A. onopordi Kirb. s. Lyck (Sanio).
A. confluens Kirb. *stolidum* Germ. n. h. wie penetrans, Kbg. (Strn.).
A. vicinum Kirb. n. s. Kbg. (Ltz.), Lyck (Sanio).
A. atomarium Kirb. n. s. Dammhof (Eld.), Putzig (Stf.).
A. Hookeri Kirb. h. Kbg. (Ltz.).
A. difficile Hbst. s. Dz. (Dommer).
A. fuscirostre Fabr. h. aus den Früchten von *Sarothamnus erzogen*, Redlau b. Dz. (Eld.), Zoppot (Ltz.).
A. pallipes Kirb. s. Dz. (Dommer).
A. vernalis Fabr. h. auf *Urtica dioica*.
A. aeneum Fabr. n. s. Kbg. (Ltz.), Lyck (Sanio).
A. radiolus Kirb. n. s. ebenso.
A. astragali Pk. n. h. Dz. (Dommer), Kbg. (Ltz.), auf Astr. glycyphyllos.
A. ononis Kirb. s. Neustadt (Fritzen).
A. dispar Germ. s. Loppehnenn (Eld.).
A. striatum Marsh. s. Neustadt (Fritzen).
A. pubescens Kirb. *civicum* Germ. n. s. Putzig (Stf.).
A. simile Kirb. n. h. auf Birken, Loppehnenn (Eld.), Putzig (Stf.), Lyck (Sanio).
A. alcyoneum Germ. s. Neustadt (Fritzen).
A. seniculus Kirb. n. s. ebenso; Dz. Nehlung (Helm).
A. elongatum Germ. s. s. Lyck (Sanio).

- A. rufirostre** Fabr. n. h. Kbg. (Ltz.).
A. vicinae Pk. h. Lyck (Sanio).
A. dissimile Germ. s. Oliva (Czw.).
A. varipes Germ. s. Loppehnen (Eld.).
A. apricans Hbst. sagi Kirb. g. überall auf Trifolium.
A. ononidis Gyll. s. Loppehnen (Eld.).
A. assimile Kirb. n. h. Kbg. (Ltz.), Lyck (Sanio).
A. trifolii L. aestivum Germ. h. Dz. (Dommer, Frantzius), die var. *rufius* Germ. seltener (Helm).
A. flavipes Fabr. g. wie *apricans*.
A. nigritarse Kirb. s. s. Lyck (Sanio).
A. ebeninum Kirb. s. Kbg. (Ltz.), Lyck (Sanio).
A. sulcifrons Hbst. s. Dz. (Dommer, Frantzius).
A. punctigerum Pk. s. ebenso.
A. virens Hbst. h. Kbg. (Ltz.).
A. validirostre Gyll. s. ebenso, Lyck (Sanio).
A. Gyllenhalii Kirb. s. Kbg. (Sieb.), Lyck (Sanio).
A. cervi Kirb. n. h. Kbg. (Ltz.).
A. filirostre Kirb. s. Dz. (Helm), Kbg. (Ltz., Stnr.).
A. minimum Hbst. n. s. Putzig (Stf.), Ggbg. (Kr.), Damnhof (Stnr.).
A. pisi Fabr. n. s. Loppehnen (Eld.), Kbg. (Ltz.).
A. aethiops Hbst. h. ebenso, Dz. (Dommer).
A. sorbi Hbst. n. s. wie *pisi*.
A. angustatum Kirb. loti Kirb. n. h. Waldau (Ltz.).
A. columbinum Germ. s. Wehlau (Sauter), Dz. (Helm).
A. Spencei Kirb. s. Putzig (Stf.), Kbg. (Ltz.).
A. vorax Hbst. h. Kbg. (Ltz.).
A. pavidum Germ. s. auf *Coronilla varia*, Dz. (Czw.).
A. minutum Germ. n. s. Dz. (Dommer), Lyck (Sanio), auf *Rumex obtusifolius*.
A. frumentarium L. haematodes Kirb. cruentatum Watton h. Kbg. (Ltz.).
A. rubens Steph. s. Löwenhagen (Ltz.), Lyck (Sanio).
A. sanguineum Deg. n. s. Kbg. (Ltz.).
A. brevirostre Hbst. s. Loppehnen (Eld.), F. F. (Stnr.).
A. seculare Germ. s. Sieb.

- A. violaceum** Kirb. n. s. Kbg. (Ltz.).
A. hydrolapathi Kirb. bei Lyck h. (Sanio).
A. marchicum Hbst. n. s. Kbg. (Ltz.).
A. humile Germ. s. h. überall
A. simum Germ. s. Kbg. Hlbl. (Stnr.).
Anm. A. difforme Ahr. von Eld. (Loppehnen) angegeben, aber das Stf seiner Sammlung war *varipes* ♀ (Ltz.).
Auletes basilaris Gyll. s. s. Neustadt (Fritzen), Strübing (Berl. Ent. Z. IV. p. 323).
Rhynchos betuleti Fabr. h. Kbg. (Ltz.).
R. populi L. h. ebenso.
R. auratus Scop. s. auf Obstblüthen, Mägen (Ltz.).
R. Bacchus L. s. Blaustein (Ltz.).
R. aequatus L. n. s. auf blühenden Ebereschen, Arnau, Liep (Ltz.).
R. alliariae Pk. n. s. Loppehnen (Eld., Ltz.), Neuhausen (Stnr.).
R. germanicus Hbst. minutus Gyll. h. Dz. (Frantzius), Kbg. (Ltz.).
R. aeneovirens Marsh. s. Wargen (Sauter), Dz. (Helm).
R. cupreus L. n. s. wie *aequatus*.
R. nanus Pk. n. s. Lyck (Sanio), Kbg. (Ltz.).
R. menziesii (L.) Gray s. auf den Strandgegenden der Küste (Helm).
R. pubescens Fahr. s. Elbing (Kug.), Dz. (Sieb.).
R. ophthalmicus Steph. s. auf jungem Hasellaube, Neustadt (Fritzen).
R. coeruleocephalus Schh. s. Kug., Sieb.
R. betulae L. h. auf jungen Birken, überall.
Attelabus curculionoides L. n. h. Lyck (Sanio), Prell (Ltz.).
Apoderus corylli L. avellanae L. h. auf Haseln, Bludauer Forst (Ltz.).
A. intermedius Hellw. zuw. h. auf *Comarum palustre* von Moorwiesen, Mägen, Damnhof (Pfeil, Ltz.), Neuhausen (Stnr.).
Diodyrhynchus austriacus Oliv. s. Hlbl. (Stnr.), Blaustein, Metgethen, von Abies geklopft (Ltz.), Schromb. (Czw.).
Rhinomacer attelaboides Fabr. n. h. Bludauer Forst, auf Nadelholz (Ltz., Stnr.).

Anthribidae.

- Platyrhinus latirostris** Fabr. n. h. an *Pinus*-stubben, Elbing (Sieb.), Putzig (Stf.), Neustadt (Helm), Fchstein (Ltz.).

Tropidoreus albirostris Hbst. s. Kug., Sieb.
T. Edgreni Schh. s. s. auf einem Gras-
 platz neben Rothbuchen und Espen, Neustadt
 (Fritzen).

T. sepicola Fabr. s. Vogelsang bei Elbing
 (Eld.), Putzig (Stf.), Alexwangen (Ltz.).

T. niveirostris Fabr. s. in Eichenholz,
 Osterode (Kug.), Putzig (Stf.), Wargen (Sauter),
 Löwenhagen (Ltz.).

T. cinctus Pk. zuw. h. bei Osterode (Kug.),
 einmal bei Tilsit (Stf.).

Anthribus albinus L. n. h. Kgb. (Ltz.), Eichen-
 krug (Stnr.).

A. (Brachytarsus) scabrosus Fabr. s. auf
 Rhamnus cathartica, Putzig (Stf.).

A. varius Fabr. s. h. auf Abies, Schwarzort
 in den kugelförmigen ♀ von Schildläusen, be-
 sonders Lecanium racemosum Ratz. (Künow).

Choragus Sheppardi Kirb. s. auf Garten-
 spiränen, Blaustein (Ltz.), Bludauer Forst (Dossow).
 Glettkau (Czw.).

Bruchidae.

Spermophagus cardul Boh. n. s. Ggbg. (Kr.),
 bei Lyck vor wenigen Jahren g. (Sanio).

Bruchus marginalis Fabr. s. in den Samen
 von Oxytropis pilosa Graudenz (Körnicke).

B. olivaceous Gorm. n. s. Karbojin bei Lyck
 (Sanio).

B. pisi L. s. Lyck (Sanio).

B. rufimanus Boh. bei Kbg. jetzt kaum
 bemerkt (Stnr.), bei Lyck auf Vicia Faba n. s.,
 auch überwinternd im Moose (Sanio), Neustadt
 (Fritzen).

B. luteicornis Illig. n. h. Ggbg. (Kr.),
 Lyck (Sanio), Aweiden (Stnr.).

B. granarius L. g. in Leguminosen, bes.
 in Viola septum.

B. loti Pk. n. h. auf Lathyrus pratensis,
 Waldau (Körnicke), Lyck (Sanio), Schromb.
 (Czw.).

B. cistii Pk. ater Marsh. n. s. Allonstein
 (Kug.), Lyck (Sanio), Neustadt (Fritzen).

B. bipunctatus Sulz, Kbg. (Nanke), seit-
 dem nicht wieder gefunden.

Scolytidae.

Hylocurus ater Pk. s. h. auf Kiefern.

H. cunicularius Er. n. s. Dammhof (Ltz.),
 Wilkie (Eld.).

H. attenuatus Er. s. unter Pinusrinde, Neu-
 stadt (Fritzen).

H. angustatus Hbst. n. s. wie cunicul.

H. opacus Er. n. s. Dz. (Ltz.).

H. palliatus Gyll. g., wie ater.

H. trifolii Müll. in der Juraer Forst bei
 Tilsit n. s. (Andersch).

Hyllurgus ligniperda Fabr. n. h. an gefäll-
 ten alten Kiefern, Putzig (Stf.).

H. piniperda L. g. in Kiefernstubben.

H. minor Hartig. s. Ggbg. (Kr.).

Dendroctonus micans Kug. s. Mohrungen
 (Eld.).

Carphoborus pilosus Ratz. s. Braunsbg., unter
 Fichtenrinde (Schindowsky).

Phloeophthorus rhododactylus Marsh. n. h.
 Palmburg (Ltz.), Wilkie (Pfeil), F. F. (Stnr.).

Hylesinus crenatus Fabr. s. an den Wurzeln
 alter Eschen, Osterode (Kug.), Kbg. (Ltz.).

H. oleiperda Fabr. s. s. Warnicker Park
 (Eld.), Kbg. Plantago (Stnr.), sicherlich auf
 Eschen, welche botanisch mit Olea verwandt
 sind; früher auch bei Stettin und Hamburg ge-
 funden (Berl. E. Z. XI. 420, XVIII. 128).

H. fraxini Fabr. varius Fabr. g., eine Pest
 der Eschen.

H. vittatus Fabr. s. Kbg. (Andersch).

Polygraphus pubescens Fabr. n. h. Juraer
 Forst (Andersch), Blaustein (Ltz.).

Scalytus (Eccoptofastus) Ratzeburgii Janson.
 destructor Ratz. s. Kbg. (Ltz.).

S. destructor Oliv. Eccopt. scolytus
 Fabr. n. h. ebenso, in Birken u. Ulmen (Andersch).

S. multistriatus Marsh. s. in Ulmen, Kbg.
 (Andersch, Ltz.).

S. pruni Ratz. piri Ratz. s. Westpr. (An-
 dersch).

S. intricatus Ratz. pygmaeus Gyll. n. h.
 ebenso.

S. rugulosus Ratz. s. in Pflaumenbäumen,
 Braunsbg. (Dossow), Glettkau (Czw.), Neuhausen
 (Stnr.).

S. carpini Ratz. n. h. in einem Carpinus-
 Stamm auf dem Tragheim in Kbg. (Eld., Ltz.).

Crypturgus pusillus Gyll. n. s. Wilkie (Eld.,
 Ltz.), Vierbrkr., F. F. (Stnr.).

C. cinereus Hbst. n. s. ebenso.

Cryptotis abietis Ratz. n. s. Zinten, in der Damerau (Ltz.).

C. tiliae Pz. n. s. Fehstein. aus Linden zweigen (Ltz.).

C. fagi Nördl. s. aus Rothbuchen bei Ludwigsort (Dossow).

C. asperatus Gyll. *binodus* Ratz. s. im Greibenschen Revier in Epenrinde (Dossow), F. F. (Stnr.).

Pityophthorus Lichtensteinii Ratz. n. h. Löwenhagen (Ltz.), Masuren (Mühl.), Gauleden in absterbenden Rothannenästen (Dossow).

P. pityographus Ratz. s. nach dem Zeugniss Ratzeb. Forstins. 182 (Andersch).

Tomicus (Bostrychus) bispinus Dft. s. Braunsberg (Sauter).

T. bicolor Hbst. s. Schwarzort, Dammhof (Stnr.).

T. stenographus Dft. n. s. in Kiefernrinde, Braunsbg., Lyck, Wilkie (Andersch).

T. typographus L. h. in allen Nadelholzwäldern.

T. acuminatus Gyll. s. s. Eichholz bei Mehlsack (Andersch).

T. rectangulus Eichh. *duplicatus* Sahlb. s. s. Kbg. Holzwiesen bei der Plantage (Czw.).

T. laricis Fabr. h. in Nadelholz.

T. suturalis Gyll. *nigritus* Gyll. s. wie *acuminatus*; Kbg. (Czw.), Metgethen (Stnr.).

T. curvidens Germ. h. Kbg. (Ltz.), Braunsberg, Tilsit, Rastenbg. (Andersch).

T. chalcographus L. h. Brandenbrger Heide (Ltz.), Osterode (Kug.).

T. bidens Fabr. h. ebenso.

T. autographus Ratz. h. in allen Nadelholzwäldern (Andersch).

T. villosus Fabr. s. s. Sieb. teste Andersch.

T. dispar Fabr. n. h. Osterode an alten Buchen (Kug.), Dz. aus Birkenholz (Dommer), unter Äpfelrinde Wernsdorf (Kuwert).

T. cryptographus Ratz. s. unter Pappelrinde in der F. F. ♂ u. ♀ (Dossow, Czw., Stnr.).

T. Saxeseni Ratz. s. unter Pappelrinde, Kbg. (Pfeil, Dossow).

T. dryographus Ratz. s. Eichholz bei Mehlsack (Andersch).

T. monographus Fabr. n. s. an den Eichen bei Moosbude (Ltz.).

Xylotoma domesticus L. s. unter Tannenrinde (Andersch).

X. lineatus n. s. ebenso, Braunsbg. (Sieb.), Zinten, Samiten (Ltz.).

Platypus cylindrus Fabr. s. s. Kbg., in Eichenholz (Kug., Andersch).

Cerambycidae.

Ergates faber L. s. in Kiefernwäldern, Elbing, Rastenbg., Thorn (Sieb.), Neidenburg (Ltz.).

Tragosoma depsarium L. s. s. Elbing (Sieb.).

Ipsilon coriarius L. n. s. in Kiefernwäldern, Rauschen (Ltz.).

Cerambyx (Hammaticherus) heros Scop. s. s. Kug., Sieb.

C. cerdo Scop. s. Elbing (Ltz.).

Purpuricenus Köhleri L. s. s. 1 St. in der Sammlung des Museums, Thorn.

Rosalia alpina L. s. s. einmal bei der Allensteinschen Glashütte (Kug.), bisher nicht wieder gefunden.

Aromia mosechata L. n. s. an Weiden Kbg. (Ltz.).

Calidium clavipes Fabr. s. Dz. (Schmidt), Elbing (Ltz.), Braunsbg. (Sieb.).

C. senoratum L. s. Labiau (Nanke), Liep auf Sorbus aucup. (Ltz.), Dz. Grebbiner Wald (Dommer, Frantzius).

C. violaceum L. n. s. auf Spiräen, Arnau (Ltz.).

C. dilatum Pk. in dem Ziegeleigebäude bei Wernsdorf h. (Kuwert), sonst n. h. an Kiefernholz, Zinten (Ltz.).

C. sanguineum L. s. s. Tilsit (Nanke), Mehlsack (Sieb.).

C. alni L. einmal s. h. an einem alten Zaune, der von Ellernstrauch geflochten war (Kug.), bisher aber nicht wieder gefunden.

C. variabile L. mit seinen Varietäten n. s. wie *violaceum*.

C. undatum L. s. s. Kbg., Elbing (Andersch), Wehlau (Ltz.).

Hylotrypes bajulus L. g. an Getreidespeichern.

Tetropium (Cromorphus) luridum L. *aulicum* Fabr. fulcratum Fabr. h. unter Tannenrinde, Zinten (Ltz.), Braunsbg., Kbg. (Sieb.).

T. fuscum Fabr. n. h. bei Schaaken auf Weiden (Eld.), F. F. (Czw., Stnr.).

Notorkis muricata Schbh. s. s. einmal unter Kiefernrinde bei Osterode (Kug.), 1 St. auf

einer Espe neben dem Pfarrhause von Schwarzort, Juli 1864 (Ltz.); Neustadt (Fritzen) an alten Pinusstämmen, Juli — August.

Spondylia buprestoides L. h. in Kiefernwäldern, Kahlberg (Ltz.).

Aescum striatum L. n. h. Schwarzort (Ltz.); die var. *agreste* Fabr. bei Osterode (Kug.), Neustadt (Fritzen).

Criocephalus rusticus L. n. s. Braunsbg., Pr. Holland, Rastenbg. (Sieb.), Schwarzort (Ltz.).

C. ferus Kraatz. *epibata* Schiödt. s. Kbg. (Guthzeit), Dz. (Dommer), Neustadt (Fritzen) in Pinusstubbchen.

Clytus delritus L. n. h. an den Moosbuden Eichen (Ltz.).

C. arcuatus L. n. s. Löwenhagen (Ltz.).

C. rusticus L. hafniensis Fabr. zuw. h. Osterode im Pappelgehölz (Kug.), Heilsberg, Tilsit (Sieb.), Gelguhnen (Ltz.).

C. arietis L. n. h. Rauschen (Ltz.).

C. antilope Illig. s. s. wird von Kug. im Manuser angegeben, ohne Fundort, ist aber bis jetzt nicht wieder gefunden.

C. Herbstii Bröhm. *verbasci* Fabr. s. Elbing, Lyck (Sieb.), Blaustein (Ltz.).

C. verbasci L. *ornatus* Hbst. s. s. Dz. (Dommer).

C. massiliensis L. s. s. in Ostpr. von Stf. gefangen (Dommer).

C. plebejus Fabr. s. Osterode (Kug.), so dann nur an einer ganz beschränkten Stelle im Wiesengrunde bei Craam auf *Spiraea ulm.* und auf Doldengewächsen mehrfach gefunden (Ltz.).

C. mysticus L. *rusticus* Scop. *hieroglyphicus* Hbst. n. h. Morgen (Ltz.), Oliva (Czw.), F. F. (Stnr.).

Obrium ferrugineum Fabr. s. s. Kug. Sieb.

O. brunneum Fabr. s. s. Dz. am Seestrande (Dommer).

Gracilia pygmaea Fabr. s. s. unter den Dupl. der Elditschen Sammlung fand ich 2 St. bezeichnet: Kapkeim (Frisching) von Patze gefunden 1865 (Ltz.).

Molorchus minor L. *dimidiatus* Fabr. n. s. auf Gartenspiräen Morgen (Ltz.).

M. umbellatarum L. s. Elbing (Sieb.), Neuhausen (Stnr.).

Necydalis major L. *salicis* Muls. s. an Weiden, Ludwigsort (Ltz.), Kbg. (Guthzeit), Dz. (Brischke).

Lamia textor L. n. s. Rauschen, Cranz (Ltz.), Memel (Stnr.).

Monochamus sartor Fabr. s. Kbg. (Ltz.).

M. sutor L. n. h. Schwarzort (Ltz.).

M. galloprovincialis Oliv. [s. s. Danzig, Braunsbg. (Dommer).]

Acanthocerus varius Fabr. s. an Buchen, Osterode (Kug.), Cadinen (Stf.), Norkitten (Ltz.).

Astynomus aedilis L. h. am Kiefernkleisterholz, Mai Ludwigsort (Ltz.).

A. atomarius Fabr. s. s. Johannishurger Heide (Kug.), aber bisher nicht wieder gefunden.

A. griseus Fabr. n. h. Kbg., Braunsbg., Elbing (Stf., Ltz.).

Liopus nebulosus L. h. in Buchenwäldern (Kug.), auf Linden (Ltz.).

L. punctulatus Pk. s. s. F. F. an einem Pappelstamme 3 St. (Czw., Stnr.) Juni 1872; aus faulen Lindenästen gezogen, Neustadt (Fritzen).

L. fennicus Pk. s. Dz. (Frantzius, Dommer), Neustadt, Putzig (Stf.), Löwenhagen, Aranau, auf Linden (Ltz.).

Exocentrus balteatus Fabr. n. h. Arnau unter Linden (Ltz.), Dz. (Helm.).

Pogonochaetus hispidus Schrk. *pilosus* Fabr. s. Sandgruben bei Ludwigsort (Sauter, Ltz.), Elbing (Sieb.).

P. fasciatus Deg. n. s. Elbing, Pr. Holland (Sieb.), Löwenhagen (Ltz.).

P. ovalis Gmel. s. Kbg. (Ltz.).

Mesosa cerculinoides L. s. s. Thorn (Kug.), Elbing (Sieb.).

M. nebulosa Fabr. s. s. Osterode (Kug.), bei Schöneberg (Dommer).

Anaesthetis testacea Fabr. s. s. Osterode (Kug.), Dz. Nehrung an Weidengeflecht (Fritzen).

Agapanthia cardui Fabr. s. Kug. Sieb.

A. angusticollis Gyll. n. s. Grebbiner Wald auf *Urtica dioica* (Dommer), Kleinhalde (Eld.), Deimewiesen (Ltz.), Schromb., Kitzn. (Czw.).

Saperda carcharias L. n. s. an Pappelstammen, Kbg. (Ltz.).

S. phoca Fröl. s. s. Wehlau (Sauter); 1 St. auf *Spiraea ulm.* Warnicken (Ltz.).

S. scalaris L. n. h. an Eichenholz, Braunsberg (Sieb.), Zinten (Ltz.).

S. Seydlitz Fröl. s. Elbing, Braunsbg. (Sieb.), F. F. (Czw., Stnr.).

S. tremulae Fabr. s. Wehlau (Andersch).
S. populea L. n. s. an Espen, Kbg. (Ltz.).
Menesia bipunctata Zubk. s. s. Kbg. (Kug.).
Horst am Pregel (Kuwert).

Tetrops praeculta L. h. auf Sorbus, Liep (Ltz.).

Obera oculata L. n. h. an Espenstrauch
Schwarzort (Ltz.), auf Weiden Dz. (Czw.), Kbg. (Guthzeit).

O. pupillata Gyll. s. s. Heilsberg (Sieb.).
O. erythrocephala s. s. Litthauen (Kug.).
Masuren (Sieb.).

O. linearis L. s. s. Masuren (Mühl.), n. s.
Higbl. (Stnr.), Dz. auf Haseln (Czw.).

Phytocia affinis Harrer. s. Elbing (Sieb.).

P. virgula Chäp. punctum Muls. s. Heilsberg auf einem Brachacker (Ltz.), Oliva (Czw.).

P. lineola Fabr. s. ebenso; Dz. auf Viburnum-Blüthen (Dommer).

P. cylindrica L. s. Elbing (Ltz.).

P. nigricornis Fabr. s. Jäschkenthal (Czw.).

P. virescens Fabr. s. s. aus Litthauen (Kug.), neuerlich nicht wieder gefunden.

P. molybdaea Dalm. s. s. in der Eldittischen Sammlung I St. Kbg.

Rhamnium salicis Fabr. n. h. auf Garten-spiränen, Arnau, Blaustein (Ltz.).

Rhagium mordax Fabr. n. h. am Eichenholze, Lauth (Ltz.).

R. inquisitor Fabr. n. s. an Abiesstubben, Zinten (Ltz.).

R. indagator Fabr. h. ebenso.

R. bifasciatum Fabr. von Kug. angemerkt ohne Angabe des Fundorts, später nicht wieder gefunden; meistentheils ein Gebirgskäfer.

Toxotus cursor L. noetis L. n. s. im Warnicker Park auf Spiraea ulm. Juli (Ltz.), Dz. am Carlsberge (Schmidt), Vierbrkr. (Stnr.).

T. meridianus L. n. s. ebenso, Grebbiner Wald (Sieb.). Die schöne var. c. (Thoms. VIII. 54) in der Eldittischen Sammlung.

Pachya lamed L. spadicea Pk. s. s. Braunsberg (Sieb.), Warnicken (Ltz.).

P. 4-maculata L. n. s. auf Dolden und Spiränen, Georgenswalde (Ltz.).

P. interrogationis L. s. s. bei Kbg. 1788 in Kiefernwäldern auf Farnkraut (Polypodium, Pteris) gefunden (Kug.), später jedoch nicht wieder.

P. strigilata Fabr. s. s. (Sieb.).

P. marginata Fabr. aus Kugel. Beschreibung seiner Leptura spreta im Manuser. vermutet Kratzt Berl. Ent. Ztg. XII. 303, dass er eine Var. der marginata vor Augen gehabt und dieselbe als strigilata angeführt habe.

P. collaris L. h. auf Spiränen, Kbg. (Ltz.).

P. virginea L. n. h. ebenso, Vierbrkr. (Stnr.).

P. sexmaculata L. s. s. 1 St. Masuren auf einer Dolde (Mühl.).

P. octomaculata Fabr. n. s. Warnicken auf Cirsium oleraceum (Ltz.), Carthaus im Radaunethal (Helm.).

P. septemsignata Küst. s. s. 1 St. an Kiefernkleisterholz bei Ludwigsort (Pfeil).

Strangalia 4-fasciata h. auf Spiränen, Kbg. (Ltz.).

S. revestita L. s. Dz., Elbing (Sieb.).

S. pubescens Fabr. s. s. auf Wiesen an Scabiosa succisa und Carduus nutans gefunden, 2 St. Osterode (Kug.), seitdem nicht mehr.

S. atra Fabr. n. h. auf Dolden, Gelguhnen (Ltz.).

S. armata Hbst. calcarata Fabr. n. h. auf Spir. ulmar. Warnicken auf dem Wilhelmshorster Gestell, Gelguhnen (Ltz.).

S. annularis Fabr. s. s. Osterode, in Kiefernwäldern auf Orchis bifolia und Stachys sylvatica; Kbg. (Kug.), Masuren (Mühl.).

S. attenuata L. h. auf Garten-spiränen, Wernsdorf (Ltz.).

S. nigra L. h. Arnau (Ltz.).

S. bifasciata Müll. s. Kug., Sieb.

S. melanura L. h. Löwenhagen (Ltz.).

Leptura sanguinosa Gyll. s. s. Sieb.

L. virens L. s. s. Kug., Sieb.

L. rubra L. rubrotestacea Illig. h. auf Spiränen, Warnicken (Ltz.).

L. varicornis Dalm. s. s. Braunsbg. (Sieb.), Zinten (Ltz.).

L. scutellata Fabr. s. s. Allenstein (Kug., Sieb.).

L. tomentosa Fabr. s. s. Dz. u. Osterode einigemal im Garten auf Schirmblumen (Kug., Sieb.).

L. cincta Fabr. s. Ggbg. (Kr.), Lyck (Sanio).

L. sanguinolenta L. n. h. Schwarzort (Ltz.).

L. maculicornis Deg. g

L. livida Fabr. ebenso.

L. sexguttata Fabr. s. Corjeiten (Ltz.).

L. rufipes Schell. s. Masuren (Mühl.).

Grammopora 4-guttata Fabr. s. nur die schwarze Var. *femorata* Fabr. Neuhausen (Ltz.).

Pr. Stargard (Schmidt).

G. laevis Fabr. h. bes. auf *Phyteuma spicatum*, Fehstein (Ltz.).

G. analis Pz. s. am Waldrande beim Gartnerberge geschöpft, Neustadt (Fritzen).

G. ruficornis Fabr. s. auf *Spir. ulm.* im Prangenauer Thal (Dommer), Zoppot (Ltz.).

G. ustulata Schall. *praeusta* Fabr. s. aus Eichenzweigen erzogen, April, Neustadt (Fritzen).

Chrysomelidae.

Oreodacna cerasi Fabr. nebst Var. n. s. bes. auf *Lonicera xylosteum*, Kellermühle (Ltz.), Braunsbg. (Sieb.).

Donacia crassipes Fabr. h. auf Nuphar-Blättern sitzend, Rauschener Teich, Dammhof (Ltz.).

D. cincta Germ. n. s. auf den Blättern von Wasserpflanzen Kbg. (Ltz.).

D. dentata Hoppe n. s. ebenso.

D. sparganii Ahr. s. Dz. (Czw.).

D. dentipes Fabr. n. s. Kbg. (Ltz.), Lyck (Sanio).

D. lemnae Fabr. n. s. Dammhof (Ltz.).

D. sagittariae Fabr. h. ebenso.

D. obscura Gyll. n. s. ebenso, an Schilf auf der Dz. Nehrung (Dommer), Lyck (Sanio).

D. thalassina Germ. s. Pregelufer bei Holstein (Czw.).

D. impressa Pk. *brevicornis* Ahr. h. Neuhäuser, Dammhof (Ltz.); die var. *platysterna* Thoms. (Czw. Dt. Ent. Zt. XXII. 204) n. h. da-selbst, Memel (Stnr.).

D. antiqua Kunze. *simplicifrons* Lac. *brevicornis* Gyll. s. Pr. Friedland (Föllmor teste Czw.).

D. sericea L. *violacea* Gyll. n. h. auf Schilf, Rosenau (Ltz.).

D. nigra Fabr. s. Cranz (Ltz.), Pregelmündung (Stnr.).

D. discolor Hoppe n. s. auf der Moorwiese bei Dammhof (Ltz.), Lyck (Sanio), Osterode auf Potamogeton natans (Kug.).

D. affinis Kunze n. s. Kbg. auf den Pregel-

wiesen, ebenso die var. *rustica* Kunze (Czw. Dt. Ent. Zt. XXII. 205), vielleicht eigene Art, Neuhausen (Stnr.), Neustadt (Fritzen) auf *Caltha palustris*.

D. semicuprea Pz. *simplex* Fabr. h. auf Schilf überall.

D. Menyanthidis Gyll. n. s. auf der Nährpflanze, Dammhof in den Blattwinkeln von *Phragmites*, Juditten (Ltz.), bei Lyck h. (Sanio).

D. linearis Hoppe n. h. auf *Carex*-Arten, Kbg. (Ltz.), Dammhof (Czw.).

D. typhae Brahm n. s. *Putzig* (Stf.), Lyck (Sanio), F. F. (Czw., Stnr.).

D. fennica Pk. s. Dammhof; die var. *Malinovskii* Ahr. häufiger, beide unter Wasser auf *Sparganium natans* (Czw.), Grebbiner Wald (Dommer).

D. hydrocharidis Fabr. n. s. Leesen, auf Schilf (Dommer) auf *Typha latif.*, Lyck (Sanio), Dammhof (Ltz.).

D. tomentosa Ahr. s. auf *Butomus umbellatus*, im Bach von Rosenau (Ltz.).

Haemona zosterae Fabr. *Sahlbergii* Lac. Curtisii Thoms. n. s. zuerst bei Putzig (Bogeng), dann Rauschener Teich an *Myriophyllum* (Ltz.), Dz. in einem salzhaltigen Teiche an der Küste auf *Potamogeton marinus* in Menge (Helm.).

H. equiseti Fabr. s. s. aus dem Dammteich (Czw.).

Zenogophora subspinosa Fabr. h. auf Pappeln (Ltz.).

Z. frontalis Sustr. s. einmal im Kbg. botan. Garten (Eld.), Neustadt (Fritzen).

Z. flavicollis Marsh. h. wie *subspinosa*.

Z. Turneri Power. *rufostestacea* Kraatz. s. Dz. Westerplatte (Helm.), Ggbg. (Kr.), Higbl., Preil (Stnr.).

Lemna rugicollis Sustr. n. h. Kbg. (Ltz.).

L. cyanella Fabr. h. überall auf Wiesen.

L. Erichsonii Sustr. s. s. Lyck (Sanio), Dammhof (Stnr.).

L. flavipes Sustr. s. s. 1 St. im Königsthal bei Dz. gefangen (Helm.).

L. melanopa L. h. wie *cyanella*.

L. cyanipennis Dst. s. Neustadt (Fritzen). *Crioceris mordigera* L. n. s. an *Lilium candidum* (Ltz.).

C. brunnea Fabr. n. h. Liep (Ltz.).

C. 14-punctata Scop. s. Dr., Allenstein (Kug.), auf Spargel, Graudenz (Schmidt).

- C. 12-punctata L. var. dodecastigma**
Suff. s. s. Osterode (Kug.), Pelplin (Fritzen).
C. asparagi L. h. auf Spargelkraut (Ltz.).
Clytra tridentata L. s. auf Weiden und
Birken, Dz. (Sieb.), Rauschen (Ltz.).
C. longimana L. h. bei Loppehnen auf
Trifolium (Eld., Ltz.).
C. longipes Fabr. s. s. auf Birken, Oste-
rode (Kug.), ist bisher nicht wieder gefunden.
C. 4-punctata L. n. s. auf Weidengestrüch
Kbg. (Ltz.); die 4-signata Märk. seltener,
Wilkie unter Ameisen (Eld.).
C. laeviuscula Ratz. s. Sieb.
C. aurita L. s. auf Salix caprea, auf Birken,
Osterode (Kug.), Dz. (Czw.).
C. affinis Hellw. s. Kbg., Elbing, Dz., Putzig
(Stf.).
C. flavigollis Charp. s. Neuhausen (Stnr.).
C. cyanea Fabr. n. h. Fuchshöfen, Blau-
stein, Gelguhnen (Ltz.), Lyck (Sanio), Keller-
mühle (Stnr.).
C. bucephala Schall. s. s. auf Betula nana,
Osterode (Kug., Hellw.), bisher aber nicht wie-
der gefunden.
C. 4-maculata L. h. auf Peucedanum, Neu-
hüuser, Littausdorf (Ltz.), Lyck (Sanio).
C. scopolina Fabr. s. Dz. (Dommer).
Anm. C. taxicornis Fabr. wird zwar von
Dommer angegeben, doch von den 3 St. seiner
Sammlung sind 2 nichtpr., das dritte ist tri-
dentata (Czw.).
Cryptophylax laetus Fabr. s. Elbing (Sieb.),
 Hlgbl. (Seydler), Lyck (Sanio).
C. coryli L. n. h. Marge (Ltz.).
C. cordiger L. s. Sieb.
C. variegatus Fabr. s. Putzig (Stf.).
C. variabilis Schneid. n. s. auf Birken,
Rauschen (Ltz.).
C. sexpunctatus L. s. ebenso.
C. violaceus Leich. n. s. auf allerlei Syn-
genesisten, ebenso.
C. aureolus Suffr. h. ebenso, Warnicken
(Ltz.).
C. sericeus L. 1 St. Warnicken (Ltz.), wahr-
scheinlich mit dem vorigen zusammengehörig,
was mir die sehr zahlreichen Stücke der Su-
friansen Sammlung in Halle zu beweisen
scheinen; namentlich ist der Unterschied der
Biegung der Hals-schildseitenränder hinfällig.
- C. hypochoeridis L. h. auf Achyrophorus**
maculatus, Warnicken (Ltz.), Lyck (Sanio).
C. nitens L. n. h. Rauschen (Ltz.), Dz.
(Dommer).
C. nitidulus Gyll. s. Heilsberg (Sieb.), Lyck
(Sanio), Hlgbl. (Stnr.).
C. 4-pustulatus Gyll. s. Lyck (Sanio).
F. Moraei L. h. auf Hypericum perfor.
Rauschen (Ltz.).
C. flavipes Fabr. n. s. auf Corylus ebenso,
Dz. (Dommer).
C. 10-punctatus L. mit var. *bothnicus*
L. s. Horst bei Echstein (Stnr.), aber h. im
Süden der Prov., namentlich bei Lyck auf Wei-
den (Sanio).
C. frenatus Leich. mit *flavescens* Schneid.
h. ebenso, und bei Dz. (Sieb.), bei Kbg. nicht
bemerk.
C. punctiger Pk. s. Warnicken (Ltz.), Lop-
pehnen (Eld.).
C. janthinus Germ. s. auf Weiden, Ortels-
burg (Mühl.).
C. fulcratus Germ. s. Warnicken (Ltz.), Lyck
(Sanio), Neustadt (Fritzen) auf Viburnum opulus.
C. flavidabris Fabr. h. Rauschen (Ltz.).
C. marginatus Fabr. s. s. von Kugel. an-
gegeben ohne Fundort; bisher nicht wieder ge-
fund.
C. pallifrons Gyll. n. h. Ggbg. (Kr.), Lyck
(Sanio).
C. bipunctatus L. bipustulatus Fabr.
lineola Fahr. n. h. auf sonnigen Hügeln auf
 niedrigen Haseln (Kug.), Rauschen, Echstein
 (Ltz.).
C. bistripunctatus Germ. Tilsit (Stf.),
 Hlgbl. (Seydler).
C. vittatus Fabr. n. h. Warnicken, Gel-
guhnen (Ltz.).
C. bilineatus L. s. Kug., Sieb.
C. vittula Suffr. h. bei Dz. auf Thymus
serp. (Stf.).
C. minutus Fahr. g. überall, ebenso.
C. pusillus Fabr. s. auf Ellern u. Haseln
(Kug.); Loppehnen, Lauth (Eld.), Putzig (Stf.),
Preil (Ltz.).
C. gracilis Fabr. n. h. auf Melampyrum
pratense, Galterben (Eld.), Georgenswalde am
Waldbüschen (Ltz.), Neuhausen, Dammhof
 (Stnr.).

C. Hybneri Fabr. n. s. Conitz (Sieb.), Rauschen (Ltz.), Metgethen (Stnr.).

C. labiatus L. h. mit var. *digrammus* Sustr. Rauschen (Ltz.), Lyck (Sanio), Neustadt (Fritzen).

C. Wasastjernaæ Gyll. s. auf nassen Wiesen, Lyck (Sanio), F. F. (Czw.).

C. geminus Gyll. n. s. Lyck (Sanio).

C. querceti Sustr. s. Dz. (Czw.).

C. frontalis Marsh. s. Corjeiten (Ltz.).

C. plini L. abietis Sustr. n. h. Rauschen (Ltz.).

Pachybrachis hieroglyphicus Leach. *histrio* Fabr. h. bei Loppehnen auf Trifolium (Eld., Ltz.).

Pachnephorus tessellatus Dft. s. s. Lyck (Sanio), Memel (Stnr.).

P. arenarius Fabr. bei Osterode in sandigen Gegenden g. (Kug.), auch sonst n. s. Rauschen (Ltz.).

Eumolpus obscurus L. n. s. auf Epilobium angustif. Löwenhagen (Ltz.).

E. vitis Fabr. s. im Frühjahr auf Buchenstrauch, Neustadt (Fritzen).

Timarcha coriaria Laich. s. s. Arnstein bei Zinten (Schiefferdecker).

Chrysomela staphylea L. n. s. auf Grasplätzen Kbg. (Ltz.).

C. varians Scholl. h. auf Hypericum (Ltz.).

C. gottingensis L. n. s. wie staphylea.

C. haemoptera L. n. h. Rauschen (Ltz.).

C. gypsophilae Küst. s. s. Dz. (Stf.).

C. sanguinolenta L. n. s. Rauschen, Kahlberg (Ltz.).

C. marginalis Dft. n. h. Putzig (Stf.), unter Steinen auf Sandboden (Ltz.), Neuhäuser (Stnr.).

C. limbata Fabr. n. s. in Sandgräben, Rauschen (Stnr.).

C. carnifex Fabr. n. s. Dz. (Ltz.).

C. marginata L. h. in den Strandgegenden unter Steinen (Eld., Ltz.); auf Anchusa offic. und Achillea millef. Lyck (Sanio)

C. analis L. Schach Fabr. n. s. Rauschen (Ltz.), Dz. (Helm).

C. lurida L. s. Dz. (Ltz.).

C. menthastrali Sustr. n. s. Westpr. auf *Mentha silvestris*, Juli (Strübing).

C. graminis L. h. auf Tanacetum, Warnicken (Ltz.).

C. fastuosa L. g. auf Lamium album.

C. cerealis L. h. auf Thymus serp. Lyck (Sanio), Neustadt (Fritzen), die var. *alternans* Pz. Megerle Fabr. h. Pillau (Ltz.); var. *violacea* Schall. mixta Sustr. h. Neustadt (Fritzen).

C. polita L. n. s. Warnicken (Ltz.), Lyck (Sanio).

C. lamina Fabr. n. h. ebenso; zuerst Oct. 1795 von Kug. auf Nesseln gefunden.

C. fucata Fabr. zuw. h. auf Hypericum perf. Lyck (Sanio), Putzig (Stf.), Ggbg. (Kr.), Dz., Westerplatte (Helm).

C. geminata Pk. s. Sieb.

Lina aenea L. g. auf Eltern.

L. collaris L. n. s. auf *Salix rosmarinifolia* Heub. (Sieb.), Lyck (Sanio), Putzig (Bogeng.), Schwarzort (Ltz.); die var.? *alpina* Zett. seltener, auf dem Sarker Bruche (Sanio), Glettkauf (Czw.).

L. 20-punctata Scop. n. h. Elbing, Pr. Holland (Sieb.), Hlgl., einmal 1868 auf Weidenblättern sehr zahlreich (Stnr.), Masuren (Mühl.).

L. cuprea Fabr. n. h. Dammhof (Eld., Ltz.).

L. lapponica L. s. Margen (Ltz.), Braunsberg (Sieb.), die var. *bulgharensis* Fabr. Dz. auf *Ailus glutinosus* Neufahrwasser (Helm), Hlgl. (Stnr.); zw. Zoppot a. Oyhöft auf Weiden, die Hauptform bes. in trocknen heißen Sommern (Fritzen).

L. populi L. h. auf Espen Kbg. (Ltz.).

L. tremulae F. h. auf *Salix purpurea*, Lyck (Sanio).

L. longicollis Sustr. s. Wernsdorf (Kuwert), Lyck (Sanio), Putzig (Stf.).

Gonioctena rufipes Deg. s. Dz. (Dommer), Putzig (Bogeng.), Oliva (Czw.).

G. viminalis L. g. auf Weidenstrauch; die var. *haemorrhoidalis* Fabr. n. s. Kbg. (Ltz.).

G. triandrae Sustr. affinis Schh. n. h. Putzig (Stf.).

G. sexpunctata Pz. von Kug. angegeben ohne Fundort, auch bisher nicht wieder gefunden.

G. litura Fabr. n. s. auf *Sarrothamus*, Zoppot (Ltz.).

G. 5-punctata Fabr. n. h. Putzig (Stf.).

G. pallida L. n. h. Wehlau (Ltz.).

Gastrophysa polygoni L. g. überall.

G. raphani Fabr. n. s. Kbg. am Pregel-damm auf Cruciferen (Ltz.).

Clapalus sophiae Schall. n. h. ebenso.

- Plagiodera armoracinae* L. n. s. ebenso.
Phasdon pyritosus Ross. *graminicola* Dft.
s. unter Weidenblättern, Kbg. (Sauter).
P. betulae L. *Suffr. cochleariae* Gyll.
n. s. Lyck (Sanio).
P. concinnus Steph. s. auf Triglochin maritima, Putzig (Stf.).
P. cochleariae Fabr. s. Osterode (Kug., von Fabr. selbst unerkannt), Neustadt (Fritzen).
Phradora vitellinae L. g. überall auf Weiden.
P. vulgarissima L. n. s. Dz., Putzig (Stf.), Kbg. (Ltz.); auf *Salix viminalis*, Lyck (Sanio); bisher *tibialis* Suffr. Loppehnen, Lauth, Dz., Putzig, Kbg., Lyck (Stf., Eld., Ltz.); nach Sanio nur auf *Salix purpurea*; den Uebergang bildet die von Sanio i. l. *nigripes* genannte Form (Lyck).
P. atrovirens Corn. s. Dammhof von jungen Epsen geklopft (Czw.).
Prasocuris (Helodes) aucta Fabr. *egea* Gyll. n. s. in Gräben auf Ranunculus, Kbg. (Ltz.); Stücke mit rothgelbem Rande der Fld. habe ich hier noch nicht gefunden.
P. marginella L. h. auf *Caltha pal.* Kbg. (Ltz.).
P. hannoverana Fabr. n. s. ebenso, auch auf *Cardamine prat.* (Kug., Ltz.).
P. phellandrii L. h. auf der Nährpflanze, Dammhof (Ltz.).
P. beccabungae Illig. n. s. wie *aucta*.
Adimonia tanaceti L. h. auf der Nährpflanze (Ltz.).
A. rusticæ Schall. h. ebenso.
A. fontinalis Boh. n. h. Dz. (Czw., Helm).
A. Dahlii Joann. s. Neustadt (Fritzen).
A. Oelandica Boh. unter den Duplis der Eld. Sammlung fand ich unter *tanaceti* einige St. (Ltz.).
A. interrupta Oliv. s. Loppehnen (Eld.).
A. haematidea Germ. s. s. im Pampauer Thal auf Erlengebüsch (Dommer), Wernsdorf (Kuwert).
A. sanguinea Fabr. s. auf Weidengebüsch, Dz. (Ltz.).
A. cupreae L. g. auf Weiden.
Galeruca viburni Pk. h. auf Vib. *opusum*, Zinten (Ltz.).
G. crataegi Forst. n. h. aus einer pr. Forst (Dossow), im Danziger Lazarethgarten (Helm).
G. nymphaea L. *sagittariae* Gyll. g. auf Nupharblättern, Rauschener Teich (Ltz.).
G. lineola Fabr. h. Kbg. (Ltz.).
G. calmariensis L. h. ebenso.
G. tenella L. h. ebenso.
Agastica alni L. g. auf Ellern.
A. halensis L. n. s. Arnauer Kirchhof (Ltz.), Bohnsack, Jäschkenthal (Helm).
Phyllobrotica 4-maculata L. h. am Sasper See (Dommer). im Ellernbruch bei Cramz (Ltz.), Baranner Forst Lyck (Sanio).
Luperus (Oulomorus) pinicola Dft. n. h. Tapiau, im Frischingswalde auf Kiefern (Patze), Dz. (Czw., Helm), bei Neustadt s. h. (Fritzen).
L. rufipes Fabr. n. h. Heilsberg, im Simsenthal (Ltz.).
L. flavipes L. n. h. ebenso, Memel (Nanke), Neustadt (Fritzen).
Haltica erucæ Oliv. n. s. auf Weiden und Birken, Trenker Waldhaus, Rastenbg. (Ltz.).
H. olereæ L. g. auf Kohlblättern.
H. lythri Aubé n. h. wie *erucæ*.
H. mercurialis Fabr. auf der Nährpflanze Warnicker Park s. h. Juni (Ltz.).
H. (Crepidodera) impressa Fabr. h. auf feuchten Wiesen Kbg. (Ltz.).
H. ferruginea Scop. g. überall.
H. rufipes L. n. h. ebenso, Lyck (Sanio).
H. nitidula L. s. Ggbg. (Kr.).
H. aurata Marsh. *versicolor* Kutsch. h. auf Weiden, Kbg. (Ltz., Czw.).
H. chloris Foudr. n. h. Nogatuser bei Ktzn. (Czw.).
H. helxines L. s. h. auf Weiden.
H. femorata Gyll. wird von Zebe als pr. angeführt; ich habe sie noch nicht gefunden.
H. nigritula Gyll. n. s. Kbg. (Ltz.).
H. Modeeri h. Conitz (Sieb.), Kbg. (Ltz.).
H. salicariae Pk. n. s. Kbg. (Ltz.).
H. pubescens Koch. n. s. auf sehr versch. Pflanzen, ebenso.
H. rubi Pk. h. ebenso.
H. (Balanomorpha) rusticæ L. h. Dz. (Dommer), auf Rumex, Neuhäuser (Ltz.).
H. chrysanthemi Koch. h. ebenso.
H. obtusata Gyll. n. h. Dz. (Dommer).
H. (Podagraria) fuscipes Fabr. s. auf Schiff, Dz. (Dommer).
H. malvac Illig. s. s. Dz. (Zebe).
H. fuscicornis L. s. Kug. Sieb.

- H. (Phyllotreta) armoraciae** Koch. h. auf Meerrettig, Rosenau, Wernsdorf (Ltz.).
- H. tetrastigma** Com. einmal h. auf Cardamine amara, Schromb. (Czw.).
- H. flexuosa** Illig. h. Kbg. (Ltz.).
- H. brassicae** Fabr. h. ebenso.
- H. excisa** Redt. h. ebenso; auf Flusswiesen, Lyck (Sanio).
- H. sinuata** Steph. h. ebenso.
- H. undulata** Kutsch. n. h. ebenso.
- H. nemorum** L. g. überall.
- H. vittula** Redt. n. s. Kbg. (Ltz.), Neustadt (Fritzen).
- H. atra** Pk. *obscurella* Illig. s. h. überall auf Cruciferen.
- H. lepidii** Koch. s. h. ebenso.
- H. antennata** Koch. s. s. Lyck (Sanio).
- H. (Aphthona) cyparissiae** Koch. s. Kbg. (Ltz.), Lyck (Sanio).
- H. lutescens** Gyll. s. Lyck (Sanio), Kbg. (Stnr.), Neustadt (Fritzen).
- H. coerulea** Pk. h. auf Iris pseud. Cranz (Ltz.).
- H. hilaris** Steph. n. s. Kbg. (Czw.), Dz. (Helm, Fritzen).
- H. euphorbiae** All. g. auf Nadelholz.
- H. cyanella** Redt. n. h. Ggbg. (Kr.).
- H. violacea** Koch. s. Blaustein (Ltz.), Ktzn. (Czw.).
- Longitarsus echii* Koch. n. h. Sieb.
- L. Linnaei** Dft. s. Neustadt (Fritzen).
- L. anchusae** Pk. n. s. Rauschen (Ltz.).
- L. niger** Koch. s. wie Linnaei.
- L. ater** Fabr. *parvulus* Pk. g. auf Nadelholz.
- L. holsaticus** L. n. h. Kbg. (Ltz.).
- L. 4-pustulatus** Fabr. s. im Moose b. Kbg. (Ltz.).
- L. castaneus** Dft. s. F. F. (Czw.), Dz. (Helm).
- L. luridus** Scop. h. Wernsdorf (Ltz.).
- L. brunneus** Dft. h. wie castaneus.
- L. minusculus** Fodr. s. Neustadt (Fritzen).
- L. nasturtii** Fabr. n. h. Rosenau (Ltz.).
- L. thoracicus** Steph. All. s. Kbg. Plantage (Czw.), Neustadt (Fritzen).
- L. tabidus** Fabr. *verbasci* Pz. h. bes. auf *Senecio Jacobaea* (Ltz.).
- L. atricillus** L. s. h. bes. auf *Lepidium ruderale* (Ltz.).
- L. atricapillus** Dft. n. h. Lyck (Sanio) Kbg. (Sauter).
- L. melanocephalus** Deg. *atriceps* Kutsch.
- s. Dz.** (Dommer). F. F. (Czw.).
- L. lycopi** Fodr. s. wie thoracicus
- L. pusillus** Gyll. s. bei Nicolayken (Sanio).
- L. femoralis** Marsh. s. wie melanoceph.
- L. pratensis** Pz. n. h. Kbg. (Ltz.), Lyck (Sanio).
- L. ochroleucus** Marsh. einmal 1875 in Menge gefangen, sonst nicht, Lyck (Sanio), Neustadt (Fritzen).
- L. laevis** Dft. h. Kbg. Pregelwiesen (Czw., Stnr.).
- Plectroscelis semicoerulea** Koch. s. Ktzn. auf Weiden an der Nogat (Czw.), Memel (Stnr.).
- P. concinna** Marsh. dentipes Koch. g. überall.
- P. aridella** Pk. h. Kbg. (Ltz.), Lyck (Sanio).
- P. aerosa** Letzn. s. am Ufer d. Dammteichs Juni (Czw.).
- P. Sahlbergii** Gyll. s. ebenso.
- P. Mannerheimii** Gyll. s. s. Belschwitz (Kr.).
- P. aridula** Gyll. s. Putzig (Stf.), Lyck (Sanio).
- Pyllodes dulcamarae* Koch. h. Kbg. (Ltz.).
- P. chaleomerus** Illig. s. Kbg. (Czw., Ltz.), Neustadt (Fritzen).
- P. hyoscyami** L. n. s. Dz. (Ltz.).
- P. chrysoccephalus** L. h. Kbg. (Ltz.), Putzig (Stf.); die var. f. Thoms. einmal Kbg. (Ltz.).
- P. rapae** Illig. h. auf Raphanus, Dz. (Dommer).
- P. cupreus** Koch. n. h. auf *Sisymbrium officinale*, Kbg. Plantage (Czw.).
- P. marcidus** Illig. s. Pillau, auf *Elymus arenarius* (Eld.), Dz. (Helm).
- P. affinis** Pk. n. s. Kbg., Dz. (Czw.).
- P. attenuatus** Koch. n. s. bei Lyck (Sanio).
- P. piecus** Redt. s. Kbg. auf dem nassen Garten (Czw.), F. F. (Stnr.).
- P. luteolus** Müll. s. Neustadt (Fritzen).
- P. cucullatus** Illig. s. h. überall.
- Dibolia occultans** Koch. n. h. Kbg. (Ltz.), Neustadt (Fritzen).
- D. Foersteri** Bach. Neustadt (Fritzen).
- D. depressiuscula** Ltz. s. s. Lyck (Sanio).
- D. cryptocephala** Koch. s. Kbg. (Sauter, Ltz.), Dz. (Helm).

D. eynoglossi Koch. s. Ggbg. (Kr.).

D. rugulosa Redt. s. Kbg. (Czw.), Dz. (Helm.).

Mniophila muscorum Koch. n. h. aus Moos von Märgen (Sauter, Ltz.), F. F. (Czw., Stnr.), Vierbrkr. (Stnr.).

Sphaeroderma cardui Gyll. zuw. h. Loppehnen (Eld.), Lyck (Sanio).

Argopus hemisphaericus Dft. n. s. auf *Trollius europ.* Ramukwald b. Allenstein (Müller), auf *Pulsatilla patens* Lyck (Sanio).

Hippe atra L. s. s. Warnicken (Ltz.), lebt auf *Rubus caesius*.

Casnia murraea L. s. Kbg. (Ltz.), Lyck (Sanio).

C. sanguinosa Suffr. n. s. Putzig (Stf.), Kbg. (Ltz.), Lyck (Sanio).

C. rubiginosa Illig. n. s. Kbg. (Ltz.), Lyck (Sanio).

C. thoracica Fourc. s. s. einmal Osterode (Kug.), Elbing (Sieb.), Lyck (Sanio).

C. vibex Fabr. n. h. Kbg. (Ltz.), Lyck (Sanio).

C. seladonia Gyll. s. s. Kbg. (Czw.), Dz. 1 St. als *prasina* bestimmt in der Dommerschen Sammlung.

C. chloris Suffr. *languida* Cornel. s. im Luckneiner Forst bei Nicotayken wahrsch. auf *Cirsium arvense* (Sanio).

C. stigmatica Suffr. h. wie *vibex*, Quednau, Dammhof, Rauschen (Stnr.).

C. denticollis Suffr. s. Dz. (Czw.), Cranzer Plantage (Ltz.).

C. sanguinolenta Müll. n. s. Kbg. (Ltz.).

C. oblonga Illig. s. Sanio (Lyck).

C. nobilis L. *viridula* Pk. n. s. Kbg. (Ltz.).

C. margaritacea Schall. s. s. Dz., Putzig (Stf.).

C. subreticulata Suffr. s. Ggbg. (Kr.), Neustadt (Fritzen).

C. nebulosa L. g. auf Kleefeldern.

C. ferruginea Fabr. n. h. wie *vibex*.

C. obsoleta Illig. s. h. Kbg. (Ltz.).

C. atrata Fabr. s. s. auf der Karbojin bei Lyck (Sanio).

C. equestris Fabr. h. Kbg. (Ltz.).

C. hemisphaerica Hbst. s. Zinten (Ltz.), Lyck (Sanio).

Kretylidae.

Engis bipustulata Fabr. s. in Schwämmen, Grebbiner Wald (Dommer), Kbg. (Andersch).

E. rufifrons Fabr. s. Dz. ebenso (Stf.).

E. humeralis Fabr. g. in Weidenschwämmen.

E. sanguinicollis Fabr. s. wie *bipust.*

Triplax russica L. n. h. Hirschau (Eld., Ltz., Stnr.), Ottominer Wald (Dommer), Pr. Eylau (Andersch).

T. aenea Schall. n. s. Echstein, Zinten (Ltz.), Higbl. (Stnr.).

T. rufipes Fabr. n. h. ebenso, Neustadt (Fritzen), im Buchenschwamm, Osterode (Kug.).

Tritoma bipustulata Fabr. n. h. in Buchenschwämmen Osterode (Kug.), Warnicken (Ltz.).

Endomychidae.

Lycoperdina succincta L. s. in Baumschwämmen, Putzig (Stf.), Weichselmünde (Helm.), Rauschen (Ltz.).

I. bovistae Fabr. s. Stangenwalder Forst (Dommer), Rauschen (Ltz.).

Mycetina cruciata Schall. s. Osterode, im *Polyporus suaveolens* (Kug.); im Schwamm einer morschen Birke Masuren (Mühl.), Neustadt (Fritzen).

Endomychus coccineus L. n. h. Warnicken (Ltz.), Kbg. in Holzgärten (Czw., Stnr.).

Mycetaca hirta Marsh. g. in Kellern auf *Merulius lacrimans* u. Schimmel (Czw.), Moosbude in morschem Eichenholz (Ltz.).

Alexia pilifera Müll. s. s. im Moose von Heub. (Stf.).

Coccinellidae.

Hippodamia 13-punctata L. g. in den Strandgegenden.

H. 7-maculata Deg. s. s. Kug. Sieb. *H. 11-notata* Schnd. s. Neustadt (Fritzen) auf Disteln am Zarnowitzter See.

Arisotacta 19-punctata L. n. s. Kbg. (Ltz.).

Adalia oblitterata L. *M-nigrum* Fabr. h. auf Nadelholz, Bludauer Forst (Ltz.).

A. bothnica Pk. h. ebenso.

A. bipunctata L. mit vielen Var. g. überall.
Coccinella marginipunctata Schall. s. am Luckneiner See (Sanio), Metgethen (Ltz.), Weichselmünde (Helm).

C. impustulata L. n. s. Kbg. (Ltz.), Lyck (Sanio).

C. 14-pustulata L. n. s. ebenso.

C. variabilis Fabr. mit vielen Var. h.

C. undecimpunctata L. s. Kbg. (Ltz.).

C. hieroglyphica L. n. h. ebenso.

C. 5-punctata L. g. überall.

C. 7-punctata L. g. ebenso.

C. distincta Falz. *labilis* Muls. s. s. Neuhäuser (Hensche), Calvarienberg bei Neustadt (Fritzen).

Halyzia oblongoguttata L. h. auf Nadelholz (Ltz.).

H. ocellata n. h. ebenso.

H. tigrina L. s. ebenso, Margen, Wernsdorf (Ltz.), Weichselmünde (Helm).

H. 18-guttata L. h. ebenso.

H. 10-guttata L. s. Masuren (Mühl.), Gbg. (Kr.).

H. bis 7-guttata Schall. s. s. Kug., Sieb.

H. 16-guttata L. n. s. Ludwigsort (Ltz.).

H. 12-guttata Poda. n. s. ebenso.

H. 22-punctata L. s. im Holsteiner Park (Ltz.).

H. 14-guttata L. n. s. Kbg. (Ltz.).

H. conglobata L. 14-punctata L. g. überall.

Micraspis 12-punctata L. h. an Baumwurzeln, Morgen (Ltz.), Dz. (Dommer, Frantzius).

Chilocorus renipustulatus Scrib. h. auf Nadelholz (Ltz.).

C. bipustulatus L. h. ebenso.

Ecochomus 4-pustulatus L. h. ebenso.

E. auritus Scrib. s. Oliva (Czw.).

Hyperaspis campestris Hbst. s. Vierbrkr. (Ltz.).

H. reppensis Hbst. s. Cranz (Ltz.).

Epilachna globosa Schneld. g. überall.

E. 11-maculata Fabr. s. s. Osterode, nur einmal (Kug.), nachher nicht wieder.

E. impunctata L. h. Kbg. (Ltz.).

Novius cruentatus Muls. s. s. einmal unter Kiefernrinde bei Dr. (Stf.).

Platynaspis villosa Fourer. s. Lyck (Sanio), Kbg. (Ltz.).

Scymnus 4-lunulatus Illig. s. Kug., Sieb.

S. Redtenbacheri Muls. s. s. Lyck (Sanio), Gbg. (Kr.).

S. bipunctatus Kug. *biverrucatus* Px. s. Kug., Sieb.

S. nigrinus Kug. n. s. auf Peppeln u. Nadelholz, Lyck (Sanio).

S. pygmaeus Fourer. *parvulus* Fabr. s. nur einmal auf Rosen, Osterode (Kug.), Sieb.

S. marginalis Rossi. s. Dz. (Dommer), Lyck (Sanio).

S. frontalis Fabr. *affinis* Redt. *bisbisignatus* Redt. n. s. Kbg. (Ltz.).

S. abietis Pk. h. ebenso, Dammhof (Stnr.).

S. discoideus Illig. h. auf Nadelholz (Ltz.).

S. analis Fabr. s. Kug., Sieb.

S. haemorrhoidalis Hbst. n. h. Kbg. (Ltz.), Neustadt (Fritzen).

S. capitatus Fabr. n. s. ebenso.

S. ater Kug. h. wie *discoideus*.

S. minimus Rossi. s. Sieb.

Rhizobius litura Fabr. n. s. an Weiden und Eichen (Kug.), Lyck (Sanio).

Coccidula scutellata Hbst. n. h. Kbg. (Ltz.).

C. rufa Hbst. h. an den Wurzeln von Weiden an Gräben (Kug.), Kbg. (Ltz.), Glettkau zwischen Elymus arenarius (Czw.).

Corylophidae.

Sacium (*Clypeaster*) *pusillum* Gyll. s. s. unter Baumrinde, Putzig (Stf.).

Sericoderus lateralis Gyll. s. s. ebenso, Kbg. (Stnr.).

Corylophus cassidoides Marsh. s. Ktzn. (Czw.), Kbg. (Eld., Ltz.).

Orthoperus punctatus Wank. s. s. Kbg. (Czw.).

O. Klucki Wank. s. Ktzn. unter Heu am Rande eines Baches (Czw.) Artrechte? Seidl. Fn. Balt. 197; Berl. Ent. Z. XV. 140.

O. brunnipes Gyll. *piceus* Steph. g. in faulenden Pflanzenstoffen.

O. punctulum Marsh. *atomarius* Heer. s. s. Rastenbg. (Czw.).

Während des Druckes dieser Arbeit gingen mir von Hrn. Calculator Fritzen in Neustadt (Westpr.) sehr schätzenswerthe Notizen und Beiträge zu, die ich nur zum Theil für dies Verzeichniss habe benutzen können. Die unmittelbare Nähe bedeutender Forsten (Darzluber und Pikelkener Forst), ferner der grosse Zarnowitzer See bieten dem Manne vortreffliche Gelegenheit, und seine sehr anerkennenswerthe Energie trägt zum Erfolge erfreulich bei.

Das nachzutragende ist folgendes: *Dromius melanocephalus* Dej., *Helophorus aenepennis* Thoms., *Hydraena flavipes* St., *Ceryx aquaticus* Muls., *Gyrinus natator* L. var. *marginatus* Germ., alles bei Neustadt u. Danzig gefunden; *Anchomenus longiventris* Mannh. aus einer vom Sturni umgebrochenen Esche bei Ponarth bei Kbg. 7 St. (Fritzen).

Aber auch andere Sammler haben nicht gefeiert, von ihnen ist das Verzeichniss mit folgenden seltenen Arten bereichert: *Platystothus capito* Heer. Kbg. (Ltz.); *Synchita Mediolanensis* Villa. 1 St. Gelguhnen bei Allenstein (Ltz.); *Apion meliloti* Kirby. Kbg. (Ltz.); *Magdalinus coeruleipennis* Desbr. (fehlt bei Stein u. Weise) 2 St. mit *violaceus*, Löwenhagen (Ltz.); *Quedius picipes* Mannh. unter Buchenlaub bei Pelonken (Czw.); *Q. fumatus* Steph. *peltatus* Er. Schwedendamm bei Oliva u. Pelonken (Czw.); *Epuraea melanocephala* Marsh. im königl. Garten von Oliva (Czw.); *Agaricophagus cephalotes* Schm. Dz. Rheda u. Conradshammer (Czw.); *Stenus coxalis* I. Sahlb. bisher nur aus Finnland be-

kannt, mehrfach bei Dz. (Czw.) nach einem typ. Stücke durch Eppelsheim bestimmt; *Hygropora cunctans* Er. Dz. (Czw.); *Homalota villosula* Kraatz. ebenso. *Ceuthorh. Sahlibergi* Schh. Ggbg. (Kr.); *Calodera protensa* Er. s. Kgb. (Czw.). Auffallend ist der Fund eines lebenden Stücks von *Ochina hederae* Müll. in einem Zimmer, das einige Töpfe mit Epheu enthielt (Künow). Da der Epheu aber in manchen unserer Wälder sogar recht reichlich vertreten ist (ich erinnere nur an den Wald bei dem sog. Ziegenhals bei Elbing), so ist die Möglichkeit eines weiteren Vorkommens jenes Käfers nicht ausgeschlossen.

Das Resultat ist nun, dass wir in unserer Fauna 3255 Arten von Coleopteren haben, d. h. annähernd $\frac{1}{2}$ von den Europ. bei Stein u. Weise verzeichneten 14021 Arten, genauer 0,223. Von den grösseren Familien haben bei uns die meisten Repräsentanten: die Coccinellidae $\frac{\text{♂}}{\text{♀}} = 0,424$, die Wasserläuse $\frac{\text{♂}}{\text{♀}} = 0,380$, die Nitidulidae $\frac{\text{♂}}{\text{♀}} = 0,348$, die Staphylinidae $\frac{\text{♂}}{\text{♀}} = 0,322$; die übrigen stehen tiefer, am niedrigsten die Tenebrionidae $\frac{\text{♂}}{\text{♀}} = 0,042$. Es fehlen uns nur die auch in Europa nur durch sehr wenige, mitunter durch eine einzige Art repräsentirten Familien der Paussidae, Rhysodidae, Derodontidae, Thorictidae, Cebrionidae, Rhypiceridae, Brentidae, Platypyllidae.

Möchte meine Arbeit zu weiterem Forschen in bisher unberührten Gegenden Preussens veranlassen; es wird sicherlich nicht vergeblich sein!