

AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI W KRAKOWIE.

SPRAWOZDANIE
KOMISYI FIZYOGRAFICZNEJ

obejmujące



pogląd na czynności dokonane w ciągu roku 1901

oraz

Materyały do fizyografii krajowej.

Tom trzydziesty siódmy.

(Z 4-ma tablicami i 2-ma rycinami w tekście).



W KRAKOWIE.

NAKŁADEM AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI.

SKŁAD GŁÓWNY W KSIĘGARNI SPÓŁKI WYDAWNICZEJ POLSKIEJ

1903.

Fauna Lwowa i okolicy.

I. CHRZĄSZCZE (COLEOPTERA).

(Tęgoskrzydło).

Napisał

A. M. ŁOMNICKI.

CZĘŚĆ II¹⁾.

XXXV. *Platyceridae*. Rogaczowate.

Platycerus. GROFFR. Rogacz Ł.

925. *cervus* L. (jelonek) i *var. capreolus* Fuessl. W najbliższej okolicy Lwowa bardzo rzadki, częstszy w dalszej okolicy. Pojawia się w drugiej połowie czerwca i w lipcu. Czarnuszowice, Winniki i t. d.

Dorcus. MAC LEAY. Ciołek N.

- parallelepipedus* L. Wszędzie po lasach liściastych zwyczajny, a w mieście po parkanach. Pohulanka, Snopków, Lonszanówka, Czartowska Skała i t. d., 5. V—26. VII.

Systemocerus. WEISE. Wynurt N.

- caraboides* L. W lasach liściastych w pierwszej połowie maja dość zwyczajny. Krzywozyce, Wulka, Hołosko, Rudno i t. d., 8. V—28. VI. Nie rzadko zdarza się także odmiana, *var. rufipes* Hbst.

¹⁾ Część I. wyszła w t. XXV. Sprawozdań Komisji fizyograficznej z r. 1890.

XXXVI. Scarabaeidae. Żukowate.

Coprīs. GEOFFR. Krowieńczyk N.

lunaris L. Od wiosny do jesieni wszędzie pospolity. 2. V—15. IX.

Onthophagus LATR. Zatrawiec Leś.

taurus Schreb. Dość rzadki. Zniesienie 7. VI, Bogdanówka 6. VI.930. *verticicornis* Laich. (*nutans* F.) Zalesie pod Janowem. 14. V.*austriacus* Panz. Dość zwyczajny, od wiosny do jesieni w bliższej i dalszej okolicy Lwowa. Zniesienie, Krzywezyce, Łyczaków (przedmieście). 2. V—23. IX.*vacca* L. i *var. medius* Panz. Pospolity. Wysoki Zamek, Wulka, Lesienice i t. d. 29. IV—14. VIII.*coenobita* Hbst. Wszędzie zwyczajny tak na przedmieściach, jak w najbliższej okolicy: Krzywezyce, Hołosko, Bogdanówka, Snopków i t. d. 1. V—9. VI.*fracticornis* Preysl. Bardzo pospolity w całej okolicy. 2. III—2. V.*nuchicornis* L. Jak poprzedni wszędzie pospolity. 11. V—10. IX.*furcatus* F. Krzywezyce, 8. IV.*ovatus* L. Dość zwyczajny: Krzywezyce, Zniesienie; 15. V—23. IX.*Schreberi* L. W całej okolicy bardzo pospolity 21. V—2. VIII.

Oniticellus. SERV. Odchodnik Ł.

fulvus Goeze. Dość zwyczajny, szczególnie po piaszczystych i kamienistych miejscach: Zniesienie, Hołosko, Janów i t. d. 21. V—13. VII.

Aphodius Ill. Plugawek Ł.

940. *erraticus* L. Zwyczajny szczególnie na wiosnę, Krzywezyce, Zniesienie i t. d. 22. III—2. V.*subterraneus* L. W całej okolicy pospolity: Łyczaków, Snopków, Zniesienie, Krzywezyce i t. d. 24. IV—20. VI.*fossor* L. Zwyczajny tak w mieście jak najbliższej okolicy, szczególnie po lasach: Łyczaków, Zniesienie, Krzywezyce i t. d. 13. IV—15. VI.*haemorrhoidalis* L. Pospolity: Łyczaków, Zniesienie i t. d. 14. VI—2. VIII.*foetens* F. Zniesienie, 20. VI, Łyczaków, 2. VIII.*finetarius* L. Należy do najzwyczajniejszych plugawków tak w mieście samem jak bliższej i dalszej okolicy. 24. III—4. VII.*scybalarius* F. Rzadki. Zamarstynów 6. IV; Łyczaków 9. V.

- granarius* L. Bardzo pospolity tak w mieście po ogrodach i podwórzach, jak w okolicy, szczególnie na wiosnę 1. IV—17. V.
- ater* Deg. Pohulanka, 21. IV; Krzywczycze, 21. V.
- sordidus* F. Dość rzadki: Krzywczycze, Łyczaków, Zubrza i t. d. 21. IV—17. IX.
950. *rufus* Moll. Zniesienie, 20. VI; Krzywczycze, 6. VII.
- immundus* Creutz. Nierzadki szczególnie na pastwiskach zniesieńskich; 20. VI—5. VIII.
- merdarius* F. Pohulanka, Krzywczycze, Zubrza, Kleparów i t. d. Najczęstszy z wiosną; 28. IV—20. V.
- inquinatorius* F. Zwyczajny w całej okolicy; 25. III—14. X.
- melanostictus* Schmdt. Rzadki: Hołosko, 15. IV; Łyczaków 27. IV.
- sticticus* Panz. Snopków, 25. IV; Krzywczycze, 24. V.
- prodromus* Brahm. Najpospolitszy ze wszystkich plugawków w całej okolicy od wczesnej wiosny aż do późnej jesieni; 21. III—21. X.
- pubescens* St. Bardzo rzadki w najbliższej okolicy Lwowa.
- scrofa* F. Kortumówka, 20. V; 31. V. Lonszanówka.
- tristis* Panz. Lwów (miasto), Zniesienie, Hołosko; 26. III—20. V.
960. *pusillus* Hbst. W całej okolicy zwyczajny: Zniesienie, Pohulanka, Snopków, Krzywczycze i t. d. 28. III—4. VII.
- lividus* Ol. Zamarstynów, 6. VI.
- varians* Dfl. (*bimaculatus* F.) W całej okolicy zwyczajny: Zniesienie, Wulka, Krzywczycze, Pohulanka, Snopków i t. d. 15. V—29. VI.
- niger* Panz. Lwów 10. V.
- plagiatus* L. Białohorszcze, 6. VI; Zubrza, 14. VI.
- bimaculatus* Laxm. Janów.
- rufipes* L. Krzywczycze, 9. VII.
- depressus* Kug. Bogdanówka 1. V, Janów 4. VI, Kulparków 9. V.
- luridus* F. Pospolity w całej okolicy szczególnie w maju i czerwcu; *v. nigripes* F. Grzybowice, 30. IV.

Oxyomus. LIAP. Nieczystek Ł.

- sylvestris* Scop. (*porcatus* F.). Bardzo pospolity tak w mieście, jak w całej okolicy; 21. III—27. X.

Rhyssemus MULS. Kopacz Ł.

970. *germanus* L. Dość rzadki: Zamarstynów, Wulka, Hołosko, Łyczaków; 9. IV—1. VI.

Diasticticus. MULS.

- vulneratus* St. Zwyczajny, szczególnie na wzgórzach kamienistych

i piaskach: Zniesienie, Krzywezyce, Snopków, Hołosko i t. d.
14. V—6. VI.

Psammodes. LAMP. Żwirowiec Ł.

sulcicollis Ill. Hołosko, 1. V; Snopków, 28. IX.

Ochodaeus. SERV. Wygonak N.

chrýsomeloides Schrank. Dość rzadki: Wysoki Zamek, Jałowiec,
Krzywezyce, Janów; 17. V—27. VII.

Trox. F. Modzelatka Leś.

sabulosus L. Krzywezyce, Czartowska Skała, Czarnuszowice, Wulka
i t. d. 29. IV—24. VII.

scaber L. Zwyczajniejszy od poprzedniego: Łyczaków, Hołosko
i t. d. 21. IV—25. VI.

Odontaeus. KLUG. Bawolik N.

armiger Scop. Dość rzadki: Pohulanka, Pasiaki, Krzywezyce i t. d.
27. V—9. VII.

Geotrupes. LATR. Żuk lud.

stercorarius L. (*putridarius* Er.) (Gnojak). Pospolity od wczesnej
wiosny po późnej jesieni.

spiniger Marsh. (*stercorarius* Er.). Znacznie rzadszy od poprze-
dniego: Zniesienie, Lesienice, Zimna Woda, Pasiaki, Ho-
łosko i t. d.

mutator Marsh. (Zmiennik). Bardzo pospolity w całej okolicy od
wiosny do późnej jesieni.

980. *sylvaticus* Panz. (Leśnik). Wszędzie po lasach (ż. leśny) bar-
dzo pospolity; 5. V—15. IX.

vernalis L. (Wiośniak). W okolicy Janowa i Mokrotyna (Kopanka)
zwyczajny; w bliższej okolicy Lwowa dotychczas nie do-
strzeżony. Pojawia się głównie w maju i czerwcu.

Lethrus. Scop. Krawiec N.

cephalotes Pall. Po miedzach i rowach przydrożnych w okolicy
Bilki Szlacheckiej i Czarnuszowic w maju.

Oryctes Ill. Rohatyniec Leś.

nasicornis L. (Nosorożnik). W mieście po inspektach w maju.

Rhizotrogus. LATR. Gąbiak N.

solstitialis L. (Czerwczyk). Zwyczajny tak w mieście jak całej okolicy; 3. VI—24. VII. Najliczniej pojawia się przy końcu czerwca i w pierwszej połowie lipca.

Polyphylla. HARRIS. Walkarz N.

fullo L. (Lipczyk). W niektórych latach obficie pojawia się tak w samym mieście, n. p. na piaskach pod Łyczakowską rogatką, na Mazurówce, jakoteż w dalszej okolicy n. p.: na Hołosku, w Brzuchowicach. Przy końcu czerwca i w lipcu

Melolontha. F. Chrabąszcz Leś. (Chrabąszcz lud.).

Hippocastani F. (Kasztanek) W całej okolicy po ogrodach i lasach zwyczajny. W typowej formie rzadziej występuje, zwykle jako odmiana var. *nigripes* Com. W pierwszej połowie maja najpospolitszy; 30. IV—27. V. Pojawia się razem z chr. majowym w tych samych latach (chrabąszczowych).

vulgaris F. (Chr. majowy). Zarówno jak poprzedni zwyczajny, w niektórych jednak okolicach rzadszy od niego. Nadmierne pojawił się w r. 1887 i 1903. (lata chrabąszczowe); innych lat chrabąszczowych nie zapisano.

Serica. MAC LEAY. Jedwabek Ł.

holosericea Scop. Tak w obrębie samego miasta jak okolicy dość pospolity od najwcześniejszej wiosny. Wysoki Zamek, Piaszkowa Góra, Zniesienie, Krzywczyce, Snopków, Czartowska Skala, Hołosko i t. d. 28. III—7. VI; bardzo rzadko w jesieni; Snopków, 5. X.

brunnea L. Znacznie rzadszy od poprzedniego. Łyczaków, Lesienie, Czarnuszowice, Obroszyn; 11. VII—13. VIII.

Homaloptia. STEPH. Rówienek N.

990. *uricola* F. Dość pospolity tak na przedmieściach (Łyczaków), jak w najbliższej okolicy: Hołosko, Pasięki, Krzywczyce, Janów i t. d. 20. VI—28. VII. Najliczniej pojawia się w pierwszej połowie lipca.

Anomala. SAM. Nierówienka N.

aenea Deg. Po lasach bardzo pospolita. Pojawia się głównie w drugiej połowie czerwca a w pierwszej lipca: Hołosko, Pasięki, Zniesienie; 5. VI—18. VII.

Phyllopertha. KIRBY. Niszczylistka N.

horticola L. (Ogrodnica). Bardzo pospolita w ogrodach, sadach i lasach na rozmaitych krzewach, szczególnie zaś na różach. Zaczyna się pojawiać dopiero przy końcu maja, a najliczniejszą jest w połowie czerwca; 27. V—30. VI.

Anisoplia. LAP. Nałanek N.

segetum Hbst. (Kłosiec). Po okolicznych polach, szczególnie na glebie piaszczystej bardzo pospolity. W porze najliczniejszego pojawu, która przypada na środek czerwca, obsiada kłosa głównie żyta. Hołosko, Pohulanka i t. d. 1. VI—3. VII.

cyathigera Scop. Między Horodysławicami a Mikołajowem liczny na zbożu; w okolicy bliższej Lwowa nieznan.

Hoplia. LIL. Zbrojnica Ł. (Kopyciak N).

graminicola F. W całej okolicy jakoteż na przedmieściach po suchych trawnikach i kamienistych miejscach zwyczajna. Wszystkie okazy zebrane w czerwcu (1. VI—27. VI). Hołosko, Zniesienie, Wysoki Zamek, Krzyweżyce i t. d.

Epicometis. BURM. Kosmatek Ł.

hirta Poda. (Kozuszek). Zwyczajny w całej okolicy; 25. IV—2. VI.

Cetonia. F. Kwietnica Ł.

aurata L. (Złotawka). Wszędzie w mieście po ogrodach, a w okolicy po lasach, przedlesiach na ziołach i krzewach kwitnących (bez róża, tawuła i t. d.) bardzo pospolita. Pojawia się głównie w drugiej połowie maja; zdarza się jednak jeszcze w lipcu. 2. V—30. VI.

Potosia. MULS. Kruszczyca Ł.

marmorata F. (Marmurówka). Dość zwyczajna po lasach i ogrodach. Lonszandówka, Pasieki, Hołosko i t. d. 15. V—9. VI.

speciosissima Scop. Jeden okaz pochodzi z ul. Lipowej, złapany przy końcu czerwca, drugi z Czarnuszowic (na dębie przy soku wyciekającym).

1000. *floricola* Hbst. Dość zwyczajna po lasach okolicznych; pojawia się w czerwcu. Rzadko zdarza się odmiana *var. obscura* And., Czartowska Skała, 10. VI i *var. volhyniensis* Gory, 21. VII. Kamienopol, Brzuchoiwce.

Valgus. SCRIBA. Koślawka N.

hemipterus L. Zwyczajna w całej okolicy od maja do czerwca (23. V—26. VI). Wysoki Zamek, Pohulanka i t. d. W samym mieście po parkanach i murach.

Osmoderma. SERV. Pachnica N.

eremita Scop. Dość rzadka w mieście i najbliższej okolicy po wierzbach w czerwcu i lipcu.

Gnorimus. SERV. Zaćnik N.

variabilis L. Jedyny okaz, złapany w lipcu, pochodzi z Bóbrki.
nobilis L. W ogólności bardzo rzadki w okolicy najbliższej Lwowa. Krzywezyce, 12. VII, złapany na hebdzie (*Sambucus ebulus*).

Trichius. F. Orszoł Leś.

fasciatus L. Nie rzadki w najbliższej okolicy. Pojawia się w drugiej połowie czerwca i w lipcu. Krzywezyce, Hołosko, Janów i t. d. 15. VI—21. VII.

XXXVII. Buprestidae. Bogatkowate.**Chalcophora. SOL. Miedziak N.**

mariana Lap. W borach sosnowych zwyczajny. Pojawia się w drugiej połowie maja i w czerwcu. Brzuchowice, Janów.

Pocilonota. ESCH. Chlubek Ł.

variolosa Payk. Jedyny okaz złapany w czerwcu na osice w dolinie Wężowej pod Krzywezycami.
rutilans F. Bardzo rzadki. Wszystkie okazy złapane są w mieście (wały namiestnikowskie, ogród Politechniki).

Buprestis. L. Bogatek Leś.

haemorrhoidalis Hbst. Krzywezyce, 26. VII.

Melanophila. ESCH. Ciemnik Ł.

1010. *acuminata* Deg. Dwa okazy pochodzą z samego miasta. 25. V—28. VII.

Phaenops. LAC. Przyplaszczka Ł.

cyanea F. Łyczakowskie przedmieście, 19. VI.

Anthaxia. ESCH. Kwietniczek Ł.

nitidula L. var. *signaticollis* Kryn. Po kwiatach w lasach okolicznych nie rzadki: Hołosko, Czarnuszowice, Pasieki i t. d. 27. V — 8. VII.

sepulchralis F. Hołosko. 28. VI, Barszczowice.

quadripunctata L. Zwyczajny po kwiatach w lasach i sadach w całej okolicy; 13. VI — 18. VII.

Chrysobothrys. ESCH. Zrąbień N.

affinis F. W lasach liściastych dość rzadki. Kilka okazów złapałem na ściętym dębie w Krzywezyce 15. V, Czarnuszowice 26. V.

Agrilus. CURT. Opiętek N.

biguttatus F. Dość pospolity po lasach, szczególnie na porębach, także po kwiatach na śródleśnych polankach. Hołosko, Pasieki, Krzywezyce i t. d. 26. V — 14. VI.

subauratus Gebl. Krzywezyce, 15. VI; Pasieki, 8. VII.

viridis L. Krzywezyce, Czartowska Skala, Janów, Sichów i t. d. 25. V — 5. VII. var. *Fagi* Ratzb. Janów, 5. VII. var. *linearis* Panz. Sichów. 4. VI.

pratensis Ratzb. Krzywezyce. 24. V., Czarnuszowice, 26. V.

1020. *elongatus* Hbst. Pohulanka, 20. IV., Krzywezyce 24. V., Czarnuszowice 26. V.

angustulus Ill. Hołosko, 29. VI, Lesienice, 11. VII, Lubień, 21. VII.

laticornis Ill. Obroszyn, 13. VIII.

olivicolor Kiesw. Czarnuszowice 13. VII, Obroszyn 13. VIII.

hastulifer Ratzb. Krzywezyce, 23. V.

derasofasciatus Lac. Hołosko, 28. VI, Czarnuszowice 21. VII.

cinctus Oliv. Dość zwyczajny po kwiatach na murawach i przedlesiach. Hołosko, Lonszanówka, Krzywezyce, Kortumówka, Janów i t. d. 10. VI. — 13. VIII.

antiquus Muls. Krzywezyce, 16. VI.

convexifrons Kiesw. Jedyny okaz złowiony w mieście na parkanie, 24. V.

integerrimus Ratz. Krzywezyce, 12. VII, Hołosko 13. VI.

Aphanisticus. LATR.

1030. *emarginatus* F. Hołosko 10. VI.

Trachys. F. Pozornik N.

minuta L. Wszędzie po lasach liściastych bardzo pospolity; 26. IV — 21. VII.

XXXVIII. Eucnemidae. Goleńczykowate.

Throscus. LATR. Podrywek Ł.

dermestoides L. Zwyczajny po okolicznych lasach, szczególnie w drugiej połowie maja po liściach drzew i krzewów. Pohulanka, Lesienice, Zniesienie, Zubrza, Bartatów i t. d. 9. V — 29. VII.

Drapetes. REDT. Opasek Ł.

biguttatus Piller. Jedyny okaz pochodzi z Hołoska, złapany d. 29. VI.

Melasis. OL. Gwozdnik Ł.

buprestoides L. Jedyny okaz pochodzi ze Lwowa z miejscowości bliżej nieoznaczonej.

Eucnemis. AHR. Goleńczyk Ł.

capucina Ahr. Wszystkie okazy pochodzą z samego miasta, złowione po murach i parkanach 12. VI — 28. VI.

XXXIX. Elateridae. Sprężykowate.Archontas. GOZIS (*Lacon* auct.). Podrzut N.

murinus L. (P. myszaty). Tak w mieście samem po ogrodach i trawnikach, jakoteż w całej okolicy po polach wszędzie bardzo pospolity; najliczniejszy w drugiej połowie maja; 18. IV — 30. VI.

Elater. L. Sprężyk Leś.

cinnabarinus Esch. Krzywezyce 25. V, Pasięki 14. VI.

sanguineus L. Za korą kłód i pniaków sosnowych nie rzadki. Hołosko 30. IV — 25. V.

sanguinolentus Schrk. Dość zwyczajny po lasach i sadach tak w mieście jak najbliższej okolicy. Łyczaków (przedmieście), Bogdanówka, Rudno i t. d. 6. V — 16. V. Odmiana *var. ephippium* OL. nie rzadko się zdarza.

1040. *ferrugatus* Lac. (*pomorum* auct.). W całej okolicy dość zwyczajny. Hołosko, Krzywezyce, Białohorszczce, Czarnuszowice i t. d. 6. V — 27. V.

balteatus L. Rzadki; za korą drzew sosnowych. Janów 18. IV, Krzywezyce 10. V.

crocatus Lac. Dość rzadki. Zniesienie, Wulka, Bogdanówka, 30. IV — 29. V.

elegantulus Schönh. Jedyne okaz pochodzi z okolicy Lwowa, ale bliżej nieoznaczonej.

Megapenthes. KIESW. Zrywek N.

tibialis Lac. Tak w mieście, jak najbliższej okolicy dość pospolity. Zniesienie, Krzyczyce, Pohulanka, Wulka, Czarnuszowice i t. d. 7. V — 6. VI.

Hypnoidus. STEPIA. Podzwirek Ł.

pulchellus L. Pod kamieniami na trawiastych i piaszczystych wzgórzach. Łyczaków, 28. IV, Kleparów 20. V.

4-pustulatus F. Wysoki Zamek 10. VII.

Cardiophorus. ESCH. Zawiasiek Ł.

gramineus Scop. (*thoracicus* F.). Tak w mieście po murach i parkanach jak w najbliższej okolicy rzadki. Zamarstynów, Krzyczyce i t. d. 28. IV — 22. VI.

ruficollis L. Janów 18. IV.

asellus Er. Kortumówka 15. V.

1050. *cinereus* Hbst. Zwyczajny tak po parkanach wśród miasta, jak i w najbliższej okolicy po murawach. Wysoki Zamek, Zamarstynów, Krzyczyce, Pohulanka, Kleparów i t. d. 16. V — 31. V.

Equiseti Hbst. Wysoki Zamek 19. IV; Hołosko 31. V.

Melanotus. ESCH. Czarnożynek Ł.

castanipes Payk. W mieście po parkanach a w najbliższej okolicy po lasach liściastych zwyczajny. Wysoki Zamek, Krzyczyce, Lesienice, Czartowska Skala i t. d. 9. V — 28. V.

rufipes Hbst. Lesienice, Hołosko, Pasiaki, Janów i t. d. 1. VI — 29. VI.

crassicollis Er. Dość rzadki. Wulka, Hołosko, Janów 26. V — 12. VII.

Limonium. ESCH. Pilniczek N.

pilosus Leske (*nigripes* Gyll.) Dość pospolity po trawnikach i zarosłach, a w mieście po ogrodach. Wysoki Zamek, Wulka, Lesienice, Czartowska Skala i t. d. 16. V — 15. VI.

aeruginosus Oliv. (*cylindricus* Payk.) Bardzo pospolity po zarosłach, murawach i w lasach całej okolicy, jakoteż wśród miasta. Najliczniejszy w drugiej połowie maja. 28. IV — 7. VI.

parvulus Panz. Janów, 14. IV.

Athous. Esch. Nieskorek N.

- niger* L. Zwyczajny wszędzie po ogrodach, łąkach i zaroślach, tudzież w lasach, szczególnie w czerwcu. 20 V—11. VII.
- scrutator* Hbst. Zwyczajny zarówno z poprzednim. Krzywezyce, Lesienice, Łyczaków i t. d. 2. VI—3. VII.
1060. *haemorrhoidalis* F. Bardzo pospolity tak wśród miasta jak w okolicy po zaroślach i lasach w drugiej połowie maja a pierwszej czerwca. Wysoki Zamek, Zamarstynów, Zniesienie, Wulka, Krzywezyce, Kortumówka i t. d. 20. V—11. VI.
- vittatus* F. i var. *Ocskayi* Kiesw. Wulka 9. V—3. VI.
- subfuscus* Müll. Wszędzie po lasach liściastych i mieszanych bardzo pospolity. 7. V—21. VI. Najliczniej pojawia się w drugiej połowie maja.
- jejunus* Kiesw. Bardzo pospolity na wzgórzach trawiastych i zaroślach tak w mieście jak najbliższej okolicy. Samica zupełnie odmiennego kształtu, znacznie jest rzadsza od samca. Krzywezyce, Zniesienie, Lesienice, Hołosko, Wulka i t. d.

Ludius. Esch. Zaciosek N.

- pectinicornis* L. Dość zwyczajny po lasach liściastych. Kleparów 20. V, Lesienice, 19. V i t. d.
- purpureus* Poda. Dość rzadki w lasach. Krzywezyce, Czartowska Skała, Snopków i t. d. 15. V—10. VI.
- castaneus* L. Dość rzadki po lasach i sadach (wśród miasta). Wulka, Lesienice, Łyczaków i t. d. 11. IV—25. V.
- sjaelandicus* Müll. i var. *assimilis* Gyll. Po lasach liściastych dość pospolity. Hołosko, Pasięki, Wulka, Lesienice i t. d. 11. V—3. VI.
- tesselatus* L. Bardzo pospolity wszędzie po lasach tak liściastych jak szpilkowych. Wysoki Zamek, Pohulanka, Hołosko, Czartowska Skała i t. d. 18. V—2. VII.
- aeneus* L. Wszędzie po lasach i ogrodach zwyczajny; należy do najpospolitszych zaciosków. Pojawia się głównie w maju. 28. IV—7. VI.
1070. *latus* F. Dość pospolity, szczególnie po wzgórzach trawiastych.
- cruciatus* L. Po łąkach, zaroślach i lasach nierzadki. Wulka, Czartowska Skała, Krzywezyce, Rudno, Hołosko i t. d. 12. V—19. VI.
- bipustulatus* L. Bardzo rzadki. Kortumówka 20. V.

Agriotes. Esch. Osiewnik N.

- aterrimus* L. W lasach liściastych zwyczajny. Pohulanka, Czartowska Skała, Wulka, Zubrza, Hołosko i t. d. 9. V—12. VI.

- pilosus* Panz. Nierzadki w najbliższej okolicy po lasach. Pohulanka, Lesienice, Hołosko, Czartowska Skała i t. d. 7. V—28. VI.
- ustulatus* Schaller. Bardzo pospolity po kwiatkach szczególnie roślin okółkowych. Zniesienie, Snopków, Łyczaków, Krzywczyce i t. d. Najliczniej występuje w lipcu 15. VI—27. VIII.
- sputator* L. Bardzo pospolity; szczególnie w maju po miejscach trawiastych tak w mieście, jak najbliższej okolicy. Łyczaków, Zniesienie, Krzywczyce, Lonszanówka, Wulka i t. d. 18. IV—7. VI.
- lineatus* L. (O. rolowiec). Po okolicznych polach i ogrodach zwyczajny. 21. IV—20. VII.
- obscurus* L. Razem z poprzednim pojawia się jako szkodnik w zasiewach i ogrodowinach głównie w maju. 3. V—12. VI.
- sobrinus* Kiesw. Kilka okazów pochodzi z lasu lesienickiego, Czarnuszowice; pojawia się w drugiej połowie czerwca.

Dolopius. ESCH. Drgalnik Ł.

1080. *marginatus* L. W lasach szczególnie na świeżo rozwiniętych liściach bardzo pospolity. Pojawia się najliczniej w maju. 7. V—10. VI.

Sericus. ESCH. Doskocz Ł.

- brunneus* L. Pohulanka 7. V; Zubrza 11. V.

Synaptus. ESCH. Złączyk N.

- filiformis* F. Nierzadko po lasach okolicznych. Pohulanka, Wulka, Zniesienie, Krzywczyce i t. d. 22. V—18. VI.

Adrastus. ESCH. Wierzbik Ł.

- limbatus* F. Dość pospolity. Hołosko, Zniesienie, Krzywczyce i t. d. 11. VI—15. VIII.
- pallens* F. Zwyczajny po wierzbach, iwach i t. d. Pojawia się głównie w drugiej połowie czerwca i w lipcu. Pohulanka, Krzywczyce i t. d. 15. VI—17. VII.
- nanus* Hbst. Pospolity w całej okolicy Lwowa. 11. VI—15. VII.

Denticollis. PILLER. Zęboszyjka Ł.

- linearis* L. Nierzadka po lasach okolicznych. Krzywczyce, Lesienice, Bogdanówka, i t. d. 26. V—16. VI.

XL. Dascillidae. Popielichowate.

Dascillus. LATR. Popielicha Ł.

cervinus L. Hołosko, Janów 14. VII. W ogólności rzadka.

Helodes. LATR. Wyślizg. Ł.

minuta L. Po zaroślach i polankach śródleśnych na kwiatkach dość pospolity. Krzywezyce, Zniesienie, Pasięki, Pohulanka, Snopków, Bogdanówka; nie rzadka jest także odmiana *var. laeta* Panz. razem z typową formą. 18. V — 21. VIII.

Microcara. THOMS. Miękinia Ł.

testacea L. Czarnuszowice 13. VI.

Cyphon. PAYK. Jarzmik Ł.

1090 *pallidulus* Boh.¹⁾ Krzywezyce, Wulka, Zubrza, Janów, Bartatów. 28. III—28. VII.*coarctatus* Payk. Zwyczajny tak w obrębie samego miasta po ogrodach, jak w okolicy po lasach i zaroślach. 28. III — 9. X.*variabilis* Thunb. Bardzo pospolity w całej okolicy. 6. IV — 28. VII.*Padi* L. Pospolity wraz z poprzednim. Bogdanówka, Wulka, Rudno i t. d. 1. V — 26. V.*Paykulli* Guér. (*nitidulus* Thoms). Janów, 29. V.

Prionocyphon. REDT. Podjarzmik Ł.

serricornis Müll. Jedyne okaz z Parku Kilińskiego.

Scirtes. LL. Skoczeń Ł.

haemisphaericus L. Po bagnistych zaroślach zwyczajny, szczególnie po wierzbach. Wulka, Hołosko i t. d. 18. VI — 29. VI.
orbicularis Panz. Janów 10. VII.

Eubria. SHUCK. Bagnik Ł.

palustris Germ. Dość rzadki. Krzywezyce, 15. VI, Kleparów, 5. VII.

Eucinetus. GERM. Związlik Ł.

haemorrhoidalis Germ. Bardzo rzadki. Hołosko 7. VI.¹⁾ Gatunek nowy dla fauny galicyjskiej.

XLI. Cantharidae. Omomilkowate.

Homalilus. GEOFFR. Rozgniotek Ł.

1100. *Fontisbellaquei* Fourer. (*suturalis* Ol.). Rzadki po lasach liściastych. Krzywezyce, 9. VI — 15. VI.

Dictyoptera. LATR. Czerwonka Ł.

Aurora Hbst. Rzadka; w lasach liściastych. Białohorszcze 28. V, Brzuchowice 14. V, Janów 1. VI.

Pyropterus. MULS. Ognik Ł.

affinis Payk. Bartatów 22. VII, Hołosko 13. X.

Platycis. THOMS. Lubezyk Ł.

minuta F. W lasach liściastych za korą drzew nierzadki. Krzywezyce 21. VIII, Lesienice 2. IX.

Lygistopterus. MULS. Karmazynek Ł.

sanguineus L. Za korą drzew i po kwiatach na polanach śródleśnych i na porębach zwyczajny. Krzywezyce, Hołosko, Pasieki i t. d. 20. V — 15. VII.

Lamprohiza. Mocz. Okieńczak N.

splendidula L. (Iskrzyk). W niektórych latach bardzo pospolity tak w mieście po ogrodach, jak po lasach okolicznych; 17. VI — 20. VII.

Podabrus. WEST.

alpinus Payk. Rzadki. Krzywezyce 16. VI. Czarnuszowice 7. VI.

Cantharis. L. Omomilek Leś.

violacea Payk. Krzywezyce 17. V — 16. VI.

fusca L. Wszędzie po trawnikach i zaroślach tak w mieście, jak w całej okolicy zwyczajny. 25. V — 18. VI.

rustica Fall. Jak poprzedni. Najliczniej pojawia się w drugiej połowie maja; 7. V — 27. V.

1110. *obscura* L. Po lasach dość pospolity; Zniesienie, Hołosko, Pasieki i t. d. 8. V — 9. VI.

- nigricans* Mttll. Po murawach, zaroślach i lasach w całej okolicy zwyczajny. Wysoki Zamek, Lonszanówka, Łyczaków, Lesienice, Zniesienie, Krzywezyce, Kleparów i t. d. Najliczniejszy w pierwszej połowie czerwca; 7. V—25. VI.
- pellucida* F. Dość rzadki. Czartowska Skala 22. V, Hołosko 13. VI, Pohulanka 18, VI.
- livida* L. Wraz z odmianą *var. rufipes* Hbst. (*dispar* F.), zwyczajny po lasach i zaroślach. Krzywezyce, Pasieki, Wulka, Lonszanówka i t. d. 31. V—14. VI.
- assimilis* Payk. Dość pospolity po lasach i zaroślach. Krzywezyce, Pohulanka, Snopków, Kortumówka, Kleparów i t. d. 5. V—21. V.
- rufa* L. Wraz z odmianą *var. pallida* Goeze. Wulka, Bogdanówka, Bartatów, Sichów i t. d. 4. VI—21. VII.
- fulvicollis* F. Krzywezyce, Bartatów, Łyczaków, Zniesienie. 26. VI—16. VII.
- bicolor* Hbst. (*thoracica* Ol.) Rzadki. Białołehszece, Zniesienie 15. VII; na murze w mieście 3. VII.
- lateralis* L. (*oralis* Germ.). Jeden okaz pochodzi z miasta, złapany na murze 9. VI. Czarnuszowice 25. V.

Rhagonycha. Esch. Miękosz Ł.

- fuscicornis* Ol. Bardzo rzadki; Kulparków, 11. VII.
1120. *fulva* Scop. W całej okolicy i wśród miasta po ogrodach bardzo pospolity. Pojawia się w lipcu 7. VII—20. VII.
- testacea* L. Po rozmaitych drzewach na liściu i na kwiatach na polanach śródleśnych zwyczajny. Brzuchowice, Krzywezyce, Zniesienie, Pohulanka, Czarnuszowice, Wulka i t. d. Najliczniejszy w drugiej połowie maja. 18. V—4. VII.
- pallipes* F. Po lasach liściastych w całej okolicy pospolity. Pojawia się głównie w czerwcu. Pohulanka, Pasieki, Krzywezyce, Wulka, Janów, Lesienice i t. d. 24. V—23. VI.
- atra* L. Wszędzie po lasach. Krzywezyce, Lesienice, Janów, Wulka i t. d. 2. VI—30. VI.

Silis. LATR. Wykrójka Ł.

- nitidula* F. W całej okolicy po lasach i zaroślach zwyczajna. Wysoki Zamek, Łyczaków, Hołosko, Lesienice, Krzywezyce i t. d. Najliczniejsza w drugiej połowie maja. 16. V—2. VI.

Malthinus. LATR. Zęboszek Ł.

- punctatus* Fourer. (*flaveolus* Payk.) Dość rzadki; pojawia się w drugiej połowie czerwca i w lipcu. Hołosko, Krzywezyce, Lesienice, Pohulanka, Bartatów. 12. VI—27. VII.
- fasciatus* Ol. Krzywezyce 26. VII.

Malthodes. Kiesw. Miękuś Ł.

marginatus Latr. Krzywezyce, Czarnuszowice, Kleparów. 20.
V—1. VI.

flavoguttatus Kiesw. Wulka, 11. VII.

Drilus. Or. Ślimacznik N.

concolor Ahr. Dość rzadki po lasach okolicznych; kilka okazów
złapałem w samym mieście. Wysoki Zamek, Krzywezyce,
Lesienice, Hołosko i t. d. 2. VI—19. VI.

Troglops. Er. Obrębek Ł.

1130. *silo*. Er. Janów 19. VII, Bartatów 27. VII.

Charopus. Er. Odętek Ł.

plumbeomicans Goez. (*flavipes* Payk.). Po kwiatkach; Zniesienie
11. VI, Hołosko 7. VI—13. VI.

Ebaeus. Er. Nieprzerwek N.

pedicularius Schrank. (*praeoccupatus* Gemm.). Wulka, Pohulanka.

Axinotarsus. Mocz. Wysuwek N.

publicarius F. W ogólności rzadki. Zniesienie, Lwów (miasto) 30. VII.
**marginalis* Lap. Pasięki 1. VII.

Anthocomus. Er. Przerwiec N.

rufus Hbst. Jedyne okaz pochodzi z najbliższej okolicy Lwowa.
equestris F. Zwyczajny tak w samym mieście po ogrodach, jak
po zaroślach w najbliższej okolicy. Pohulanka, Kleparów,
Zamarstynów i t. d. 20. V—1. VI.

Malachus. F. Bęblik N. (Krwawinek Waga).

rubidus Er. Janów 31. V. Bardzo rzadki.

aeneus L. Tak w samym mieście po ogrodach i trawnikach, ja-
koteż wszędzie po zaroślach i lasach na kwiatkach bardzo
pospolicie 12. V—10. VI.

marginellus Ol. Obroszyn 13. VIII.

1140. *bipustulatus* L. Pospolity w całej okolicy po łąkach i zaroślach.
Wulka, Pasięki, Krzywezyce, Pohulanka i t. d. 24. V—14. VI.
viridis F. W ogólności rzadki. Hołosko 13. VI. Łyczaków 10. V.

Dasytes. PAYK. Rościsz Leś.

- niger* L. W całej okolicy tak wśród miasta, jak po okolicznych zaroślach, łąkach i lasach po kwiatach bardzo pospolity. 20. V—16. VII.
- coeruleus* Deg. Rzadki. W mieście na murze (Łyczaków) 28. IV; Lesienice 16. V.
- plumbeus* Müll. Zwyczajny w całej okolicy po kwiatach. Wysoki Zamek, Pasieki, Zniesienie, Krzywezyce i t. d. 28. V—20. VI, Obroszyn 13. VIII.
- fuscus* Ill. Wulka 6. VI, Czarnuszowice 4. VI.

Dolichosoma. STEPH. Długoń Ł.

- lineare* Rossi. Dość pospolity w całej okolicy po kwiatach. Zniesienie, Krzywezyce, Hołosko i t. d. 27. V—29. VI.

Haplocnemus. STEPH. Borowik Ł.

- impressus* Marsh. (*Pini* Redt.). Wysoki Zamek 20. IV., Lwów (miasto) 25. IV.
- nigricornis* F. Lesienice 19. V, Janów 13. V.

XLII. Cleridae. Przekraskowate.

Tillus. OL. Dłużeń. Leś.

- unifasciatus* F. Czarnuszowice 26. V.

Opilo. LATR. Pasterek. N.

1150. *mollis* L. W mieście po murach i parkanach, jakoteż w najbliższej okolicy zwyczajny. Zamarstynów, Zniesienie, Pasieki, Snopków i t. d. 21. IV—1. VII.

Clerus. GEOFFR. Przekrasek Leś.

- formicarius* L. W lasach sosnowych okolicznych bardzo pospolity. W mieście spotyka się na murach, na które ze składów piwnicznych drzewa wylazi. 27. III—8. V.

Trichodes. HBST. Barciel. N.

- apiarius* L. Po kwiatach tak w ogrodach jakoteż w zaroślach i na polankach okolicznych lasów bardzo pospolity 13. VI—22. VII.

Necrobia. LATR. Naścierwek Ł.

violacea L. Po ścierwach zwyczajny. Zniesienie 28. III., Krzyw-
czyce 13. VI.

Opetiopalpus. SPIN. Nagłaszczek Ł.

scutellaris Panz. Rzadki. Lonszanówka 7. VI, Pasięki 3. VI.

Eliateroides. SCHÄFF. Wiercień Ł.

dermestoides L. Krzywczyce 16. V; Snopków 18. V.

Lymexylon. F. Drwionek Leś.

navale L. Jedyńy okaz złapany w obrębie miasta w lipcu.

XLIII. Bruchidae. Pustoszwate.**Gibbium. SCOP. Garbusik Ł. (Garbiec Leś).**

psylloides Czempiański. Wszystkie okazy pochodzą z śródmieścia,
gdzie po murach nie rzadko się zdarzają. 28. III—11. VII.

Niptus. BOIELD. Wypuklak Ł.

hololeucus Fald. Po murach kamienicznych bardzo rzadki.
1. V—6. X.

crenatus F. Krzywczyce 28. IV, Lwów (miasto) 2. IV.

Bruchus. GEOFF. Pustoszw Waga.

1160. *rufipes* F. W całej okolicy dość pospolity. Zniesienie, Krzyw-
czyce, Zamarstynów, Obroszyn i t. d. 24. V—13. VIII.

fur L. W mieście po składach i spiżarniach, skąd na mury wczas
na wiosnę wylazi. 26. III—20. V.

bicinctus St. Razem z poprzednim 29. IV.

latro F. Krzywczyce 13. V; Kleparów 20. V; w mieście od 6.
IV—26. XII.

brunneus Dft. v. *testaceus* Boid. Po murach w mieście nie rzadki.
1. I—16. VI.

pilosus Müll. W mieście na murze 28. III; Bogdanówka 26. V.

XLIV. Byrrhidae. Kołatkowate.**Byrrhus. GEOFF. (Anobium auct.). Kołatek Leś.**

pertinax L. Po domach dziurawi sprzęty drewniane.

striatus Ol. Zwyczajniejszy od poprzedniego i szkodliwszy od niego. Wylęga się w czerwcu 20. V.—12. VII.

fulvicornis St. Lwów 5. VII.

rufipes F. Wulka 18, VI.

1170. *panicus* L. Zwyczajny po domach, w sklepach i spiżarniach, także po lasach. Wysoki Zamek, Bogdanówka, Hołosko, Zniesienie i t. d. 9. V—19. IX.

Xestobium. Mocz. Tykotek N.

rufovillosum Deg. Zwyczajny w całej okolicy po kwiatach, tudzież w mieście po parkanach 8. IV—31. V.

Ernobius. THOMS. Stukacz Ł.

abietinus Gyll. Lwów 10. IV.

mollis L. Na sosnach nie rzadki; Hołosko 9. VI; Lwów (strzelnica miejska) 19. IV.

longicornis St. Krzywezyce 10. VI.

Hedobia. St. Zamierek N.

imperialis L. Po lasach liściastych i w samym mieście nie rzadki. Pohulanka, Czartowska Śkała i t. d. 7. V—14. VI.

Trypopitys. REDT. Psowacz Ł.

Carpini Hbst. W mieście po murach i parkanach nie rzadki. 24. VI—3. VII.

Ptilinus. GEOFFR. Wyszlik N.

pectinicornis L. W lasach liściastych. Wulka, Pohulanka, Laszki i t. d. 26. VI—11. VII.

costatus Gyll. Nie rzadszy od poprzedniego. Zniesienie, Hołosko, Pohulanka, Wulka i t. d. 1. VI—2. VII.

Xyletinus. LATR. Drzewień N.

ater Panz. Wulka 6. VI.

1180. *pectinatus* F. Po starych płotach i parkanach, tudzież w lasach okolicznych nie rzadki 26. V—1. VII.

Coenocara. THOMS. Purchawek Ł.

bovistae Hoffm. Dość pospolity; Zniesienie, Krzywezyce i t. d. 24. V—23. VIII.

XLV. Lyctidae. Miazgowce

Lyctus. F. Miazgowiec N.

unipunctatus Hbst. Pospolity tak w mieście samem, jak okolicy, po parkanach i plotach, także w lasach liściastych po sągach. 15. V — 16. VII.

pubescens Panz. Rzadszy od poprzedniego. Pohulanka, Białoehrsze, Zimnawoda i t. d. 18. V — 4. VI.

XLVI. Bostrychidae. Kapturniki.

Bostrychus. GEOFFR. Kapturnik Ł.

capucinus L. Pod korą dębów. Wylęga się w drugiej połowie maja i w czerwcu. Lesienice, Krzywczyce i t. d.

XLVII. Ciidae. Czerwikowate.

Cis. LATR. Czerwik N.

nitidus Hbst. Hołosko, Bogdanówka, Krzywczyce i t. d. 30. III — 15. VIII.

Boleti Scop. Wszędzie w hubach drzewnych; 11. IV — 17. VIII.

micans F. W lasach liściastych bardzo pospolity; 29. III — 11. VIII.

hispidus Gyll. W grzybach drzewnych zwyczajny; 3. V. — 26. VIII.

alni Gyll. Zubrza 7. V.

1190. *festivus* Panz. Pohulanka 27. V.

Rhopalodontus. MELLÉ. Zęboń Ł.

fronticornis Panz. W hubie drzewnej w Muz. im. Dzieduszyckich wylęgił się 22. V. w ogromnej ilości.

Ennearthron. MELLÉ. Dziewięciornik Ł.

affine Mell. W grzybach drzewnych, wszędzie po lasach liściastych 19. V — 23. VII.

Octotemnus. MELL. Ośmiornik Ł.

glabriculus Gyll. W hubach drzewnych nie rzadki. Bartatów, Pohulanka, Lesienice i t. d. 15. V — 27. V.

XLVIII. Tenebrionidae. Czarnuchowate.

Blaps. F. Pokątnik Leś.

mortisaga L. (Złowieszczyk). W mieście po piwnicach i spizarniach zwyczajny 26. IV — 16. X.

similis Latr. Lwów (miasto) 4. VII, Zniesienie 10. V.

Crypticus. LATR. Czarnik Ł.

quisquilius L. W całej okolicy po suchych i trawiastych, kamiennistych i piaszczystych miejscach bardzo pospolity 23. V — 6. VII.

Platyscelis. LATR. Zapylec Ł.

polita St. W Hołosku na piaskach zwyczajny; jeden okaz pochodzi z Krzywezyńc; 25. V — 1. X.

Pedinus. LATR. Zatepka Ł.

femoralis L. Wszystkie okazy pochodzą z Hołoska, złowione na piaskach; 29. V — 2. X.

Opatrum. F. Omrzel Leś.

sabulosum L. W całej okolicy po suchych, trawiastych miejscach i po piaskach bardzo pospolity. Należy do najwcześniejszej pojawiających się chrząszczów; 2. VI — 28. VII.

Microzoum. REDT. Mrzygłodek Ł.

1200. *tibiale* F. Szczególnie po piaskach zwyczajny. Hołosko (najliczniej), Lesienice, Bogdanówka i t. d. 15. V — 18. VII.

Bolitophagus. ILL. Grzybożerek Ł.

reticulatus L. W gnijących kłodach po lasach liściastych dość rzadki. Zubrza 7. IV. (w brzozie).

Diaperis. GEOFFR. Borzewka Leś.

Boleti L. Czarnuszowice 13. VI.

Hoplocephala. LAP. Rogaczek Ł.

haemorrhoidalis F. W lesie krzywezyńskim tuż za rogatką Łyczakowską, pod korą bukową, przy końcu czerwca, raz jedyny w wielkiej ilości złapany.

Scaphidema. REDT. Niłodzik N.

metallica F. Łyczaków 4. VI, Zubrza 7. IV.

Pentaphyllus. LATR. Pięciorok Ł.

testaceus Hellw. W wypruchniałym dębie na Pohulance (Cetnerówka) bardzo pospolity 29. V.

Uloma. STEPH. Cwieczyn N.

culinaris F. Janów, w czerwcu.

Tribolium. MAC LEAY. Próchnik Ł.

ferrugineum F. W mieście na parkanie 23. III.

madens Charp. Laszki 11. VII.

Corticeus. PILL. Korosz N.

linearis F. Jedyny okaz z okolicy Lwowa.

Tenebrio. L. Czarnuch Ł.

1210. *obscurus* F. Czarnuszowice 22. VII.

molitor L. (mącznik). Po domach w spiżarniach w mącznych zapasach zwyczajny.

Helops. F. Mroczek Ł.

quisquilius F. Bardzo rzadki, 5. V Krzywczyce.

lanipes L. W lasach liściastych i w mieście po parkanach i podwórzach (ze sągów przywiezionych z lasów okolicznych) zwyczajny 15. IV — 12. VI.

XLIX. Alleculidae. Murzynkowate.

Hymenorus. MULS.

Doublieri Muls. Znany z południowej Francji. Jedyny okaz pochodzi z samego Lwowa, złapany w lipcu.

Eryx. STEPH. Czarnuszka Ł.

ater F. Jedyny okaz złowiony 17. VII. na poręczy przy ul. Jabłonowskich.

Hymenalia. MULS.

rustipes F. (*fusca* Ill.). W okolicy najbliższej Lwowa dość rzadki; Lwów (miasto); Lesienice 2. VII — 4. VII.

Gonodera. MULS.

Luperus Hbst. Janów 17. VI.

murina L. Na Hołosku dość pospolity po kwiatach; 7. VI — 29. VI.

Mycetochara. BERTH. Grzybomirek Ł.

axillaris Payk. i *v. maurina* Muls. Krzywczyce, Lesienice i t. d. tudzież w mieście po murach i parkanach nierzadki 8. IV — 27. VI.

1220. *flavipes* F. Zwyczajny po okolicznych lasach. Hołosko, Wulka i t. d. 29. V — 25. VI.
bipustulata Ill. Lwów (miasto), Pasieki i t. d. 25. V — 1. VII.

Cteniopus. Sol. Grzebyczak N.

- flavus* Scop. (*sulphureus* L.). Po lasach okolicznych i ogrodach w mieście dość pospolity w pierwszej połowie lipca. Wysoki Zamek, Zamarstynów, Krzywezyce i t. d. 14. VII — 21. VII.

Omophlus. Sol. Barczyńska N.

- Amerinae* Curt. (*pinicola* Redt.). Na sosnach bardzo pospolita, szczególnie pod konicę maja. Hołosko, Krzywezyce 25. V — 13. VI.

L. Lagriidae. Omiękowate.

Lagria. F. Omięk Leś.

- hirta* L. W całej okolicy bardzo pospolity po zaroślach i lasach; 6. VII — 26. VIII.

LI. Melandryidae. Śniadkowate.

Tetratoma. F. Czworak Ł.

- ancora* F. Jedyne okaz pochodzi z najbliższej okolicy Lwowa.

Orchesia. Latr. Rzutnica Ł.

- micans* Panz. (*picea* Reitt). Krzywezyce 8. VI, Lwów (miasto) 11. IX.
undulata Kr. Na murze pocztowego gmachu d. 9. III. (Zańko).

Xylita. Payk. Drzewinka Ł.

- laevigata* Hell. Grzybowice 26. IV.

Hypulus. Payk. Wrężyn N.

- quercinus* Quens. Czarnuszowice, Pohulanka 27. V.
 1230. *bifasciatus* F. Grzybowice 12. IV, Krzywezyce 8. VI.

Melandrya. F. Śniadek Ł.

- caraboides* L. Nie rzadki w lasach liściastych, szczególnie pod korą drzew nadpruchniałych. Krzywezyce, Brzuchowice, Pasieki, Czartowska Skała i t. d. 20. V — 12. VI.

Phryganophilus. SAHLB. Wieszczolubek Ł.

nigriventris Hampe. Jedyńy okaz złapany w samem mieście na parkanie 16. V.

LII. Mordellidae. Miastkowate.

Tomoxia. COSTA. Wypustek Ł.

biguttata Gyll. Po wierzbach starych nierzadki tak na przedmieściach, jak w najbliższej okolicy. Pohulanka, Lesienice i t. d. 3. VI—2. VII.

Mordella. L. Miastka Leś.

fasciata F. Bardzo pospolita w całej okolicy po kwiatach 11. VI—15. VII.
aculeata L. Razem z poprzednią i od niej zwyczajniejsza 8. VI. — 5. VII.

Mordellistena. COSTA. Schylił N.

Newwaldeggiana Panz. (*brunnea* F.) Czartowska Skala 11. VIII, Czarnuszowice w czerwcu.
parvula Gyll. i *var. inaequalis* Muls. Snopków 3. VI, Hołosko 2. VI.
micans Germ. (*minima* Costa). W całej okolicy zwyczajny po kwiatach, zaróślach przedleśnych i t. d. Krzywezyce, Zniesienie, Pohulanka, Kleparów i t. d. 20. V—15. VII.
pumila Gyll. Dość pospolity. Czarnuszowice, Wysoki Zamek, Zniesienie, Hołosko i t. d. 7. V—4. VII.

Anaspis. GEOFFR. Niekolezyk N.

1240. *frontalis* L. Wszędzie tak w mieście po ogrodach i zaróślach, jak w całej okolicy bardzo pospolity 20. V—30. VI. *Var. lateralis* F. Kleparów, Czarnuszowice, Brzuchowice 20. V—13. VI.
flava L. i *var. thoracica* L. Wysoki Zamek, Bogdanówka, Obroszyn, Czarnuszowice i t. d. 22. V—13. VIII.
rufilabris Gyll. Lesienice 12. VI.

LIII. Meloidae. Oleicowate.

Meloë. L. Oleica N.

proscarabaeus L. (Krówka). Wszędzie, tak na przedmieściach, jak w okolicy po trawnikach, szczególnie w drugiej połowie kwietnia i w maju zwyczajna. 11. IV—3. VI.

- violaceus* Marsh. Pospolita w całej okolicy; 21. IV—15. V.
decorus Brandt. Znana z bliżej nieoznaczonej okolicy Lwowa.
variegatus Don. Po lasach nie rzadka; Krzywczyce, Lesienice, Pasięki i t. d. 23. IV—26. V.
rugosus Marsh. Tak na wiosnę, jak w późnej jesieni nie rzadka po kamienistych i piaszczystych miejscach, pod kamieniami i na trawnikach. Łyczaków, Bogdanówka, Lonszanówka, Zniesienie i t. d. 27. III—19. IV; 25. IX—26. X.
scabrisculus Brdt. Dość rzadka. Wulka, Hołosko, Grzybowice i t. d. 14. IV—13. V.
brevicollis Panz. Jak poprzednia należy do rzadszych oleic. Pasięki, Krzywczyce, Hołosko 30. IV—9. VII.

Cerocoma. GEOFFR. Rogatnica Leś.

1250. *Schaefferi* L. Zubrza 8. VII, Janów 31. VII.

Lytta. F. Majka lud. (Kantaryda Leś.)

- vesicatoria* L. Po jesionach tak w mieście, jak okolicy w niektórych latach bardzo pospolita, szczególnie w drugiej połowie czerwca.

LIV. Pyrochroidae. Ogniczkowate.

Pyrochroa. GEOFF. Ogniczek J.

- coccinea* L. W lasach liściastych nie rzadki. Krzywczyce, Lesienice, Zniesienie, Pasięki i t. d. 22. V—24. VI.
pectinicornis L. Dość rzadki po lasach okolicznych. Lesienice, Sopotków i t. d. 18. V—20. VI.

LV. Anthicidae. Nakwiatkowate.

Notoxus. GEOFF. Gliczyca N.

- monoceros* L. Bardzo pospolita, szczególnie po wierzbach w całej okolicy 7. V—16. VII.

Anthicus. PAYK. Nakwiatek Ł.

- floralis* F. Po suchych, trawiastych miejscach i polach zwyczajny w całej okolicy od wczesnej wiosny do jesieni. 31. III—19. IX.
 **formicarius* Goeze. Kilka okazów znalazłem około Lwowa.
antherinus L. Zniesienie 6. IV.
axillaris Schmidt. Bogdanówka 26. V; Wulka 6. VI.

LVI. Oedemeridae. Zależszycowate.

Nacerdes. SCHMIDT. Równicha Ł.

adusta Panz. W samym mieście po murach (Łyczaków) zwyczajna. Hołosko, 6. VI — 11. VII.

Asclera. SCHMIDT. Miękosz Ł.

1260. *coerulea* L. Dość rzadki tak wśród miasta, jak w najbliższej okolicy po lasach liściastych, szczególnie na korze drzew różnych. Krzywezyce, Lesienice, Pohulanka i t. d. 26. III — 8. V.

Oedemera. OL. Zależszycza S.

flavescens L. (*femorata* Ganglb.). Bardzo pospolita w całej okolicy po kwiatach i zaroślach. Wysoki Zamek, Lonszanówka, Krzywezyce, Hołosko, Kamienopol i t. d. 11. VI — 21. VII.

flavipes F. Czarnuszowice, Janów; 12. V — 6. VIII.

virescens L. Zwyczajna po kwiatach tak na otwartych miejscach, jak wśród lasów na polankach i porębach 8. V — 16. VI.

livida Marsh. Zarówno jak poprzednia pospolita po lasach i zaroślach; 7. VI — 2. VII.

Chrysanthia. SCHMIDT. Przyłotka N.

viridissima L. Krzywezyce, Janów; 7. VII — 27. VIII.

viridis Schmidt. Hołosko 6. VII.

LVII. Pythidae. Rozmiazgowate.

Pytho. F. Rozmiazg Ł.

depressus L. Jedyńy okaz pochodzi z miasta, złapany na parkanie 25. IV.

Lissodema. CURT.

4-pustulatum Mrsh. Rzadki. Wulka, Zniesienie; 11. VI — 18. VI.

Rhinosimus. LATR. Nosacz Ł.

viridipennis Latr. (*Genei* Costa). Wysoki Zamek 21, V; Lwów (miasto) na murze, 20. X.

1270. *ruficollis* L. Na murach w mieście; 4. VI — 20. X.

planirostris F. Czarnuszowice, Hołosko 30. III — 21. VII.