

### 55. Nowe stanowisko *Liparus glabrirostris* KUST. (Coleoptera, Curculionidae) w północno-wschodniej Polsce

A new record of *Liparus glabrirostris* KUST. (Coleoptera, Curculionidae) in NE Poland

W czasie prac terenowych w Puszczy Boreckiej odkryto nowe stanowisko *Liparus glabrirostris* KUST.:

– okolice wsi Czerwony Dwór (UTM – EF70), 1–3 VI, 15 i 20 VII 1992, 5 exx. (3 ♂♂, 2 ♀♀).  
Chrząszcze spotykano na przydrożach, siedzące na różnych roślinach zielnych.

Gatunek znany jest z wielu stanowisk w Karpatach i Sudetach oraz z Ojcowa. Z północnej Polski wymieniani dotąd tylko z Pieniężna (rezerwat rzeki Walszy).

KONRAD H. MACIEJEWSKI, Toruń

### 56. Interesujące gatunki motyli (*Lepidoptera*) z Roztocza

Interesting species of *Lepidoptera* from Roztocze

Podczas kilkuletnich badań nad sówkowatymi polskiej części Roztocza, prowadzonych w latach 1986–90, stwierdzono występowanie trzech interesujących, rzadko spotykanych w kraju, gatunków motyli. Ze względu na typ rozszedlenia w Polsce zasługują one na uwagę.

Materiał dowodowy był odławiany bądź obserwowany przez autora.

*Laothe tremulae* (FISCHER – WALD.)

– Lasowce FB40; w II i III dekadzie maja 1987 i 1988 r. 6 exx odłowiono w samolówkę świetlną, usytuowaną na skraju wsi, pomiędzy rezerwatami „Nart” i „Czerkies”.

Jest to gatunek borealny występujący we wschodniej palearktyce. Przez północno-wschodnią Polskę przebiega zachodnia granica jego zasięgu. Nowo odkryte stanowisko jest najdalej na południe wysuniętym, na zachodniej granicy zasięgu tego gatunku.

*Proserpinus proserpina* (PALL.)

– Kąty II FB51; w III dekadzie maja 1988 r. 1 ex. odłowiono w samolówkę świetlną, usytuowaną na skraju świetlistej dąbrowy, z ekspozycją na kserotermiczne zbiorowiska roślinne, porastające zbocze Góry Wieprzeckiej.

Jest to gatunek rzadko odławiany w Polsce, na nielicznych stanowiskach. Z Roztocza dotychczas nie był wykazany.

*Parnassius mnemosyne* (L.)

– Siedliska FA87; Kilkanaście osobników obserwowano w I i II dekadzie czerwca w 1988 i 1989 r., wzdłuż drogi leśnej nieopodal wsi.

Jest to gatunek znany w Polsce z pojedynczych stanowisk w północno-wschodniej części kraju oraz terenów górskich wzdłuż łuku Karpat i Sudetów. Z terenu polskiego Roztocza nie był dotychczas wykazywany.

JANUSZ NOWACKI, Poznań