

Nowe dane o rozmieszczeniu *Latridiidae* (Coleoptera) w Polsce

New data on the distribution of *Latridiidae* (Coleoptera) in Poland

TOMASZ MAJEWSKI

ul. Garncarska 35/3 62-600 Koło

ABSTRACT. New records of 45 species *Latridiidae* are given. *Corticaria alleni* JOHNSON (Puszcza Białowieska, Nizina Mazowiecka) are new to the fauna of Poland.

Rodzina *Latrididae* skupia chrząszcze o małych rozmiarach ciała, w większości prowadzące skryty tryb życia. Zarówno imago, jak i larwy odżywiają się pleśniami występującymi w różnych środowiskach. Większość należących tu gatunków występuje rzadko, choć w odpowiednich środowiskach można je spotkać w większej liczbie okazów. Niektóre bardzo rzadkie gatunki łowi się pojedynczo i najczęściej przypadkowo. Wiele z nich związanych jest z dużymi kompleksami lasów o charakterze naturalnym. Nieliczne gatunki, w większości synantropijne, występują pospolicie na terenie całego kraju.

Znajomość rozsiedlenia i składu gatunkowego krajowej fauny *Latridiidae* jest bardzo niewielka. Intensywne badania w ostatnich latach wykazały szerszy niż dotąd sądzono zasięg występowania wielu gatunków. Odkryto też gatunki nie notowane dotąd z terenu Polski. Wobec powyższego uznałem za celowe podanie nowych stanowisk wszystkich posiadanych przeze mnie gatunków z tej rodziny, także pospolitych, ale nie notowanych dotąd z wielu krain.

Poniżej podaję nowe stanowiska 45 gatunków z rodziny *Latridiidae*. Okazy dowodowe, prócz dwóch co zaznaczyłem, znajdują się w moim zbiorze. Jeżeli w tekście nie zaznaczono inaczej okazy były łowione przeze mnie.

Chciałbym podziękować Panu Colinowi JOHNSONOWI za weryfikację niektórych oznaczeń oraz prof. dr hab. Lechowi BOROWCOWI za okazaną pomoc.

Cartodere (Aridius) nodifer WESTWOOD, 1839

- Pojezierze Mazurskie: okolice Lidzbarka Warmińskiego, 20 I 1985, 3 exx.
Pospolity gatunek. Występuje prawdopodobnie w całej Polsce ale z Pojezierza Mazurskiego dotychczas nie podawany.

Cartodere (s. str.) constricta GYLLENHAL, 1927

- Puszcza Białowieska: oddz. 779 A, 26 V 1992, 1 ex. (leg. J. M. GUTOWSKI).
Rzadki gatunek. Nowy dla Puszczy Białowieskiej.

Dienerella angustata STEPHENS, 1830

- Nizina Mazowiecka: Szumin k. Łochowa, rezerwat „Jegiel”, 26 VII 1993, 1 ex., 18 IV 1994, 1 ex., 12 VII 1995, 1 ok., 25 VII 1996, 2 exx.;
- Pieniny: Trzy Korony, 14 VI 1995, 1 ex.; Góra Zamkowa, 18 VI 1995, 3 exx.; Sokolica, 18 XI 1995, 13 exx. leg. Sz. CZERWIŃSKI.
Rzadki gatunek. Nowy dla Niziny Mazowieckiej i Pienin.

Dienerella clathrata MANNERHEIM, 1844

- Pojezierze Pomorskie: Bielinek n. Odrą, 22 VI 1993, 2 exx. na sągach bukowych (leg. D. KUBISZ); 11 VIII 1993, 2 exx. w pułapki ziemne (leg. L. BUCHHOLZ & M. OSSOWSKA).
Bardzo rzadki gatunek, niedawno wykazany z Polski z Dolnego Śląska (BOROWIEC, 1991b). Nowy dla Pojezierza Pomorskiego.

Dienerella filiformis GYLLENHAL, 1827

- Pojezierze Mazurskie: Lidzbark Warmiński, 20 I 1985, 1 ex.; Puszcza Borecka, 13 IX 1995, 1 ex. (leg. A. MELKE);
- Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Dzierawy k. Koła, 24 IV 1994, 6 exx.; 11 VI 1994, 7 exx.; 29 IX 1994, 10 exx.;
- Nizina Mazowiecka: Szumin k. Łochowa, 16 VII 1989, 1 ex.;
- Wyżyna Małopolska, Łódź, 16 IV 1982, 1 ex.
Rzadki gatunek. Z Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej podany ostatnio na początku naszego stulecia. Nowy dla Pojezierza Mazurskiego, Niziny Mazowieckiej i Wyżyny Małopolskiej.

Dienerella ruficollis MARSHAM, 1802

- Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Koło, 17 V 1992, 187 exx.; 10 IV 1992, 102 exx.; Tarnowa k. Turku, 8 X 1993, 8 X 1993, 1 ex.; 10 X 1993, 3 exx.
Dość rzadki gatunek. Z Polski podany z niewielu stanowisk. Nowy dla Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej.

Enicmus atripes HANSEN, 1962

- Puszcza Białowieska: oddz. 288 C/318 A, 1 ex. złowiony w pułapkę foliową typu „window-trap” w ramach badań monitoringowych puszczy (leg. J. M. GUTOWSKI).

Bardzo rzadki gatunek. Niedawno wykazany z Polski z Beskidu Zachodniego (BOROWIEC, KANIA, 1994). Nowy dla Puszczy Białowieskiej.

Enicmus brevicornis MANNERHEIM, 1844

- Pojezierze Pomorskie: Bielinek n. Odrą, 22 VI 1993, 4 exx. (leg. D. KUBISZ).

Bardzo rzadki gatunek. W Polsce znany z niewielu stanowisk przeważnie na podstawie danych z ubiegłego stulecia. Nowy dla Pojezierza Pomorskiego.

Enicmus fungicola THOMSON, 1868

- Pojezierze Pomorskie: Tuchola, 10 VII 1993, 2 exx. (leg. Sz. CZERWIŃSKI);
- Nizina Mazowiecka, Szumin k. Łochowa, 12 IV 1995, 1 ex.; 12-15 VII 1995, 2 exx.

Dość rzadki. Nowy dla Pojezierza Pomorskiego i Niziny Mazowieckiej.

Enicmus histrio JOY et TOMLIN, 1910

- Pobrzeże Bałtyku: Kołobrzeg, 20 VIII 1987, 1 ex. (leg. J. M. GUTOWSKI);
- Nizina Mazowiecka: Szumin k. Łochowa, 26 VII 1993, 1 ex.;
- Górny Śląsk: Brynek, 2 VIII 1992, 1 ex. (leg. H. SZOŁTYS);
- Roztocze: Leśnictwo Stulno, 17 V 1994, 1 ex. (leg. M. BUNALSKI);
- Pieniny: Trzy Korony, 14 VI 1995, 1 ex. (leg. Sz. CZERWIŃSKI).

Gatunek dość rzadki, choć jak się wydaje w Polsce szeroko rozprze-strzeniony. Łowiony najczęściej pojedynczo. Z wymienionych krain dotąd nie podawany.

Enicmus rugosus HERBST, 1793

- Pobrzeże Bałtyku: Woliński Park Narodowy, 27 VII 1993, 6 exx. (leg. A. MELKE);
- Nizina Mazowiecka: Szumin k. Łochowa, 20 VIII 1986, 1 ex.; 20 VII 1993, 8 exx.; 6-15 VII 1995, 14 exx.

Pospolity gatunek. Nowy dla Pobrzeża Bałtyku i Niziny Mazowieckiej.

Enicmus testaceus STEPHENS, 1830

- Puszcza Białowieska: oddz. 288 C/318 A, 1 ex.; 24 V 1994, 1 ex.; oddz. 399C, 2 VIII 1994, 1 ex. złowione w ramach badań monitoringowych (leg. J. M. GUTOWSKI); oddz. 284 B, 24 VI 1995, 1 ex.; oddz. 450, 22 V 1995, 1 ex. (leg. L. BUCHHOLZ & M. OSSOWSKA).

Bardzo rzadki gatunek. Nowy dla Puszczy Białowieskiej.

Enicmus transversus MANNERHEIM, 1884

- Pojezierze Pomorskie: Tuchola, 10 VII 1993, 3 exx. (leg. Sz. CZERWIŃSKI);
- Nizina Mazowiecka: Szumin k. Łochowa, 20 VII 1983, 7 exx.; 12 IV 1995, 8 exx.; 6–10 VII 1995, 7 exx.

Pospolity gatunek. Nowy dla Pojezierza Pomorskiego i Niziny Mazowieckiej.

Latridius anthracinus MANNERHEIM, 1884

- Nizina Mazowiecka: Szumin k. Łochowa, 8–10 VII 1995, 51 exx.;
- Wyżyna Małopolska: Łódź, 20 III 1980, 2 exx.

Gatunek bardzo pospolity, ale z wymienionych krain jeszcze nie podawany.

Latridius consimilis MANNERHEIM, 1884

- Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Koło, 3 V 1990, 1 ex.; 17–15 I 1993, 2 exx.; Dąbrowice k. Koła, 15 VI 1986, 1 ex.; 17 III 1992, 1 ex.; Poznań, 29 II 1993, 3 exx.; 10 III 1993, 2 exx.;
- Nizina Mazowiecka: Szumin k. Łochowa, 19 VII 1993, 10 exx.; 15 XI 1993, 9 exx.

Rzadki gatunek. Nowy dla Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej i Niziny Mazowieckiej.

Latridius hirtus GYLLENHAL, 1827

- Pojezierze Pomorskie: Tuchola, 10 VII 1993, 1 ex. (leg. Sz. CZERWIŃSKI).
- Niezbyt pospolity. Nowy dla Pojezierza Pomorskiego.

Latridius minutus LINNAEUS, 1767

- Pojezierze Mazurskie: Lidzbark Warmiński, 20 I 1986, 3 exx.
- Gatunek pospolity, ale nie notowany dotąd z Pojezierza Mazurskiego.

Stephostethus angusticollis GYLLENHAL, 1827

- Nizina Mazowiecka: Szumin k. Łochowa, 19 IV 1994, 3 exx.; 12 IV 1995, 19 exx.; 6 VII 1995, 8 exx.;
- Wzgórza Trzebnickie: Laski k. Kępna, 8 V 1995, 1 ex. (leg. Sz. CZERWIŃSKI);
- Pieniny: Sokolica, 18 XI 1995, (leg. Sz. CZERWIŃSKI).

Najpospolitszy przedstawiciel rodzaju. Nowy dla Niziny Mazowieckiej, Wzgórz Trzebnickich i Pienin.

Stephostethus sinuatocollis FALDERMANN, 1837

- Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Kościelec k. Koła, 2 I 1994, 2 exx. wysiane ze ściółki nad stawem.

Bardzo rzadki gatunek. Nowy dla Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej.

Stephostethus lardarius DE GEER, 1775

- Pojezierze Mazurskie: Lidzbark Warmiński, 6 VII 1985, 2 exx.
Niezczęsty. Nowy dla Pojezierza Mazurskiego.

Stephostethus rugicollis OLIVIER, 1790

- Nizina Mazowiecka: Szumin k. Łochowa, 7 VII 1995, 7 exx.
Dość pospolity w lasach iglastych. Nowy dla Niziny Mazowieckiej.

Thes bergrothi REITTER, 1843

- Pojezierze Mazurskie: Lidzbark Warmiński, 10 II 1985, 1 ex.
Gatunek synantropijny, szeroko rozprzestrzeniony, lecz niezczęsto łowiony.
Nowy dla Pojezierza Mazurskiego.

Corticaria alleni JOHNSON, 1974

- Puszcza Białowieska: oddz. 539 C, 10 V 1994, 1 ex.; 24 V 1994, 1 ex. oba
okazy złowione zostały w ramach badań monitoringowych w pułapki
Moericke'go (leg. J. M. GUTOWSKI).
Z Europy Środkowej notowany dotąd z zachodniej części Niemiec oraz
z białoruskiej części Puszczy Białowieskiej. Nowy dla fauny Polski.

Corticaria elongata GYLLENHAL, 1827

- Pobrzeże Bałtyku: Woliński Park Narodowy, 3 VI 1991, 2 exx. (leg.
A. MELKE);
- Pojezierze Mazurskie: Lidzbark Warmiński, 17 IX 1984, 1 ex.
Niezbyt pospolity. Nowy dla Pobrzeża Bałtyku i Pojezierza Mazurskiego.

Corticaria fagi WOLLASTON, 1854

- Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Sycyn Dolny k. Szamotuł, 27 IV 1993, 1 ex.
zwabiony do światła (leg. M. BUNALSKI); Dzierawy k. Koła, 7 V 1994,
czerpakowany z traw późnym popołudniem.
Bardzo rzadki gatunek. Pod nazwą *C. pietschi* (GANGLB.) wykazany dotąd
z kilku zaledwie stanowisk na terenie kraju.

Corticaria ferruginea MARSHAM, 1802

- Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Sycyn Dolny k. Szamotuł, 27 IV 1993, 1 ex.
zwabiony do światła (leg. M. BUNALSKI); Dzierawy k. Koła, 30 IV 1995, 1 ex.
pod przeschniętymi napływkami na piaszczystym brzegu Warty;
- Puszcza Białowieska: oddz. 288 C/318 A, 4 VI 1993, 1 ex.; 6 VI 1995, 1 ex.; 29
VIII 1995, 1 ex.; wszystkie złowione w pułapki Moericke'go w ramach badań
monitoringowych (leg. J. M. GUTOWSKI),

- Beskid Zachodni: Babia Góra, 23 V 1995, 1 ex. (leg. S. SZAFRANIEC).

Bardzo rzadki gatunek, najczęściej łowiony pojedynczo. Z Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej podany ostatnio na początku obecnego stulecia. Nowy dla Puszczy Białowieskiej i Beskidu Zachodniego.

Corticaria fulva COMOLLI, 1837

- Pojezierze Mazurskie: Lidzbark Warmiński, 9 II 1984, 1 ex.;
- Beskid Zachodni: Skawica, 25 V 1984, 1 ex. (leg. D. KUBISZ).

Dość rzadki gatunek. Nowy dla Pojezierza Mazurskiego i Beskidu Zachodniego.

Corticaria impressa OLIVIER, 1790

- Nizina Mazowiecka: Szumin k. Łochowa, 25 VII 1993, 5 exx.; 15 XI 1993, 3 exx.; 12 IV 1995, 3 exx.; 6 VII 1995, 4 exx.;
 - Puszcza Białowieska: Białowieża, 11 VII 1994, 1 ex. (leg. J. M. GUTOWSKI).
- Pospolity gatunek. Nowy dla wymienionych krain.

Corticaria lapponica ZETTERSTEDT, 1838

- Puszcza Białowieska: Białowieski Park Narodowy, oddz. 284 B, 10 IV 1995, 1 ex. (leg. M. OSSOWSKA & L. BUCHHOLZ);
- Góry Świętokrzyskie: Święty Krzyż, 20 V 1983, 1 ex. (leg. J. K. MŁYNARSKI);
- Roztocze: Bukowa Góra k. Zwierzyńca, 13 V 1987, 1 ex. (leg. D. KUBISZ).

Bardzo rzadki gatunek. Niedawno wykazany z Polski z Gór Świętokrzyskich (RÜCKER, BOROWIEC, 1990). Podany też z Puszczy Białowieskiej. Powyższe dane potwierdzają jego występowanie w tych krainach. Nowy dla Roztocza.

Corticaria lateritia MANNERHEIM, 1844

- Nizina Mazowiecka: Szumin k. Łochowa, rez. „Jegiel”, 24 VII 1996, 1 ex. pod korą martwego, stojącego świerka;
- Puszcza Białowieska: oddz. 288 C/318 A, 10 VII 1990, 1 ex. złowiony w pułapkę Moericke'go w ramach badań monitoringowych puszczy (leg. J. M. GUTOWSKI).

Niezwykle rzadki gatunek. Notowany dotąd tylko ze Skandynawii, Niemiec i Węgier. Nowy dla fauny Polski.

Corticaria linearis PAYKULL, 1798

- Pobrzeże Bałtyku: Woliński Park Narodowy, 3 VI 1991, 1 ex. (leg. A. MELKE);
- Nizina Mazowiecka: Szumin k. Łochowa, 14 XI 1993, 1 ex.; 6 VII 1995, 1 ex.; 11 VII 1995, 1 ex.;

- Puszcza Białowiecka: Gródek, 6 V 1993, 1 ex. (leg. A. MELKE).

Gatunek dość pospolity. Według moich obserwacji zasiedla zarówno lasy, jak i tereny otwarte występując w różnych środowiskach naturalnych (ściółka, huby, próchno drzew zarówno liściastych, jak i iglastych) oraz rzadziej w środowiskach synantropijnych (pleśniejąca słoma, pomieszczenia gospodarcze). Nowy dla wyżej wymienionych krain.

Corticaria longicollis ZETTERSTEDT, 1838

- Nizina Mazowiecka: Szumin k. Łochowa, rezerwat „Jegiel”, 16 VII 1989, 1 ex.; 18 IV 1993, 1 ex.; 20 VII 1993, 45 exx.; 24 VII 1993.; 12 VII 1995, 2 exx.;
 - Pieniny: Dolina Dunajca, 27 V 1994, 3 exx. (leg. Sz. CZERWIŃSKI).
- Gatunek pospolity. Nowy dla Niziny Mazowieckiej i Pienin.

Corticaria obscura BRISOUT, 1863

- Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Dzierawy k. Koła, 5-7 X 1993, 8 exx.;
 - Tarnowa k. Turku, 8-10 X 1993, exx.; 25 VI 1994, 4 exx.; 7 IX 1995, 15 exx.
- Rzadki gatunek, spotykany wiosną a częściej późną jesienią. Okazy z mojego zbioru łowiono wyłącznie na dziewannach (*Verbascum* L.).

Corticaria polypori J. SAHLBERG, 1900

- Rostocze: rezerwat „Nart” k. Zwierzyńca, 23 III 1986, 3 exx. zimujące pod korą (leg. D. KUBISZ).
- Bardzo rzadki gatunek. Z Polski wykazany z dwóch krain południowych, od ponad 80 lat nie poławiany. Nowy dla Rostocza.

Corticaria pubescens GYLLENHAL, 1827

- Pojezierze Mazurskie: Lidzbark Warmiński, 20 I 1985.
- Niezbyt pospolity. Nowy dla Pojezierza Mazurskiego.

Corticaria saginata MANNERHEIM, 1844

- Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Tarnowa k. Turku, 24 IV 1994, 2 exx.;
 - Nizina Mazowiecka: Szumin k. Łochowa, 10 VII 1995, 1 ex.; 22 VII 1996, 17 exx.
- Rzadki gatunek. Nowy dla Niziny Mazowieckiej.

Corticaria serrata PAYKULL, 1798

- Pojezierze Mazurskie: Lidzbark Warmiński, 20 VIII 1985, 1 ex.;
 - Nizina Mazowiecka: Szumin k. Łochowa, 12 IV 1995, 6 exx., 6-10 VII 1995, 14 exx.; 22 VII 1996, 2 exx.
- Jeden z najpospolitszych gatunków rodzaju, ale z wymienionych krain dotąd nie notowany.

Corticaria umbilicata BECK, 1817

- Pojezierze Mazurskie: Lidzbark Warmiński, 16 X 1985, 1 ex.; 9 XII 1985, 1 ex.;
- Nizina Mazowiecka: Szumin k. Łochowa, 22 VII 1992, 2 exx.; 6–10 VII 1995, 2 exx.

Gatunek niezbyt pospolity. Nowy dla Pojezierza Mazurskiego i Niziny Mazowieckiej.

Corticaria lambiana SHARP, 1910

- Nizina Mazowiecka: Szumin k. Łochowa, rezerwat „Jegiel”, 25 VII 1993, 3 exx.;
- Puszcza Białowieska: oddz. 399C, 19 IV 1991, 1 ex.; oddz. 288C/318A, 21 V 1993, 1 ex.; 4 VI 1993, 2 exx.; 15 V 1991, 2 exx.; 27 IX 1994, 1 ex.; 25 IV 1995, 1 ex.; oddz. 521D/B, 7 V 1993, 6 exx.; oddz. 424A, 4 VI 1993, 4 exx.; 21 V 1993, 2 exx.; oddz. 779A, 18 VIII 1992, 1 ex.; 1 IX 1992, 1 ex.; wszystkie okazy złowione zostały w pułapki Moericke’go w ramach badań monitoringowych Puszczy (leg. J. M. GUTOWSKI).

Rzadki gatunek borealnogórski. Bardzo podobny do następnego gatunku. Pewne oznaczenie możliwe jest tylko na podstawie budowy aparatu kopulacyjnego samca (ryc. 1). Z Polski podany przez LUCHTA (1987) bez podania konkretnej lokalizacji.

Corticaria obfuscata STRAND, 1937

- Puszcza Białowieska: oddz. 424A, 7 V 1993, 9 exx.; 25 IV 1995, 1 ex.; oddz. 779A, 12 X 1993, 2 exx., wszystkie złowione w pułapki Moericke’go (leg. J. M. GUTOWSKI).

Gatunek notowany z Niemiec, Austrii, Słowacji, południowej Szwecji i Białorusi. Aparat kopulacyjny samca jak na ryc. 2. W suplemencie do dzieła „Die Käfer Mitteleuropas” (LUCHT, LOHSE, 1992) podany z Polski bez konkretnej lokalizacji.


Corticarina similata GYLLENHAL, 1827

- Nizina Mazowiecka: Szumin k. Łochowa, 8 IV 1991, 1 ex.; 12 IV 1995, 2 exx.;
- Pieniny: Dolina Dunajca, 27 V 1994, 1 ex. (leg. Sz. CZERWIŃSKI).

Gatunek niezbyt pospolity. Nowy dla Niziny Mazowieckiej i Pienin.

Corticarina truncatella MANNERHEIM, 1844

- Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Koło, 2 XI 1983, 1 ex.; 21 IV 1992, 4 exx.; 17–20 I 1993, 1 ex.; 9 V 1993, 1 ex.; Dzierawy k. Koła, 1 VII 1994, 1 ex.; 2 V 1995, 1 ex.; 27 V 1995, 1 ex.; Dąbrowice k. Koła, 6 V 1995, 1 ex.; Skobielice k. Koła, 40 exx.; Odrapanki k. Kalisza, 4 IV 1992, 7 exx. (leg. A. MELKE);



Ryc. 1-2. Aparat kopulacyjny samca: 1 – *Corticarina lambiana* SHARP, 2 – *Corticarina obfuscata* STRAND.

Fig. 1-2. Male genitalia: 1 – *Corticarina lambiana* SHARP, 2 – *Corticarina obfuscata* STRAND.

– Nizina Mazowiecka: Szumin k. Łochowa, 21 VII 1993, 1 ex.; 18 IV 1994, 2 exx.; 7-10 VII 1995, 7 exx.

Chrząszcz niezbyt rzadki. W charakterystycznych dla siebie biotopach występuje dość często, czasem w dużej liczbie okazów. Nowy dla Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej i Niziny Mazowieckiej.

Melanophtalma curticolis MANNERHEIM, 1844

– Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Dzierawy k. Koła, 13 V 1994, 1 ex.;

– Podlasie: Białystok, 23 IV 1993, 1 ex. (leg. et coll. A. LASOŃ).

Gatunek niedawno wykazany z Polski (BOROWIEC i in., 1992) z Puszczy Białowieskiej. Notowany też z Niziny Mazowieckiej. Nowy dla Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej i Podlasia.

Melanophtalma maura MOTSCHULSKY, 1866

– Nizina Mazowiecka: Szumin k. Łochowa, 1 VII 1995, 6 exx., 4 VII 1995, 1 ex., 14 VII 1995, 1 ex.;

- Puszcza Białowieska: oddz. 539C, 5 V 1994, 1 ex., 21 V 1994, 1 ex., 24 V 1994, 4 exx. (leg. J. M. GUTOWSKI); Białowieża, 13 VI 1994, 1 ex. (leg. et coll. A. LASOŃ).

Niedawno wykazany z Polski z Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej (MAJEWSKI, 1994). Poza tym podawany z Dolnego Śląska. Nowy dla Niziny Mazowieckiej i Puszczy Białowieskiej.

Melanophtalma suturalis MANNERHEIM, 1844

- Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Lubstów k. Konina, 3 VI 1996, 2 exx. czerpakowane z kęp turzyc (*Carex* sp.) na brzegu jeziora.

Niedawno wykazany z Polski z Dolnego Śląska. Nowy dla Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej.

PIŚMIENNICTWO

- BOROWIEC L., 1991: Nowe i rzadkie dla Polski gatunki chrząszczy (*Coleoptera*). Wiad. entomol., 10: 197–205.
- BOROWIEC L., KANIA J., WANAT M., 1992: Chrząszcze (*Coleoptera*) nowe dla Puszczy Białowieskiej. Wiad. entomol., 11: 133–141.
- BOROWIEC L., KANIA J., 1994: Uwagi o niektórych krajowych gatunkach chrząszczy (*Coleoptera*). Wiad. entomol., 13: 217–225.
- MAJEWSKI T., 1994: Nowe i rzadkie chrząszcze z rodzaju *Melanophtalma* MOTSCHULSKY (*Coleoptera*, *Lathridiidae*). Wiad. entomol., 13: 64
- LOHSE G. A., LUCHT W. H., 1992: Die Käfer Mitteleuropas. 2 Supplementband mit Katalogteil: 139–160.
- LUCHT W. H., 1987: Die Käfer Mitteleuropas. Katalog. 12: 192–194.
- RÜCKER W. H., BOROWIEC L., 1990: Nowe i rzadkie w Polsce *Lathridiidae* (*Coleoptera*). Wiad. entomol., 9: 65–69.