

Wiad. entomol.	16 (3-4): 163-164	Poznań (1997) 1998
----------------	-------------------	--------------------

*Mogulones curvistriatus* (SCHULTZE, 1897), nowy dla fauny Polski  
gatunek ryjkowca (*Coleoptera: Curculionidae*)

*Mogulones curvistriatus* (SCHULTZE, 1897), a new weevil in the fauna of  
Poland (*Coleoptera: Curculionidae*)

BOGUSŁAW PETRYSZAK<sup>1</sup>, JAN FREMUTH<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Zakład Zoologii Systematycznej i Zoogeografii Uniwersytetu Jagiellońskiego,  
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków, Polska

<sup>2</sup>ul. Emy Destinove 968, 500 09 Hradec Kralove, Republika Czeska

ABSTRACT: *Mogulones curvistriatus* (SCHULTZE, 1897) is recorded from Góry Słonne, southern Poland. This is the first record of the species from Poland.

KEY WORDS: *Coleoptera, Curculionidae, Mogulones curvistriatus*, new record, S Poland.

Prowadzone od 30 lat intensywne badania w naszych Karpatach przyczyniły się nie tylko do szczegółowego poznania rozmieszczenia ryjkowców znanych już wcześniej z tego łańcucha górskiego, ale także do stwierdzenia nowych dla nauki lub Polski gatunków (PETRYSZAK, 1979, 1984).

W trakcie prac terenowych w Górach Słonnych stwierdzono w okolicach Zwierzynia koło Leska (UTM: EU97) *Mogulones curvistriatus*, 29 V 1996, 1 ok., ♀, (leg., det. J. FREMUTH).

Gatunek ten zasiedla wschodnią część środkowej i południowej Europy. Wykazany z Włoch (Liguria, Veneto), Austrii (Niederösterreich, Burgenland, Steiermark), Niemiec (Bayern), Słowacji (Košice), Węgier (Budapest), Rumunii (Craiova) i Bośni. Najczęściej spotykany jest on na częściowo ocienionych wilgotnych łąkach lub w brzeźnych partiach lasów i zarośli

krzewiastych w górach oraz na terenach podgórskich (SMERCZYŃSKI, 1974). Rośliną żywicielską omawianego gatunku jest *Symphytum tuberosum* L. Zbierany bywa w okresie od początków kwietnia do końca czerwca.

Stanowisko w okolicach Zwierzynia leży w dolinie Sanu, a stanowi je wilgotna nadrzeczna łąka granicząca z lasami grądowymi na wysokości około 350 m n.p.m.

### PIŚMIENNICTWO

- PETRYSZAK B., 1979. *Miarus abnormis* SOLARI 1947, nowy dla fauny Polski ryjkowiec (*Coleoptera, Curculionidae*). Pol. Pismo ent. **49**: 663-666.
- PETRYSZAK B., 1984. *Dorytomus carpathicus* sp.n. aus Polen (*Coleoptera, Curculionidae*). Reichenbachia, Dresden, **22**, 147-150.
- SMERCZYŃSKI S., 1974. Ryjkowce – *Curculionidae*. Podrodzina *Curculionidae*. Klucze do oznaczania Owadów Polski, XIX, **98e**, Warszawa: 1-180.