

221. *Cis vestitus* MELLIÉ, 1849 (*Coleoptera: Ciidae*), nowy dla fauny Polski

*Cis vestitus* MELLIÉ, 1849 (*Coleoptera: Ciidae*), new to the Polish fauna

KEY WORDS: *Coleoptera, Ciidae, Cis vestitus*, new record, S Poland.

*Cis vestitus* MELLIÉ to bardzo rzadki gatunek, notowany głównie z Europy południowej i południowych części Europy środkowej, zwykle nie odróżniany od *C. festivus* (PANZ.). Z Polski nie był do tej pory notowany w sposób pewny, a ogólnikowe dane HORIONA (1961) opierały się na nieudokumentowanych doniesieniach z szeroko pojętego Śląska. Omawiany gatunek różni się od *C. festivus* przede wszystkim mocną mikrorzeźbą przedplecza powodującą, że jego powierzchnia jest wyraźnie bardziej matowa od powierzchni pokryw (u *C. festivus* mikrorzeźba jest zatarta, a przedplecze i pokrywy lekko błyszczące) i bardzo krótkimi, trudno zauważalnymi szczecinkami na przednim brzegu przedplecza (u *C. festivus* te szczecinki są wyraźne). W pełni wybarwione okazy *C. vestitus* są ciemnobrunatne, natomiast *C. festivus* czerwobrunatne.

*C. vestitus* odkryty został jak dotąd na jednym stanowisku:

– Beskid Wschodni: Zyndranowa ad Dukła (EV57), 26 VII 1998, 2 ex., leg. L. BOROWIEC.

Wymagania biologiczne *C. vestitus* są mało znane, w Zyndranowej był łowiony na pryzmie drewna bukowego i brzoźowego.

Lech BOROWIEC, Wrocław

222. Stonkowate (*Coleoptera: Chrysomelidae*) nowe dla Wyżyny Lubelskiej i Niziny Sandomierskiej

*Chrysomelidae* (*Coleoptera*) new to the Lublin Upland and Sandomierz Lowland

KEY WORDS: *Coleoptera, Chrysomelidae*, records, SE Poland.

Doniesienie to jest uzupełnieniem stanu poznania *Chrysomelidae* południowo-wschodniej Polski. Część wymienionych gatunków jest szeroko rozsiedlona w kraju, jednak dotychczas nie zostały one podane z Wyżyny Lubelskiej i Niziny Sandomierskiej. Związane jest to z wyjątkowo słabym poznaniem rozsiedlenia stonkowatych tych regionów.

*Donacia cinerea* HERBST, 1784

– Nizina Sandomierska: Dębowiec (EB81), 29 IV 1998, 1 ex., leg. P. BUCZYŃSKI.

Gatunek występujący na obszarze całej Polski. Zebrany został na torfowisku przejściowym w zbiorowisku szuwarowym, na pałce szerokolistnej – *Typha latifolia* L.

*Donacia vulgaris* ZSCHACH, 1788

– Nizina Sandomierska: Dębowiec (EB81), 29 IV 1998, 1 ex., leg. P. BUCZYŃSKI.

Zebrany na torfowisku przejściowym w zbiorowisku szuwarowym na pałce szerokolistnej – *Typha latifolia* L. Z Polski podany z wielu krain, jednak spotykany jest nieczęsto i w małej liczbie okazów.