

Wiad. entomol.	18 (2)	Poznań 1999
----------------	--------	-------------

KRÓTKIE DONIESIENIA

SHORT COMMUNICATIONS

233. Ciekawsze chrząszcze (*Coleoptera*) odłowione w rezerwacie dębowym „Zimna Woda” w Rogowie

Interesting beetles (*Coleoptera*) caught in the „Zimna Woda” oak reserve in Rogów (Central Poland)

KEY WORDS: *Coleoptera*, *Scarabaeidae*, *Elateridae*, *Dermestidae*, *Melyridae*, *Nitidulidae*, *Cucujidae*, *Coccinellidae*, *Oedemeridae*, *Cerambycidae*, *Anthribidae*, *Rhinomaceridae*, *Curculionidae*, records, nature reserve „Zimna Woda”, Central Poland.

Częściowy rezerwat dębowy „Zimna Woda” znajduje się na terenie Nadleśnictwa Rogów (UTM: DC24), położonego w obrębie Wysoczyzny Łódzko-Rawskiej. Odłowy prowadzono od wczesnej wiosny do późnej jesieni 1997. Chrząszcze odławiano za pomocą żółtych misek z płynem konserwującym, zawieszonych w trzech warstwach wysokościowych (1 – podszyt, 2 – dolna partia koron drzew, 3 – górna partia koron drzew), w lesie z ponad 200-letnim drzewostanem dębowym. Wszystkie chrząszcze odłowili C. KIESZEK, a oznaczył J. BOROWSKI.

Scarabaeidae

Aphodius zenkeri GERM.: 16 VIII 1997, 1 ex., warstwa 1.

Elateridae

Calambus bipustulatus (L.): V – VI 1997, 11 exx., 6 VI 97, 1 ex. a. *semiflavus* FLEISCH., wszystkie w warstwie 3.

Dermestidae

Ctesias serra (F.): 21 VI 1997, 1 ex., warstwa 2.

Melyridae

Aplocnemus tarsalis (C. R. SAHLB.): 21 VI 1997, 1 ex., warstwa 3;

Dasytes caeruleus (DE GEER): 9 V 1997, 1 ex., warstwa 3.

Nitidulidae

Cryptarcha undata (OLIV.): 1 VIII 1997, 1 ex., warstwa 3;

Cryptarcha strigata (F.): 24 X 1997, 1 ex., warstwa 3.

Cucujidae

Laemophloeus kraussi GANGLB.: 18 VII 1997, 1 ex., warstwa 3.

Coccinellidae

Scymnus bipunctatus KUG.: 9 V 1997, 1 ex., warstwa 2;

Synharmonia impustulata (L.): 23 V – 18 VII 1997, 28 exx., warstwa 2 i 3.

Oedemeridae

Ischnomera cinerascens (PAND.): 9 – 23 V 1997, 8 exx., warstwa 2 i 3.

Cerambycidae

Grammoptera abdominalis (STEPH.): 23 V – 21 VI 1997, 12 exx., warstwa 2 i 3;

Mesosa nebulosa (F.): 21 VI 1997, 4 VI 1997, 2 exx., warstwa 3.

Anthribidae

Enedreytes sepicola (F.): 21 VI 1997, 4 VII 1997, 2 exx., warstwa 1 i 3;

Dissoleucas niveirostris (F.): 9 V 1997, 21 VI 1997, 2 exx., warstwa 1.

Rhinomaceridae

Doydirhynchus austriacus (OLIV.): 9 V 1997, 1 ex., warstwa 3.

Curculionidae

Magdalis exarata (H. BRIS.): 21 VI 1997, 4 VII 1997, 2 exx., warstwa 3.

Okazy dowodowe znajdują się w kolekcji Katedry Ochrony Lasu i Ekologii, w Rogowie.

Jerzy BOROWSKI, Warszawa

Cezary KIESZEK, Warszawa

234. Nowe stanowisko *Eupithecia extremata* (FABRICIUS, 1787) (*Lepidoptera: Geometridae*) w Polsce

New record of *Eupithecia extremata* (FABRICIUS, 1787) (*Lepidoptera: Geometridae*) from Poland

KEY WORDS: *Lepidoptera*, *Geometridae*, *Eupithecia extremata*, new record, E Poland.

J. ROMANISZYN i F. SCHILLE w swoim dziele „Fauna motyli Polski” (1929) wymieniają *Eupithecia extremata* (FABR.) z dwóch stanowisk w Polsce: Andrzejów pod Łodzią, 19 VI 1909, oraz Zbuczyn na Podlasiu, 16 V 1921. Brak było jakichkolwiek wzmianek o pojawie tego gatunku w naszym kraju po roku 1929.

Prowadzone od kilku lat badania składu lepidopterofauny ujawniły występowanie *Eupithecia extremata* na stanowisku:

– Woźniki ad Łosice (UTM – FC28), 16 V 1996, 2 exx. złowione na światło, leg. D. WASILUK.

Gatunek znany jest z Zakaukazia, Bliskiego Wschodu, Europy zachodniej i południowej oraz południowej części Europy środkowej. Spotykany jest bardzo lokalnie i rzadko na stanowiskach kserotermicznych.

Na południu Europy i na cieplejszych stanowiskach w Europie środkowej, motyl występuje w dwóch generacjach, to jest w IV – V i ponownie w VIII. Na innych terenach występuje tylko jedno pokolenie. Gąsienice żerują na *Anthemis* spp.

Odkryte w Polsce stanowisko, znacznie oddalone jest od dotychczas znanych rejonów występowania *E. extremata* w Europie.

Andrzej KOKOT, Wrocław

Dariusz WASILUK, Woźniki