

Wiad. entomol.	16 (3-4)	Poznań (1997) 1998
----------------	----------	--------------------

KRÓTKIE DONIESIENIA

SHORT COMMUNICATIONS

195. Kusakowate (*Coleoptera: Staphylinidae*) nowe dla Wyżyny Lubelskiej

Staphylinids (*Coleoptera: Staphylinidae*) new to the fauna of the Lubelska Upland

KEY WORDS: *Coleoptera, Staphylinidae*, records, Lubelska Upland, E Poland.

Niniejsza notatka jest kolejnym przyczynkiem dotyczącym *Staphylinidae* Wyżyny Lubelskiej. Podane poniżej stanowiska kusakowatych są zlokalizowane na terenach objętych ochroną: w Kazimierskim Parku Krajobrazowym (UTM: EB..) i Nadwieprzańskim Parku Krajobrazowym (UTM: FB..). Wszystkie okazy dowodowe znajdują się w kolekcji autora.

Syntomium aeneum (P. W. J. MÜLLER, 1821)

- Parchatka (EB68), 30 IV 1997, 1 ex.;
- Stary Stok (EB78), 3 VI 1997, 1 ex.;
- Rogów (EB67), 3 VI 1997, 2 exx., łowione na stromych skarpach, w warstwie powierzchniowej wilgotnego lessu.

Coprophilus striatulus (FABRICIUS, 1792)

- Kazimierz Dolny (EB68), 3 VI 1997, 1 ex., pod kamieniem w wilgotnym grądzie.

Carpelimus dilatatus (ERICHSON, 1839)

- Parchatka (EB68), 3 VI 1997, 1 ex., brzeg starorzecza Wisły.

Stenus longipes HEER, 1839

- Kol. Jaszczów (FB37), 25 VI 1997, 1 ex., 26 VIII 1997, 7 exx., łowione na stromych skarpach Wieprza razem ze *S. stigmula* ER. i *S. boops* LJ.

Stenus fossulatus ERICHSON, 1840

- Parchatka (EB68), 30 IV 1997, 5 exx., 3 VI 1997, 10 exx.;
- Zagórzyńskie (EB88), 24 VII 1997, 1 ex.;

- Kazimierz Dolny (EB68), 2 exx.; ponadto liczne osobniki tego gatunku obserwowano od kwietnia do sierpnia na stromych i wilgotnych skarpach lessowych, prawie pozbawionych roślinności.

Scopaeus pusillus KIESENWETTER, 1843

- Wąwolnica (EB88), 24 VII 1997, 1 ex. (samiec), złowiony na nasłonecznionej i wilgotnej skarpie lessowej.

W Polsce jest gatunkiem bardzo rzadko łowionym, znanym z kilku krain.

Neobisnius villosulus (STEPHENS, 1833)

- Rzeczyca (EB78), 22 VII 1997, 1ex., na lessowej, nadbrzeżnej skarpie czystego potoku.

Gabrius astutus (ERICHSON, 1840)

- Kazimierz Dolny (EB68), 24 VII 1997, 1 ex., wysiany ze ściółki grądu na zboczu wąwozu w pobliżu strumyka.

W Polsce gatunek rzadko łowiony, znany z kilku stanowisk, głównie w górskich i podgórskich krainach.

Quedius humeralis STEPHENS, 1832

- Kazimierz Dolny (EB68), 3 VI 1997, 3 exx., 24 VII 1997, 9 exx., 4 poczwarki, 19 VIII 1997, 2 exx. wysiane ze ściółki grądu na zboczu wąwozu w pobliżu strumyka.

Quedius fumatus (STEPHENS, 1833)

- Kazimierz Dolny (EB68), 24 VII 1997, 2 exx., 10 poczwerek, wysiane ze ściółki grądu na zboczach wąwozu w pobliżu strumyka.

W Polsce jest uważany za gatunek rzadko spotykany. Wykazany tylko z kilku stanowisk.

Gyrophana williamsi STRAND, 1935

- Wólka Łańcuchowska (FB37), 21 VII 1997, 1 ex. (samiec), złowiony w łęgu na owoniku grzyba.

Z Polski gatunek wykazany w 1995 roku, dotychczas znany tylko z dwu stanowisk na Podlasiu.

Gyrophana lucidula ERICHSON, 1837

- Kolonia Jaszczów (FB37), 19 V 1997, 2 exx., na owoniku *Polyporus squamosus* (HUDS.) FR. rosnącym na wierzbie;
- Zakrzów (FB38), 18 VII 1997, 1 ex. na grzybie w łęgu.

Gyrophana angusta (STEPHENS, 1832)

- Łańcuchów (FB37), 16 V 1997, 4 exx., na hubie z rodzaju *Fomes* FR.

Gyrophana strictula ERICHSON, 1839

- Wólka Łańcuchowska (FB37), 30 V 1997, 3 exx., na owoniku maślanki (*Hypholoma* sp.) w lesie łęgowym.

Ischnopoda constricta (ERICHSON, 1837)

- Rzeczyca (EB78), 22 VII 1997, 2exx., na lessowej, nadbrzeżnej skarpie czystego potoku.

Bernard STANIEC, Lublin