

79. Nowe stanowiska *Phalacrus brisouti* RYE i *Ph. dieckmanni* VOGT (*Coleoptera*, *Phalacridae*)

New records of *Phalacrus brisouti* RYE and *Ph. dieckmanni* VOGT (*Coleoptera*, *Phalacridae*)

*Phalacrus brisouti* RYE, 1872

- Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Żary, V 1992, 1 ex., leg. J. KANIA.
- Dolny Śląsk: Wrocław-Wojnów, 18 IV 1993, 1 ex.; Prawików, 1 V 1993, 4 exx, 19 V 1993, 1 ex.; Grodzanów, 1 V 1993, ok. 100 exx., wszystkie leg. L. BOROWIEC.

Gatunek atlantycki, niedawno wykazany po raz pierwszy z Polski na podstawie okazu łowionego we Wrocławiu-Rędzinie. Wystąpienie w roku 1993 licznych okazów na kilku stanowiskach w dolinie Odry świadczy być może o okresowej ekspansji tego gatunku. Jest on bardzo charakterystyczny i trudny do przeoczenia w terenie, a w latach poprzednich nie był na tym obszarze poławiany.

*Phalacrus dieckmanni* VOGT, 1967

- Wyżyna Małopolska: Bogucice, 20 V 1992, 3 exx.; Pasturka k. Pińczowa, 21–22 V 1992, 1 ex., wszystkie leg. L. BOROWIEC.

Niedawno opisany gatunek o niejasnym rozmieszczeniu geograficznym. Z Polski wykazany z Tarnogóry na Wyżynie Lubelskiej, oraz ogólnikowo z Pobrzeża Bałtyku. Wykazuje upodobanie do środowisk kserotermicznych.

LECH BOROWIEC, Wrocław

80. Nowe stanowisko *Cis fissicornis* MELLIÉ, 1849 (*Coleoptera*, *Ciidae*) w Polsce

A new record of *Cis fissicornis* MELLIÉ, 1849 (*Coleoptera*, *Ciidae*) from Poland

*Cis fissicornis* MELL. znany jest z nielicznych stanowisk we wschodniej części Europy. Poza Polską notowany był z Białorusi, Czech, Słowacji, Karpat ukraińskich, Austrii, Węgier i Rumunii. Wszędzie gatunek ten występuje lokalnie i jest sporadycznie poławiany. W Polsce należy do wielkich rzadkości – znany dotychczas z okolic Przemyśla oraz z Dolnego Śląska (BOROWIEC, 1990: Wiad. Entomol., 9, 3–4: 91–92). Wymagania środowiskowe omawianego gatunku są słabo poznane. Poławiany bywa na suchych gałęziach porośniętych hubami („Katalog fauny Polski” cz. XXIII, t. 14, 1987). Ostatnio stwierdzono występowanie tego gatunku w Beskidzie Zachodnim:

- Babia Góra, UTM – CV99, 16 VI 1993, 1 ex. leg. S. SZAFRANIEC (det. D. KUBISZ): odłowiony do pułapki feromonowej typu segmentowego, wyłożonej do odłowu drwalnika paskowanego (*Trypodendron lineatum* (OLIV.)). Pułapka była zlokalizowana na północnym stoku Babiej Góry, w oddziale 148c (800 m.n.p.m.), blisko składnicy „Średni Bór”. W najbliższym sąsiedztwie rosną młodniki bukowo-świerkowo-jodłowe na siedlisku Lasu Górskiego.

Okaz dowodowy znajduje się w zbiorach entomologicznych Babiogórskiego Parku Narodowego.

STANISŁAW SZAFRANIEC, Zawoja