

### 32. Nowe stanowiska kilku rzadkich ryjkowców (*Coleoptera*, *Curculionidae*) w Polsce

New localities of some rare weevils (*Coleoptera*, *Curculionidae*) in Poland

*Bagous aliciae* CMOLUCH, 1983

– Roztocze: Kąty II k. Zamościa, Wieprzecka Góra (UTM – FB41), 20 VI 1990, 1 ex.

Niedawno opisany gatunek jest dotychczas znany tylko z trzech okazów zebranych w Opoce Dużej koło Annapola. Roślina żywicielska *B. aliciae* nie jest do tej pory znana. Złowienie tego gatunku na Wieprzeckiej Górze potwierdza jego nietypowe dla rodzaju *Bagous* przywiązanie do środowiska muraw kserotermicznych.

*Smicronyx smreczynskii* F. SOLARI, 1952

– Śląsk Dolny: Wrocław Sępólno (XS46), 9 V 1990, 1 ex.

Do tej pory podany z Żagania, Legnicy, Nysy, Ojcowa, Spały n. Pilicą, Kątów k. Zamościa oraz okolic Cieszyna, Warszawy i Przemysła.

*Smicronyx reichi* (GYLLENHAL, 1836)

– Śląsk Dolny: Kamieniec Wrocławski (XS 55), 11 VI 1989, 1 ex.

Dotychczas wykazany z Wyżyny Lubelskiej, okolic Przemysła, Bieszczadów, zachodnich Karpat, Wyżyny Krakowskiej, oraz Gór Pieprzowych koło Sandomierza. Nowy dla Dolnego Śląska

*Celiodes nigratarsis* HARTMANN, 1892

– Wyżyna Małopolska: Skowronno k. Pińczowa (DA96), 1 V 1990, 1 ex.

W Polsce na Śląsku oraz w okolicach Zielonej Góry i Krakowa. Nowy dla Wyżyny Małopolskiej.

*Ceutorhynchus pilosellus* GYLLENHAL, 1987

– Roztocze: Krasnobród k. Zamościa (FB 50), 18–19 VI 1990, 2 exx.

Znany tylko z kilku miejsc w Polsce – Białej Góry k. Miechowa, rezerwatu „Prześlin” w Chotlu Czerwonym k. Buska, oraz okolic Chełma Lubelskiego. Nowy dla Roztocza.

JERZY SZYPULA, Wrocław

### 33. Nowe stanowisko *Axinopalpis gracilis* (KRYNICKI, 1832) (*Coleoptera*, *Cerambycidae*) w Polsce

A new locality of *Axinopalpis gracilis* (KRYNICKI, 1832) (*Coleoptera*, *Cerambycidae*) in Poland

Centrum rozszedlenia *Axinopalpis gracilis* (KRYNICKI) to południowo-wschodnia Europa, skąd dociera do południowo-wschodnich obszarów Europy Środkowej. W Polsce wykazywany był z pojedynczych stanowisk w czterech krainach, głównie na podstawie znalezisk z pierwszej połowy XX wieku. Występowanie tego gatunku stwierdzono na nowym stanowisku:

– Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Ruda Milicka ad Milicz (UTM – XT61), 11 VII 1985, 1 ex., na światło lampy rtęciowej, leg. J. HOPEJ.

Okaz znajduje się w kolekcji autora (ex coll. J. KANIA).

ROMAN KRÓLIK, Kluczbork