

Nathrius brevipennis (Muls.) Bosq. nowy gatunek
chrząszcza (*Coleoptera, Cerambycidae*)
dla fauny Polski

Nathrius brevipennis (Muls.) Bosq. a new species of beetle
(*Coleoptera, Cerambycidae*) for fauna Poland

napisał

ZYGMUNT ŚLIWIŃSKI

Od J. Czarnckiego otrzymałem jeden okaz chrząszcza z rodziny *Cerambycidae* znaleziony przez niego w Łodzi 28 V 1949 r. w mieszkaniu na szybie okiennej. Oznaczyłem go wówczas jako *Nathrius brevipennis* (Muls.) Bosq., co później potwierdził także S. Kapuściński. Dwa dalsze okazy wyhodowane zostały przeze mnie z larw żerujących w części obręczy wierzbowej, znalezionej w październiku 1956 r. w pobliżu fabryki przetworów owocowych w Piotrkowie Trybunalskim. Obręcz ta pokryta była korą, spod której wysypywały się trociny. Pierwszy okaz *N. brevipennis* (Muls.) Bosq. wyszedł z poczwarki 27 V, drugi zaś 7 VII 1957 r. Hodowla prowadzona była w nie ogrzewanym mieszkaniu. Z tej samej części obręczy wierzbowej wyhodowany został również jeden okaz *Gracilia minuta* (L.), chrząszcza z rodziny *Cerambycidae*.

Według Heyrovsky'ego [1], *N. brevipennis* (Muls.) Bosq. często występuje razem z *Gracilia minuta* (L.) w wierzbach i wyrobach wiklinowych.

Nathrius brevipennis (Muls.) Bosq. nie był dotychczas wykazany z Polski. Karpiński [3] podaje go jako gatunek

występujący w państwach ościennych i przypuszcza, że występowanie jego w Polsce jest mało prawdopodobne.

Omawiany gatunek rozprzestrzeniony jest w Europie południowej i środkowej, na Kaukazie, Zakaukaziu, w Iranie, Afryce północnej i Chinach, lecz z wyrobami koszykarskimi zawleczony został także do Kalifornii, Chile, Argentyny i Urugwaju.

W krajach sąsiadujących z Polską występuje w Niemczech, gdzie według H o r i o n a [2] znaleziony został w Brandenburgii, w rejonie środkowej Elby, Turyngii, Holsztynie, Nadrenii, Hesji, Badenii, Wirtembergii i Frankonii. Znany jest również z Czech, Moraw i Słowacji [1]. W ZSSR według P ł a w i l s z c z i k o w a [6] rozprzestrzeniony jest na Zakaukaziu, wybrzeżu Morza Czarnego, na Kaukazie i Krymie, a także w południowej części strefy stepów, skąd na wschód dochodzi do Czkałowska i Uralska.

Nathrius brevipennis (Muls.) Bosq. jest gatunkiem polifagicznym. Larwy jego żerują w suchych, pokrytych korą gałęziach wierzby, leszczyny, figowca, cyprysu, sosny itp. Według Z a c h e r a [7], P i c a r d a [5] i L e p e s m e ' a [4] wyraża on szkody w przedmiotach wyrabianych z wikliny.

Z Instytutu Zoologicznego
Polskiej Akademii Nauk
Oddział w Łodzi

SUMMARY

In this paper the author represents *Nathrius brevipennis* (Muls.) Bosq. from the family *Cerambycidae* as a new species for the polish fauna. This species has been discovered in Łódź and Piotrków Trybunalski.

PIŚMIENNICTWO — LITERATURE

- [1] H e y r o v s k y, L., Tesaříkoviti — *Cerambycidae*, Fauna ČSR. Praha, 5, 1955.
- [2] H o r i o n, A., Verzeichnis der Käfer Mitteleuropas (Deutschland, Österreich, Tschechoslovakei) mit kurzen faunistischen Angaben, Stuttgart 1951.

- [3] Karpinski, J. J., Kózki (*Cerambycidae*) Puszczy Białowieskiej, Warszawa 1949.
- [4] Lepesme, P., Les Coléoptères des denrées alimentaires et des produits industriels entreposés, Encyclopédie Entomologique, Série A, 22, Paris 1944.
- [5] Picard, F., Coléoptères — *Cerambycidae*, Faune de France, 20, Paris 1929.
- [6] Pławilszczikow, N. N., Żuki — drowoseki, 2, Fauna SSSR, Nasiekomyje żestkokrylyje, 22, Moskwa — Leningrad 1940.
- [7] Zacher, F., Vorrats, — Speicher und Materialschädlinge und ihre Bekämpfung, Berlin 1927.