

WYKAZ CHRZĄSZCZÓW OKOLIC PRZEMYŚLA

[VERZEICHNIS DER KÄFER DER UMGEBUNG VON PRZEMYSŁ]

CLAVICORNIA

PODAŁ
T. TRELLA.

BYTURIDAE.

- Byturus fumatus* Fbr.
 # *B. f. a. bicolor* Reitt.
B. tomentosus Fbr.
B. t. a. flavescens Mrsh. (w Wyk. Sil.).

OSTOMIDAE.

- Nemosoma elongatum* L. III, V. Brylińce, Turnica.
Tenebrioides mauritanicus L.
Ostoma grossum L. Brylińce, Turnica.
O. ferrugineum L.
O. oblongum L.
Thymalus limbatus Fbr. Brylińce, Turnica.

SPHAERITIDAE.

- Sphaerites glabratus* Fbr. V — VII. Turnica.

NITIDULIDAE¹⁾.

- Cateretes pedicularius* L.
 # *C. p. a. pallens* Rey.
Heterhelus scutellaris Heer.
H. solani Heer.
Brachypterus glaber Steph.
B. urticae Fbr.
B. fulvipes Er.
Ipidia 4-maculata Quens. Brylińce, Turnica.
Soronia punctatissima Ill. VI, VII, VIII, Pikułice, Brylińce.
S. grisea L.
Epuraea 10-guttata Fbr.

¹⁾ Bez rodzaju *Meligethes* Steph.

- E. silacea* Hrbst. VII, VIII. Mazury.
E. depressa Gyll.
E. d. a. bisignata Strm.
E. melina Er.
E. deleta Er.
E. terminalis Mannh.
E. nana Reitt.
E. neglecta Heer.
 # *E. n. a. convergens* Reitt.
E. rufomarginata Steph.
E. variegata Hrbst.
 + *E. v. a. monochroa* Reitt. (w Wyk. Sil.).
 # *E. v. a. variabilis* Reitt.
E. obsoleta Fbr.
E. longula Er.
 + *E. l. a. ornata* Reitt. (w Wyk. Sil.).
 + *E. l. a. erichsoni* Reitt. (w Wyk. Sil.).
E. pygmaea Gyll.
E. pusilla Ill.
E. florea Er.
Micrurula melanoccephala Mrsh.
Omosiphora limbata Ol.
O. l. v. skalitzkyi Reitt. (w Wyk. Sil., Bor. or.).
Omosita depressa L.
O. colon L.
O. discoidea Fbr.
 # *O. d. a. cincta* Heer.
Nitidula bipunctata L.
N. rufipes L.
N. carnaria Schall.
Pria dulcamarae Scop.
Thalycra fervida Ol. V — VIII. Budy Mł. i Wk., Brylińce.
Pocadius ferrugineus Fbr.
Cychramus 4-punctatus Hrbst. VII, VIII. Brylińce, Turnica.
C. luteus Fbr.
C. l. v. fungicola Heer. Brylińce, Turnica.
Cylloides ater Hrbst. VI, VII. Brylińce, Turnica.
Cryptaracha strigata Fbr.
C. imperialis Fbr.

- Glischrochilus olivieri* Bed.
 # *G. o. v. puncticollis* nov.¹⁾.
G. 4-guttatus Ol.
G. 4-g. v. 10-guttatus Ol.
G. 4-pustulatus L.
 # *G. 4-p. a. turnicus* nov.²⁾.
Pityophagus ferrugineus L.
Rhizophagus depresso Fbr.
 # *R. d. a. umbratus* nov.³⁾.
R. parallelocollis Gyll.
R. nitidulus Fbr.
R. dispar Payk.
R. d. a. gyllenhali Thoms.
R. bipustulatus Fbr.
R. parvulus Payk.
R. cibratus Gyll.

CUCUJIDAE.

- Monotoma 4-foveolata* Aub. IV. Wk. Budy, — masowo.
M. conicicollis Guér.
M. angusticollis Gyll.
 # *M. a. v. sulcicollis* nov.⁴⁾.
M. spinicollis Aub.
M. picipes Hrbst.
 + *M. 4-dentata* Thoms. (w Wyk. Sil. — Bor. w Przemyślu najczęstsza).
M. longicollis Gyll.
Silvanus bidentatus Fbr.

¹⁾ *Glischrochilus olivieri* Bed. v. *puncticollis* nov. o przedpleczu opatrzonem parą dołków (wśród 34 ok. znalazłem 4 o dwu dołkach symetrycznych, 1 o jednym, jednostronnym).

²⁾ *Gl. 4-pustulatus* L. a. *turnicus* nov. wszystkie 4 plamy pokryw położone na szwie grzbietowym w kształcie litery X; w części przedniej pokryw czarne pozostają tylko wierzchołki barków, tarczka i para plam bocznych poniżej.

³⁾ *Rhizophagus depresso* Fbr. a. *umbratus* nov. o ubarwieniu ciemnobrunatnem, nogach i rożkach jaśniejszych.

⁴⁾ *Monotoma angusticollis* Gyll. v. *sulcicollis* nov. o dołkach przedplecza silnie przedłużonych ku przodowi, dochodzących w postaci łukowatych rowków ^{3/4}, dług. przedplecza.

S. unidentatus Fbr.

+ *S. fagi* Guér. Prałkowce, Brylińce, (w Wyk. Sil. Bor.).

Uleiota planata L.

Dendrophagus crenatus Payk. VII. Turnica na pniu jodłowym.

Cucujus cinnaberinus Scop. VII—IX. Mazury, Brylińce, Turnica, zwł. na jodłach zeszchniętych.

C. c. a. lechicus nov.¹⁾.

+ *Pediacus dermestoides* Fbr. Budy Mł., Prałkowce, Brylińce, Turnica (w Wyk. Sil., Bor.).

+ *Phloeostichus denticollis* Redt. V. Turnica na buku (w Wyk. Sil.).

Laemophloeus duplicatus Waltl.

L. ferrugineus Steph.

L. alternans Er.

CRYPTOPHAGIDAE.

Telmathopilus sparganii Ahr.

T. caricis Ol.

T. brevicollis Aub.

T. typhae Fall.

Paramecosoma melanocephalum Hrbst.

P. m. a. univeste Reitt.

Henoticus serratus Gyll.

Pteryngium crenatum Gyll. Turnica, Bylińce.

Cryptophagus pubescens Strm.

C. subdepressus Gyll.

C. scanicus L.

+ *C. s. a. patruelis* Strm. (w Wyk. Sil.).

C. thomsoni Reitt.

C. cylindrus Kiesw.

C. saginatus Strm.

+ *C. subfumatus* Kr. (w Wyk. Sil.).

C. dentatus Hrbst.

C. scutellatus Newm.

¹⁾ *Cucujus cinnaberinus* Scop. a. *lechicus* nov. głowa, przedplecze i żarczka barwy ciemno-wiśniowej, warga górna, smuga poza oczami i przewężenie szyjowe — w całości lub tylko po bokach w przedłużeniu smugi pozaocznnej — czarne, (na 67 ok. dwie aber.).

- C. distinguendus* Strm.
C. fumatus Mrsh.
C. badius Strm.
C. cellaris Scop.
C. affinis Strm.
C. pilosus Gyll.
C. setulosus Strm.
C. croaticus Reitt.¹⁾.
Empylus glaber Gyll.
Antherophagus nigricornis Fbr.
A. pallens Ol.
Caenoscelis ferruginea Sahlb.
Grobbenia fimetarii Hrbst.
+ *Atomaria barani* Bris. v. *pilosella* Reitt. Turnica. 1 ok.

(w Wyk. Sil.).

- A. umbrina* Gyll.
A. nigriventris Steph.
A. linearis Steph.
A. diluta Er. Brylińce, Turnica.
A. affinis Sahlb. Brylińce.
A. alpina Heer. Brylińce, Turnica.
A. procerula Er. Brylińce.
A. prolixia Er. v. *atrata* Reitt. Brylińce.
A. fuscicollis Mannh.
A. impressa Er. Prałkowce.
A. munda Er.
A. mesomelaena Hrbst.
A. gutta Steph.
A. g. v. rhenana Kraatz.
A. atra Hrbst.
A. fuscata Schönh.
A. atricapilla Steph.
A. zetterstedti Zett. Prałkowce.
A. fuscipes Gyll.
A. pusilla Payk.

¹⁾ Obecność *Cryptophagus baldensis* Er. na ziemiach polskich wydaje się wątpliwą, zwłaszcza, że w wykazie M. Łomnickiego jest podany bez określenia miejsca.

- A. nigripennis* Payk.
A. morio Kol. Brylińce.
A. turgida Er.
A. apicalis Er.
A. ruficornis Mrsh.
A. analis Er.
A. gibbula Er.
Ootypus globosus Waltl.
Epistemus globulus Payk.
E. g. v. dimidiatus Steph.¹⁾.

EROTYLIDAE.

- Tritoma bipustulata* Fbr.
T. b. a. binotata Reitt.
T. subbasalis Reitt. (nie rzadka).
Triplax aenea Schall.
T. russica L. Mazury, Turnica.
T. scutellaris Charp. V. Turnica.
T. rufipes Fbr. V—VII. Turnica.
Dacne notata Gmel.
D. rufifrons Fbr. Brylińce, Turnica.
D. bipustulata Thb.
D. b. a. jekeli Reitt.
Combocerus glaber Schall. IX. Prałkowce, Hurko.
Diplocoelus fagi Chevr. VI, VII. Prałkowce, Brylińce (w Wyk. Sil.).

PHALACRIDAE.

- Phalacrus fimetarius* Fbr.
+ *P. f. a. picipes* Steph. (w wyk. Sil.).
P. substriatus Gyll.
Olibrus aeneus Fbr.
O. millefolii Payk.
O. corticalis Pnz.
O. flavicornis St.
O. bicolor Fbr.
+ *O. b. a. apicatus* Guill. (w wyk. Sil.).

¹⁾ Innych odmian *Epistemus globulus* Payk. nie wyróżnam.

- + *O. b. a. obscurus* Guill. (w wyk. Sil.).
Stilbus testaceus Pnz.
+ *S. t. a. unicolor* Flach (w wyk. Sil.).
S. atomarius L.
S. oblongus Er.

LATHRIDIIDAE.

- Lathridius tardarius* Deg.
L. angusticollis Gyll.
L. pandellei Bris.
L. rugicollis Ol.
L. berghothi Reitt.
L. constrictus Gyll.
L. nodifer Westw.
Enicmus hirtus Gyll.
E. minutus L. ¹⁾)
E. m. a. minutissimus Motsch.
E. consimilis Mannh.
E. rugosus Hrbst.
E. fungicola Thoms.
E. transversus Ol.
Cartodere elongata Curt.
C. ruficollis Mrsh.
C. filiformis Gyll.
Corticaria pubescens Gyll.
C. fulva Com.
C. umbilicata Beck.
C. longicornis Hrbst.
C. impressa Ol.
C. i. a. badia Mannh.
C. longicollis Zett.
C. serrata Payk.
C. elongata Gyll.
C. ferruginea Mrsh.
Melanophthalma transversalis Gyll.

¹⁾ Odmiany *E. m. a. anthracinus* Mannh. za Ganglbauerem nie wyróżniają; Reitter i Kuhnt określają ją wprost przeciwnie — szersza — węższa, a zachodzą wszelkie przejścia.

- M. distinguenda* Com.
M. gibbosa Hrbst.
M. similata Gyll.
M. fuscula Gyll.
M. f. a. trifoveolata Redt.
 # *M. f. a. latipennis* Sahlb.

MYCETOPHAGIDAE.

Triphyllus bicolos Fbr. Prałkowce, Kruhel Wk., Brylińce,
 Turnica.

- Mycetophagus 4-pustulatus* L.
 # *M. 4-p. a. antemacularis* Torre.
M. 4-p. a. erythrocephalus Er.
 # *M. 4-p. a. luteoater* nov.¹⁾.
 # *M. ater* Reitt. V, VI, Brylińce, Turnica.
M. piceus Fbr.
M. p. a. histrio Sahlb.
 + *M. p. a. 6-pustulatus* Fbr. (w Wyk. Sil.).
M. p. a. lunaris Fabr.
 # *M. p. a. undulatus* Mrsh.
 # *M. p. a. varius* Mrsh.
 + *M. p. a. punctulatus* Schilsk. (w Wyk. Sil.).
 - *M. p. a. humeralis* Schilsk. (w Wyk. Sil.).
 # *M. p. a. salicis* Bris. (1 okaz) Prałkowce.
M. 10-punctatus Fbr.

M. atomarius Fbr.

M. 4-guttatus Müll. IV — X. Przemyśl-Zamek, Kruhel Mł.
 Bakonczyce (we wierzbach zamieszkałych przez mrówki).

M. 4-g. a. fasciatus nov.²⁾.

M. multipunctatus Fbr.

M. fulvicollis Fbr. III — X. Prałkowce, Brylińce, Turnica.

M. populi Fbr. IV — XI. Budy Mł., Prałkowce, Kruhel Wk.,
 Brylińce.

¹⁾ *Mycetophagus 4-pustulatus* L. a. *luteoater* nov. — posiada plamy tak silnie zwiększone, że przednie dotykają zwężeniem przedłużeniem tylnych (fig. 1. b).

²⁾ *M. 4-guttatus* Müll. a. *fasciatus* nov. posiada plamy barkowe zlane w jednociągłą przepaskę u nasady skrzydeł.

M. p. a. tremulae nov.¹⁾.

M. p. a. betulae nov.²⁾.

Litargus connexus Geoffr.

Typhaea stercorea L.

SPHINDIDAE.

Sphindus dubius Gyll.

Aspidiphorus orbiculatus Gyll.

CISIDAE.

+ *Cis elongatus* Gyll. Brylińce (w Wyk. Sil. Bor.).

C. comptus Gyll.

C. lineatocibratus Mell. Brylińce.

C. nitidus Hrbst.

C. n. v. jacquemarti Mell.

C. n. v. glabratus Mell.

C. boleti Scop.

C. setiger Mell.

C. micans Fbr.

C. hispidus Gyll.

C. quadridens Mell.

C. alni Gyll. Prałkowce, Brylińce.

C. bidentulus Ol.

C. fissicollis Mell. Brylińce (1 okaz).

C. bidentulus Rosh. Brylińce.

+ *C. fissicornis* Mell. Turnica (w Wyk. Lith.).

+ *Rhopalodontus fronticornis* Pnz. Brylińce (w Wyk. Sil., Bor.).

R. perforatus Gyll. Brylińce (2 okazy).

+ *Ennearthron wagae* Wańk. Turnica (w Wyk. Lith., Carp.).

E. affine Gyll.

E. cornutum Gyll. Brylińce.

Octotemnus glabriulus Gyll.

¹⁾ *M. populi* Fbr. a. *tremulae* nov. o plamach silnie rozszerzonych; przednic łączą się ze środkowemi przy szwie grzbietowym (fg. 2. a.).

²⁾ *M. populi* Fbr. a. *betulae* nov. o plamach zredukowanych; plama barkowa drobna, o poziomym tylnym brzegu, średnia w postaci skośnej kreski, tylna prawie niewyróżniona (fg. 2. c.).

COLYDIIDAE.

Colydium elongatum Fbr. V—VIII. Brylińce, Turnica.

Aglenus brunneus Gyll. IV, XI, przedmieście Garbarze i Podwinie.

Ditoma crenata Fbr.

D. c. a. rufipennis Fbr.

Synchita humeralis Fbr. V—X. park na Zamku, Budy Mł., Brylińce.

S. h. v. separanda Reitt. z poprz.¹⁾.

Cicones variegatus Hellw. V, VI. Pikulice, Kruhel Wk., Brylińce, Turnica.

Orthocerus clavicornis L. Kruhel Mł., Pikulice.

Myrmecoxenus subterraneus Chevr. V, IX. Pikulice.

Bothrideres contractus Fbr. V—X. przedm. Popielówka i Podwinie, Bakończyce, Budy Mł., Pikulice.

Cerylon fagi Bris. Prałkowce, Brylińce.

C. histeroides Fbr.

C. ferrugineum Steph.

C. impressum Er. Brylińce, Turnica.

ENDOMYCHIDAE.

Sphaerosoma globosum St.

Mycetaea hirta Mrsh.

+ *Leistes seminigra* Gyll. II, IV, V, VI. Brylińce, Turnica, (w przerośniętych grzybnią bukach i jodłach) (w Wyk. Carp. or.).

Dapsa denticollis Grm. I—XII. park na Zamku, przedm. Podzamcze i Podwinie, Budy Mł. i Wk., Pikulice, Kruhel Mł. i Wk., Prałkowce.

D. d. a. binotata nov.²⁾.

Lycoperdina succincta L. III—IX. przedm. Lipowica, Szczynie, Hurko.

L. s. a. rubricula Reitt.

L. s. a. disca Gerst. pospolitsza od normalnej.

Mycelina cruciata Schall. VI—X. Brylińce, Turnica.

¹⁾ Wobec zastrzeżeń Ganglbauera co do samodzielności *S. separanda* Reitt. traktuję ją jako odmianę (*varietas*).

²⁾ *Dapsa denticollis* Germ. a. *binotata* nov. nie posiada tylnej, wspólnej plamy grzbietowej.

M. c. a. calabria Costa. pospolitsza od normalnej.
Endomychus coccineus L.

COCCINELLIDAE.

Subcoccinella 24-punctata L.

S. 24-p. a. limbata Moll.

S. 24-p. a. haemorrhoidalis Fbr.

Hippodamia 13-punctata L.

H. 13-p. a. signata Fald.

+ *H. 13-p. a. spissa* Ws. (w Wyk. Sil.).

+ *H. 13-p. a. c-nigrum* Ws. (w Wyk. Sil.).

H. 7-maculata Deg.

7-m. a. continua Ws.

Adonia variegata Goeze.

A. v. a. 5-maculata Fbr.

A. v. a. constellata Laich.

A. v. a. carpini Geoffr.

A. v. a. neglegta Ws.

Anisosticta 19-punctata L.

19-p. a. thoracica Ws.

Aphidecta obliteratea L.

A. o. a. 6-notata Thb.

A. o. a. livida Deg.

Adalia bipunctata L.

+ *A. b. a. interpunctata* Haw. (*herbsti* Ws.; w Wyk. Sil.).

A. b. a. 6-pustulata L.

A. b. a. 4-maculata Scop.

A. b. a. semiubra Ws.

A. b. a. sublunata Ws.

Coccinella 7-punctata L.

C. 7-p. a. floricola Ws.

C. 7-p. a. zapluta Ws.

C. 5-punctata L.

+ *C. 5-p. a. simulatrix* Ws. (w Wyk. Sil., Lith.).

C. 10-punctata L.

C. 10-p. a. 6-punctata L.



C. 10-p. a. 8-punctata Müll.

C. 10-p. a. humeralis Sebal.

C. 10-p. a. 10-pustulata L.

- C. 10-p. a. scribae* Ws.
C. 14-pustulata L.
 + *14-p. a. calligata* Ws. (w Wyk. Sil.).
C. conglobata L.
C. c. a. gemella Hrbst.
C. 4-punctata Pont.
C. 4-p. a. 16-punctata Fbr.
 + *4-p. a. nebulosa* Ws. (w Wyk. Sil.).
 + *C. 4-p. a. abieticola* Ws. (w Wyk. Sil.).
Micraspis 16-punctata L. a. *12-punctata* L.
Mysia oblongoguttata L.
 # *M. o. a. mixta* Walt.
Anatis ocellata L.
A. o. a. 15-punctata Deg.
Halyzia 16-guttata L.
Vibidia 12-guttata Poda.
Myrrha 18-guttata L.
 # *M. 18-g. a. ornata* Hrbst.
M. 18-g. a. silvicola Ws.
 # *M. 18-g. a. multiguttata* Meier.
Thea 22-guttata L.
T. 22-g. a. 20-punctata Fbr.
Calvia 10-guttata L.
C. 15-guttata Fbr.
C. 14-guttata L.
 # *C. 14-g. a. scutulata* Ws.
Propylaea 14-punctata L.
 # *P. 14-p. a. 12-punctata* Walt.
P. 14-p. a. tetragonata Laich.
 # *P. 14-p. simillima* Westh.
P. 14-p. a. conglomerata Fbr.
P. 14-p. a. perlata Ws.
 + *P. 14-p. a. leopardina* Ws. (w Wyk. Sil.).
P. 14-p. a. fimbriata Sulz.
Chilocorus renipustulatus Scriba.
Ch. bipustulatus L.
Exochomus 4-pustulatus L.
 # *E. 4-p. a. distinctus* Brull. (1 okaz).
Platynaspis luteorubra Goeze.

- + *Oxynychus erythrocephalus* Fbr. (w Wyk. Leopolis).
Hyperaspis reppensis Hrbst.
H. campestris Hrbst.
Pullus ferrugatus Moll.
P. haemorrhoidalis Hrbst.
P. auritus Thunb.
P. impexus Muls.
P. suturalis Thunb.
P. s. a. limbatus Steph.
P. ater Kug.
Scymnus nigrinus Kug.
S. frontalis Fbr.
S. f. a. 4-pustulatus Hrbst.
 + *S. f. a. suffriani* Ws. (w Wyk. Sil.).
S. apetzi Muls.
S. rubromaculatus Goeze.
Nephus 4-maculatus Hrbst.
N. bipunctatus Kug.
Stethorus punctillum Ws.
Rhizobius litura Fbr.
 + *R. l. a. discimacula* Muls. (w Wyk. Sil.).
Coccidula scutellata Hrbst.
 + *C. s. a. arquata* Ws. (w Wyk. Sil.).
C. rufa Hrbst.



RÉSUMÉ.

Es werden unter den in Przemyśl und Umgebung gefundenen *Clavicoriern* folgende neue Varietäten und Aberrationen unterschieden.

1. *Mycetophagus 4-pustulatus* L. a. *luteoater* nov. die Makeln sehr stark verbreitert, der Fortsatz der Schultermakel berührt die hintere Makel. (fg. 1 b.).
 2. *Mycetophagus 4-guttatus* Müll. a. *fasciatus* nov. die Schultermakeln in eine ununterbrochene Basisbinde miteinandergeflossen.
 3. *Mycetophagus populi* Fbr. a. *tremulae* nov. die Makeln sehr verbreitert, die Humeralmakel vereinigt sich mit der mittleren neben der Naht. (fg. 2 a.).
 4. *Mycetophagus populi* Fbr. a. *betulae* nov. die Makeln stark reduziert, die Humeralmakel klein, mit dem horizontalen hinteren Rande; die mittlere strichförmig; die hintere fast erloschen. (fg. 2 c.).
 5. *Dapsa denticollis* Grm. a. *bipunctata* nov. die hintere gemeinsame Dorsalmakel fehlt.
 6. *Glischrochilus olivieri* Bed. v. *puncticollis* nov. besitzt am Halsschild 2 punktförmige seitliche Grübchen (unter 34 St. fand ich 4 mit zwei, 1 mit einem einseitigen Grübchen).
 7. *Glischrochilus 4-pustulatus* L. a. *turnicus* nov. alle 4 Flecken der Fliegeldecken sind an der Naht X-förmig verbunden; im vorderen Teile der Fliegeldecken bleiben nur Schildchen, Schulterbeulen und 2 Flecken hinter denselben an den Seiten auf gelbem Grunde schwarz.
 8. *Rhizophagus depressus* Fbr. a. *umbratus* nov. zeigt dunkelbraune Färbung, Fühler und Beine heller.
 9. *Monotoma angusticollis* Gyll. v. *sulcicollis* nov. die Hals-schildgrübchen stark nach vorne verlängert, erreichen als bogenförmige Längsfurchen $\frac{3}{4}$ der Halsschildlänge.
 10. *Cucujus cinnaberinus* Scop. a. *lechicus* nov. Kopf, Schidchen und Halsschild dunkel kirschfarbig, Oberlippe, ein Streifen unter den Augen und Halseinschnürung schwarz, die letzte im ganzen oder nur an den Seiten, in der Verlängerung des Augen-Streifens geschwärzt (unter 67 St. 2 Aberrationen).
-