

- RHOPALIDAE:** *Corizus hyoscyami* (L.) - Om; *Myrmus miriformis* (FALL.) - Om; *Rhopalus parumpunctatus* (SCHILL.) - Wm; **Stictopleurus punctatonervosus* (GZE.) - Om; **Brachycarenum tigrinus* (SCHILL.);
- LYGAEIDAE:** *Kleidocerys resedae* (PANZ.) - Om; **Drymus ryei* DGL. et SC. - Ok; **Rhyparochromus phoeniceus* (ROSSI) - Ok, Wmk; **Rhyparochromus immaculatus* Roy. - Ok; **Rhyparochromus pini* (L.) - Ok, Wmk; **Rhyparochromus vulgaris* (SCHILL.) - Om, Wk; **Trapezonotus arenarius* (L.) - Ok, Wk; **Trapezonotus anorus* (FLOR) - Ok; **Trapezonotus quadratus* (F.) - Ok; **Graptopeltus lynceus* (F.) - Wk; *Megalonotus chiragra* (F.) - Ok;
- ARADIDAE:** *Aradus cinnamomeus* (PANZ.) - Om; *Aradus depressus* (F.) - Om;
- REDUVIIDAE:** *Rhynocoris annulatus* (L.) - Om, Wm; *Rhynocoris iracundus* (PODA) - Om; **Coranus subapterus* (DE G.) - Om;
- NABIDAE:** **Nabis ferus* (L.) - Wmk; **Nabis pseudoferus* REM. - Omk, Wmk; **Nabis punctatus* COSTA - Wk; *Nabis ericetorum* SCHOLTZ - Wm; **Aptus mirmicoides* COSTA - Ok, Wm;
- MIRIDAE:** *Deraeocoris ruber* (L.) - Wm; **Stenodema laevigatum* (L.) - Omk, Wm; **Stenodema calcaratum* (FALL.) - Om, Wm; **Notostira erratica* (L.) - Wm; **Lygus rugulipennis* (POPP.) - Omk, Wm; **Polymerus unifasciatus* (F.) - Om; **Harpocera thoracica* (FALL.) - Omk;
- SALDIDAE:** **Saldula saltatoria* (L.) - Ok;
- ANTHOCORIDAE:** **Elatophilus nigricornis* (ZETT.) - Om.

Jerzy A. LIS, Opole
Barbara LIS, Opole

173. Nowe stanowisko *Harpalus (Pseudophonus) rufipes* (DE GEER) (*Coleoptera: Carabidae*) w Bieszczadach

New locality of *Harpalus (Pseudophonus) rufipes* (DE GEER) (*Coleoptera: Carabidae*) in the Bieszczady Mts.

KEY WORDS: *Coleoptera*, *Carabidae*, *Harpalus*, *rufipes*, new locality, Bieszczady Mts., Poland.

Harpalus rufipes (DE GEER) to gatunek szeroko rozprzestrzeniony, występujący od północnej Afryki poprzez prawie całą Europę, aż do środkowej Fennoskandii, sięgający przez Syberię do Japonii. W Polsce bardzo pospolity, wykazywany z większości krain, nie został do tej pory wykazany z Bieszczadów. Gatunek związany jest z polami uprawnymi, suchymi łąkami położonymi na glebach gliniastych.

W Bieszczadach autorka zловиła 2 egzemplarze, 25 VIII 1987 r. w Ustrzykach Górnych, na łąkach położonych powyżej potoku Wołosate. Zebrane okazy znajdują się w zbiorach autorki.

Maria WOLENDER, Szczecin