

Cis jacquemartii MELLIÉ, 1849

- Bieszczady: Wołosate, 6 VIII 1975, 3 exx.; Bukowe Berdo, 13 VIII 1975, 2 exx.
- Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Ruda Milicka, 25 VII—8 VIII 1989, 4 exx.
Nowy dla Bieszczadów i Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej.

Cis lineatocribratus MELLIÉ, 1849

- Bieszczady: Wołosate, 6 VIII 1975, 1 ex.
Nowy dla Bieszczadów.

Cis nitidus (FABRICIUS, 1792)

- Dolny Śląsk: Kotowice k. Wrocławia, 18 III 1990, 3 exx.; Wrocław—Mokry Dwór, VI 1990, 3 exx.; Wrocław—Wojnow, VI 1990, 1 ex.; Muszkowice, VI 1990, 1 ex.
- Wzgórza Trzebnickie: Ostrzeszów, 21 IV 1976, 1 ex.
- Góry Świętokrzyskie: Rezerwat Zamczysko, 20 V 1983, 1 ex.
Nowy dla Dolnego Śląska, Wzgórz Trzebnickich i Gór Świętokrzyskich.

Cis setiger MELLIÉ, 1849

- Nizina Wielkopolsko-Kujawska; Ruda Milicka, 19 VI 1982, 1 ex., 14 V 1983, 2 exx.
- Dolny Śląsk: Muszkowice, VI 1990, 1 ex.
Nowy dla Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej. Z Dolnego Śląska podany 80 lat temu.

Ennearthron cornutum (GYLLENHAL, 1827)

- Puszcza Białowieńska: Białowieża, 22 VII 1982, 1 ex.
Nowy dla Puszczy Białowieńskiej.

LECH BOROWIEC, Wrocław

10. Nowe dane o występowaniu w Polsce trzech gatunków *Chrysididae* (*Hymenoptera*)

New records on the occurrence in Poland of three species of *Chrysididae* (*Hymenoptera*)

Hedychrum micans LUC. — Wyżyna Małopolska: rez. „Pieprzowe Góry” ad Sandomierza (EB 51), 10 VI 1990, 1 ♀. Gatunek o niedostatecznie poznanej rozsiadłości nie odróżniany dawniej od *H. nobile* (SCOP.). Z Polski wykazany dotąd tylko z Niziny Wielkopolskiej i Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej.

Hedychrum gerstaeckeri CHEVR. — Puszcza Białowieńska: Narewka ad Hajnówka (FD 85), 23 VII 1986, 1 ♂. Nie wykazany dotąd z północno-wschodniej Polski.

Chrysis bicolor LEP. — Podlasie: Kopna Góra ad Supraśl (FE 60), 23 VIII 1985, 1 ♀. Znany w Polsce dotąd z sześciu krain. Rozsiadłość poznana niedostatecznie; przez niektórych autorów uważany za podgatunek *Ch. succincta* L.

DANIEL KUBISZ, Kraków