

66. Spostrzeżenia lepidopterologiczne z Tatr

Lepidopterological observations from the Tatra Mts.

Oreopsyche plumifera (O.) (*Psychidae*)

- Przełęcz Chuda w Tatrach zachodnich – 1850 m n.p.m. (UTM – DV15), 2 exx. 27 czerwca 1990 r. Motyle latały przy słonecznej pogodzie o godz. 16.00. W Polsce gatunek ten stwierdzony był tylko przed 60 laty w Zawierciu i Rzeszowie (w miesiącu kwietniu i maju). Na wyraźnie późniejszy okres pojawu w Tatrach niewątpliwie mają wpływ czynniki klimatyczne.

Cidaria achromaria (LÄH.) (*Geometridae*)

- masyw Czerwonych Wierchów – 1800 m n.p.m. (UTM – DV15) 1 ex. 28 czerwca 1990 r. Motyl siedział pod przywieszką skalną. Gatunek ten stwierdzony był w Polsce wyłącznie z Tatr i tylko w dwóch egzemplarzach z terenów położonych znacznie niżej – z Doliny Chochołowskiej i z Korycisk Wielkich.

Erebia medusa (F.) (*Satyridae*)

- Polana Kalatówki – 1230 m n.p.m., Hala Kondratowa – 1300 m n.p.m., Dolina Suchej Wody – 1250 m n.p.m. (UTM – DV25), pojedyncze egzemplarze spotykane w trzeciej dekadzie czerwca i w pierwszej dekadzie lipca 1990 i 1991 r. Dotychczas wykazany w 1 ex. 12 lipca 1957 z Doliny Tomanowskiej – 1100 m n.p.m. Motyle należały do ssp. *hippomedusa* (O.), były nieco mniejsze od formy nominatywnej, mniej kontrastowo ubarwione oraz o mniejszych plamkach i oczkach na obu parach skrzydeł.

JANUSZ SOSIŃSKI, Poznań

67. Nowe stanowisko *Parnassius mnemosyne* (L.) (*Lepidoptera, Papilionidae*) w Polsce

A new locality of *Parnassius mnemosyne* (L.) (*Lepidoptera, Papilionidae*) in Poland

Podczas prowadzonych wiosną 1991 roku doraźnych obserwacji entomologicznych w północno-wschodniej części kraju stwierdzono nowe stanowisko występowania *Parnassius mnemosyne* (L.) w Polsce:

- Puszcza Romincka UTM-FF02, 1 ex ♀ 24 V 1991 r.

Gatunek ten zasiedla głównie południowe (górskie i podgórskie) rejony Polski, gdzie liczba znanych stanowisk wyraźnie rośnie w kierunku wschodnim. W północno-wschodniej części kraju wykazany był wcześniej z okolic Elbląga (dane z przed 60 lat), a w ostatnim dziesięcioleciu stwierdzony został na terenie Puszczy Boreckiej i Puszczy Białowieskiej.

Z uwagi na pojedynczy egzemplarz motyla z Puszczy Rominckiej nie było możliwe określenie jego przynależności podgatunkowej. Charakterystyczne jednak jest, że motyl ten był o około 20% mniejszy od pochodzącego z Puszczy Białowieskiej.

JANUSZ SOSIŃSKI, Poznań