

181. Nowe stanowiska rzadkich motyli (*Lepidoptera*) w Polsce.

New records of some rare Polish *Lepidoptera*.

KEY WORDS: *Lepidoptera*, faunistic, new records, Beskid Niski Mts., Poland.

Podczas obserwacji przyrodniczych prowadzonych w Beskidzie Niskim w okolicach wsi Zyndranowa (EV47) stwierdziliśmy występowanie kilku gatunków motyli (*Lepidoptera*), których rozszedlenie w Polsce jest niezbyt dobrze poznane. Stanowiska te rozszerzają znane dotychczas granice zasięgu omawianych gatunków.

Hypoxystis pluviana PROUT, 1915 (*Geometridae*)

– Zyndranowa, 28 V 1995, 1♀. Motyla złowiono o zmierzchu latającego nad niewielkim strumieniem.

Gatunek znany z Europy Środkowej i Azji Mniejszej. Z terenu Polski wykazywany w ubiegłym wieku z okolic Olsztyna oraz znaleziony ostatnio w Puszczy Białowieskiej (dane niepublikowane). Stanowisko w Beskidzie Niskim rozszerza zasięg tego gatunku na obszar południowo- wschodniej Polski.

Coleophora ornatipennella (HÜBNER, 1796) (*Coleophoridae*)

– Zyndranowa, 1 VI 1995, 1♀ złowiona do światła lampy.

Gatunek znany z Europy środkowej i południowej. W Polsce znany z niewielu rozproszonych stanowisk, głównie w części południowej (okolice Krakowa, Pińczowa oraz Pieniny).

Depressaria pastinacella (DUPONCHEL, 1838) (*Oecophoridae*)

– Zyndranowa, 25 V 1995, 1♂, 2♀. Okazy złowiono o zmierzchu podczas wypłaszania z roślinności zielnej.

W Polsce wykazany z pojedynczych stanowisk w okolicach Krakowa, Dolnego Śląska i Pomorza są to jednak dane historyczne. Ostatnio wykazany z okolic Torunia, stanowisko w Beskidzie Niskim potwierdza jego występowanie w południowej części kraju.

Depressaria pimpinellae ZELLER, 1839 (*Oecophoridae*)

– Zyndranowa, 22–28 V 1995, 2♂♂, 1♀. Odłowione do światła lampy.

Gatunek znany z Europy środkowej i Skandynawii. W ubiegłym wieku wykazywany z Pomorza i Dolnego Śląska, a w okresie międzywojennym z okolic Poznania, ostatnio znaleziony w Pieninach.

Agonopterix carduella (HÜBNER, 1816) (*Oecophoridae*)

– Zyndranowa, 21–25 V 1995, 2♂♂, 1♀. Odłowione do światła lampy.

Gatunek znany z Europy środkowej i Skandynawii, a ostatnio wykazywany również z Łotwy i Litwy. Z terenu Polski znany tylko z Beskidu Sądeckiego. Stanowisko w Beskidzie Niskim potwierdza południowy charakter zasięgu tego gatunku.

Agonopterix scopariella (HEINEMANN, 1870) (*Oecophoridae*)

– Zyndranowa, 27 V 1995, 1♂, 1♀. Odłowione do światła lampy.

Gatunek znany z Europy środkowej i północnej oraz z Krymu. W Polsce wykazywany w ubiegłym wieku z Dolnego Śląska, a w czasach współczesnych wykazany z Pienin i Beskidu Ustrońskiego.

Materiały dowodowe przechowywane są w Zakładzie Zoologii Systematycznej UAM w Poznaniu.

Edward BARANIAK, Poznań
Urszula WALCZAK, Poznań