

208. Nowe stanowiska i uwagi o występowaniu *Thera britannica* TURNER, 1925 (*Lepidoptera: Geometridae*) w Polsce

New localities and notes on the distribution of *Thera britannica* TURNER, 1925 (*Lepidoptera: Geometridae*) in Poland

KEY WORDS: *Lepidoptera*, *Geometridae*, *Thera britannica*, new localities, Poland.

*Thera britannica* TURNER, 1925 [= *T. albonigrata* (Gornik, 1942)] do niedawna traktowany był jako forma pokrewnych gatunków *Thera variata* (DEN. & SCHIFF.) i *T. stragulata* (HBN.). Różnice diagnostyczne między nimi wyjaśnił KRAMPL (1973: Acta ent. bohemoslov., 70: 272-281).

Omawiany gatunek jest szeroko rozsiadany w północnej, zachodniej i częściowo środkowej Europie. Występuje na licznych stanowiskach w Wielkiej Brytanii, Danii oraz południowej Norwegii i Szwecji. Bardziej lokalnie notowany jest w Hiszpanii, Belgii, Holandii i Luksemburgu, w krajach alpejskich, a także w Czechach, Słowacji i na Węgrzech. Spotykany był też w górach Rumunii i Grecji. W Polsce wykazany został tylko z jednego stanowiska – Pasma Łysogórskie w Górach Świętokrzyskich (ŚLIWIŃSKI, WIĘCKOWSKI, MARCINIAK, 1991: Fragm. faun., 35: 123-145).

Autorzy na podstawie kolekcji BATKOWSKIEGO znajdującej się w Muzeum Tatrzańskim, zbiorów SZPORA oraz własnych obserwacji, stwierdzili występowanie *T. britannica* na szeregu dalszych stanowiskach:

- Jagniątków (Karkonosze), UTM – WS42: 1 ex., 25 VII 1991 (J. NOWACKI leg.)
- Dębowa Góra (Przedgórze Sudeckie), XS22: 1 ex., 1 X 1965 (R. SZPOR leg.)
- Święty Krzyż (G. Świętokrzyskie), EB03: 1 ex., 5 VII 1979 (J. SOSIŃSKI leg.)
- Gubałówka, DV26: 3 ex., 21 VII 1973, 7 VII 1974, 18 VI 1976 (J. SOSIŃSKI leg.); 3 ex., 26 VI 1961, 19 VII 1962, 14 VII 1065 (R. SZPOR leg.); 28 ex., 7 VI – 13 VII, 2 ex., 7 IX w latach 1954 – 1967 (S. BATKOWSKI leg.)
- Staników Żleb (Tatry), DV15: 1 ex., 9 VII 1962 (R. SZPOR leg.)
- Wielkie Koryciska (Tatry), DV15: 1 ex., 6 VII 1965 (R. SZPOR leg.); 1 ex., 23 VII 1997 (A. MALKIEWICZ leg.)
- Dolina Chochołowska (Tatry), DV15: 2 ex., 15 VI 1976 i 17 VII 1986 (J. SOSIŃSKI leg.)
- Dolina Dudowa (Tatry), DV15, 1 ex., 28 VI 1995 (A. MALKIEWICZ leg.)
- Zarzeczce ad Jarosław, FA13: 1 ex., 31 VIII 1968 (R. SZPOR leg.)
- Olszany (Pogórze Przemyskie), FA11: 3 ex., 8 – 13 VI 1995 (A. MALKIEWICZ leg.)
- Dołżyca (Bieszczady), EV95: 1 ex., 1 VII 1967 (R. SZPOR leg.)

Poza tym w kolekcji BIELEWICZA w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu znajduje się około 30 okazów tego gatunku zbieranych w latach 60-tych i 70-tych XX w. w Bieszczadach i na Pogórzu Przemyskim.

Gąsienice *T. britannica* żyją na jodle (*Abies* sp.), choć w Anglii stwierdzono ich żerowanie na innych drzewach szpilkowych. Można się spodziewać, że gatunek ten występuje w Polsce na obszarze naturalnego zasięgu jodły pospolitej (*Abies alba* MILL.), zwłaszcza w górach i na pogórzu, a także w niektórych parkach.

Adam MALKIEWICZ, Wrocław  
Janusz SOSIŃSKI, Poznań