

246. Nowe stanowisko *Notiophilus rufipes* CURTIS, 1829 (*Coleoptera*: *Carabidae*) w Polsce

New locality of *Notiophilus rufipes* CURTIS, 1829 (*Coleoptera*: *Carabidae*) in Poland

KEY WORDS: *Coleoptera*, *Carabidae*, *Notiophilus rufipes*, new record, distribution in Poland.

Areał występowania *Notiophilus rufipes* CURT. obejmuje południową i środkową Europę; spotykany jest także w południowej Szwecji i na Kaukazie. W Polsce rozmieszczenie *N. rufipes* jest niedostatecznie poznane. Jedyne dotychczas pewne stanowiska pochodzą z zachodniej Polski: Słubice oraz rez. „Bielinek” nad Odrą.

W ostatnim czasie stwierdzono kolejne stanowisko *N. rufipes* na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej:

– Puszcza Zielonka ad Poznań (UTM: XU43), rez. „Las Mieszany”, 24 V 1996, 2 exx., w liściastej ściółce, leg. et det. P. SIENKIEWICZ.

Notiophilus rufipes CURT. jest jednym z rzadszych w Polsce gatunków z tego rodzaju. Ten leśny owad żyje wśród mchu, pod liśćmi; zwykle pod okapem drzew. Niektórzy podają, że środowiskiem życia tego gatunku są również łąki, zbocza kserotermiczne, suche lasy liściaste, a nawet wydmy. W Polsce odławiany był do tej pory w ciepłych lasach liściastych. *N. rufipes* jest interesującym gatunkiem związanym, wg. autora, ze starymi, ciepłymi lasami liściastymi lub mieszanymi. W związku z niszczeniem takich środowisk, w których ten rzadki owad rozwija się, można zaproponować umieszczenie go w „Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt”.

Autor składa podziękowania mgr. D. KUBISZOWI za weryfikację oznaczeń. Materiał dowodowy znajduje się w zbiorze autora.

Paweł SIENKIEWICZ, Poznań

247. Nowe stanowiska rzadkich gatunków *Elachistidae* (*Lepidoptera*) w Polsce

New records of rare *Elachistidae* (*Lepidoptera*) from Poland

KEY WORDS: *Lepidoptera*, *Elachistidae*, new records, Poland

Elachista festucicolella ZELLER, 1853

– Pieniny, Trzy Korony (UTM: DV57), 850 m n.p.m., skały wapienne porośnięte roślinnością trawiastą, 1 ♀, 13 VII 1995 (leg., coll. T. BARAN).

Gatunek o zasięgu obejmującym południową i środkową Europę oraz Azję Mniejszą. W Polsce w XIX wieku podawany był z Głogowa, natomiast w XX wieku jedyne wiarygodne dane odnoszą się do Jerzmanowic i Ojcowa (dwa ostatnie stanowiska znajdują się w obrębie jednego kwadratu siatki UTM – DA16). Gatunek nowy dla fauny Pienin.

Elachista griseella (DUPONCHEL, 1843)

– Chotel Czerwony (DA78), obrzeże strumyka, ex larva, 1 ♂, 10 V; ex larva, 1 ♂, 12 V; ex larva, 2 ♀♀, 1 ♂, 13 V 1997; roślina pokarmowa – *Agropyron repens* (L.) P. B. (leg. et coll. T. BARAN).

- rez. „Skorocice” (DA78), obrzeża strumyka, ex larva, 1♂, 11 V; ex larva, 1♀, 13 V 1997; roślina pokarmowa – *Agropyron repens* (L.) P. B. (leg. et coll. T. BARAN).

Gatunek występujący w południowej i lokalnie środkowej Europie. Z Polski wykazany stosunkowo niedawno z kilku stanowisk z województwa kujawsko-pomorskiego oraz z Poznania (BUSZKO 1989: Pol. Pismo Ent., 59: 235-241).

Elachista quadripunctella (HÜBNER, 1825)

- Cisna (EV95), las mieszany, 1♂, 1♀, 19 VI 1999 (leg. et coll. T. BARAN).

Gatunek znany prawie w całej Europie. W Polsce wykazany z kilku stanowisk zlokalizowanych na terenach górskich i podgórskich oraz z miejscowości Soldany, znajdującej się w północno-wschodniej części kraju.

Elachista subocellea (STEPHENS, 1834)

- rez. „Chotel Czerwony” (DA78), kserotermiczna murawa na podłożu gipsowym, 3♂♂, 18 VI 1999 (leg. et coll. T. BARAN).
- Nowosiółki (EV97), trawiaste zbocze na skraju lasu mieszanego, 5♂♂, 3♀♀, 19 VI 1999 (leg. et coll. T. BARAN).

Gatunek szeroko rozsielony w Europie. W Polsce stwierdzony dotychczas jedynie w okolicach Krosnowic, Młodowie, Ludwikowie, Krościenku, Ojcowie oraz w rezerwacie „Zbocza Płutowskie”.

Tomasz BARAN, Toruń

248. Nowe stanowisko *Odontosia sieversi* (MÉNÉTRIÉS, 1856) (*Lepidoptera: Notodontidae*) w Polsce

A new locality of *Odontosia sieversi* (MÉNÉTRIÉS, 1856) (*Lepidoptera: Notodontidae*) in Poland

KEY WORDS: *Lepidoptera*, *Notodontidae*, *Odontosia sieversi*, record, Poland.

Odontosia sieversi (MÉNÉTRIÉS) zasięgiem swego występowania obejmuje obszar od środkowo-wschodniej części Europy po wschodnią część Syberii. Z Europy wykazana została z krajów skandynawskich, krajów byłego Związku Radzieckiego, Polski, Słowacji i Czech. W Polsce występuje lokalnie we wschodniej części kraju, od Mazur i Suwalszczyzny po Pogórze Przemyskie. W miejscach występowania bywa liczna. Najdalej na zachód w północno-wschodniej Polsce znaleziona była w okolicach Ostródy.

Omawiany gatunek złowiony został przeze mnie na terenie Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego:

- Czarny Bryńsk (UTM: DD19), 27 III 1999, 1♂, do światła.

Znalezisko to jest godne odnotowania jako skrajnie zachodnie stanowisko tego gatunku w Polsce i jedno z najdalej na zachód wysuniętych stanowisk w skali całego zasięgu gatunku.

Andrzej OLEKSA, Toruń