

251. Nowe dane o rozmieszczeniu *Agrilus auricollis* KIESENWETTER, 1857 (*Coleoptera: Buprestidae*) w Polsce

New data on the distribution of *Agrilus auricollis* KIESENWETTER, 1857 (*Coleoptera: Buprestidae*) in Poland

KEY WORDS: *Coleoptera, Buprestidae, Agrilus auricollis*, new records, Poland

*Agrilus auricollis* KIESENW. to rzadko spotykany gatunek, którego występowanie ogranicza się do obszarów południowo-wschodniej Europy, Azji Mniejszej oraz Kaukazu. Do tej pory znany był w Polsce tylko z Niziny Mazowieckiej, Puszczy Białowieskiej, Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej oraz Bieszczadów. Obserwacje autorów wskazują na szersze występowanie tego gatunku w Polsce oraz potwierdzają jego preferencje w stosunku do wiązu (*Ulmus* sp.) jako rośliny żywicielskiej larw.

Nowe stanowiska:

- Parcela-Popień ad Koluszki (UTM: DC23), 20 VII 1999, 1 ex., leg. J. BOROWSKI, na wiązie (*Ulmus campestris* L.) odroślowym o średnicy (na wys. 1,3 m) 7 cm, rosnącym w zadrzewieniu przydrożnym; okaz został schwytany na korze pnia (martwe drzewo z uschniętymi liśćmi) w towarzystwie *Magdalis armigera* (GEOFFR.), *Scolytus multistriatus* (MARSH.) i *S. scolytus* (FABR.); nowy dla Wyżyny Małopolskiej.
- Nowa Słupia (EB03), 18 VI 1993, 1 ex., leg. T. MOKRZYCKI, coll. R. KRÓLIK, schwytany czerpakiem na kseroatermie; nowy dla Gór Świętokrzyskich.
- Gliniska ad Hrubieszów (FB83), 27 VI 1997, 1 ex., leg. A. BYK, na pniu obumarłego wiązu *U. campestris* (liście uschłe, ale wiszące na drzewie) o średnicy 8 cm, w towarzystwie *Magdalis armigera*; wiąz wchodził w skład zadrzewień przydrożnych; nowy dla Wyżyny Lubelskiej.

Jerzy BOROWSKI, Warszawa

Adam BYK, Warszawa

Roman KRÓLIK, Kluczbork

252. Uzupełnienie do fauny motyli większych (*Macrolepidoptera*) Puszczy Białowieskiej

A supplement to the fauna of *Macrolepidoptera* of the Białowieża Forest

KEY WORDS: *Lepidoptera (Macrolepidoptera)*, records, Białowieża Forest, Poland.

Badania lepidopterofauny Puszczy Białowieskiej trwają ponad 75 lat. W odniesieniu do *Macrolepidoptera* zostały one w ostatnich latach podsumowane (BUSZKO i in. 1996: Parki Nar. i Rez. Przyr., 15, 4: 3-46.). Podsumowanie to poszerzono o uzupełnienie (KOKOT 1997: Parki Nar. i Rez. Przyr., 17, 3: 63-66.). Jednak z uwagi na znaczne zróżnicowanie siedliskowe Puszczy i koncentrację badań tylko na niektórych, wybranych obszarach, stan poznania występującej tu lepidopterofauny nie jest pełny.

Podczas kilkudniowego pobytu w leśnictwie Topiło ( UTM: FD73) i w jego najbliższych okolicach – Piaski (FD73), Witowo (FD63), autorzy spotkali dwa gatunki motyli nowe dla tego terenu oraz kilka, których występowanie w Puszczy nie było potwierdzone po 1950 roku, bądź były dotychczas wykazywane tylko z jednego stanowiska:

*Hepialus lupulinus* (L.)

- Topiło, 26–29 VI 1999, obserwowano kilka osobników w siedliskach łąkowych, latających o zmierzchu oraz przylatujących do pułapek świetlnych.  
Gatunek ten od 1950 roku nie był stwierdzany w Puszczy Białowieskiej.

*Epirrhoe galidata* (DEN.et SCHIFF.)

- Piaski, 29 VI 1999, 1 ex. w siedlisku łąkowym, wypłoszony w dzień.  
Występowanie tego gatunku po 1950 roku nie było na badanym terenie potwierdzone.

*Diachrysia zosimi* (HBN.)

- Topiło, 2 ex., 27 i 29 VI 1999, przywabione do światła.  
Dotychczas wykazany był z Puszczy Białowieskiej na podstawie 2 ex. (z Białowieży oraz z Białowieskiego Parku Narodowego). Można przypuszczać, że motyl ten jest szeroko rozsiadły w Puszczy, w siedliskach odpowiednich do jego rozwoju.

*Autographa buraetica* (STAUDINGER)

- Topiło, 7 ex., 26– 29 VI 1999, przywabione do światła.  
Gatunek nowy dla Puszczy Białowieskiej.

*Eucarta virgo* (TREIT.)

- Topiło, 1 ex., 29 VI 1999, przywabiony do światła.  
Gatunek nowy dla Puszczy Białowieskiej, w ostatnich latach dynamicznie rozszerzający granice swego rozsiedlenia w Polsce.

*Lacanobia aliena* (HBN.)

- Witowo, 1 ex., 20 VI 1999, odłowiony do światła.  
Występowanie tego motyla w Puszczy Białowieskiej po 1950 roku nie było dotąd potwierdzone.

*Mythimna albipuncta* (DEN. et SCHIFF.)

- Topiło, 1 ex., 30 VI 1999, przywabiony do światła.  
Nie wykazywany po 1955 roku z terenu Puszczy.

*Mythimna flammea* ( CURT.)

- Topiło, 1 ex., 28 VI 1999, przy świetle.  
Gatunek dotychczas wymieniany tylko z miejscowości Białowieża.

*Mythimna l-album* (L.)

- Topiło, 2 ex., 28 i 30 VI 1999, przywabione do światła.  
Gatunek ten nie był stwierdzony po 1950 roku w Puszczy Białowieskiej.

Biorąc pod uwagę niniejszą publikację, ilość gatunków *Macrolepidoptera* wykazanych z Puszczy Białowieskiej po 1950 roku zwiększa się z 897 do 904, przy czym dwa z nich nie były dotychczas wykazane z tego terenu.

Janusz SOSIŃSKI, Poznań  
Wojciech ŚLIWA, Rakownia  
Dariusz WASILUK, Woźniki