

*Psylliodes napi* (FABRICIUS, 1792)

– Tarnogóra ad Izbica (FB43), 25 IX 1997, 1 ex., na podmokłej łące w pobliżu rzeki Wieprz u podnóża skarpy, na skraju wilgotnej łąki, z roślin z rodziny krzyżowych – *Brassicaceae*.

Składam serdeczne podziękowania Panu prof. dr hab. L. BOROWCOWI za sprawdzenie oznaczeń oraz dr hab. L. LECHOWSKIEMU za udostępnione materiały.

Ewa PIETRYKOWSKA, Zakł. Zool. UMCS, Lublin

303. *Cassida ferruginea* GOEZÉ, 1777 i *Cassida pannonica* SUFFRIAN, 1844 (*Coleoptera: Chrysomelidae*) na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej

*Cassida ferruginea* GOEZÉ, 1777 and *Cassida pannonica* SUFFRIAN, 1844 (*Coleoptera: Chrysomelidae*) in Wielkopolska-Kujawy Lowlands

KEY WORDS: *Coleoptera, Chrysomelidae, Cassida ferruginea, Cassida pannonica*, new records, W Poland.

*Cassida* (s. str.) *ferruginea* GOEZÉ, 1777

Obszar zwartej rozsiadki tego gatunku rozciąga się od Francji do środkowej Syberii. Przez Nizinę Wielkopolsko-Kujawską przebiega północna granica jego arealu. W Polsce *C. ferruginea* należy do bardzo rzadkich gatunków. Z Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej (Brudzyń) podany był on przez SZULCZEWSKIEGO (1922: Prace Kom. Mat.-Przyr. PTPN, B, 1, 3-4: 183-243.), poza tym w Polsce znany z nielicznych stanowisk na Pobrzeżu Bałtyku, Pojezierzu Mazurskim, Sudetach Zachodnich, Śląsku i Wyżynie Krakowsko-Wieluńskiej; dane z krain innych niż dwie ostatnie pochodzą z początku XX wieku (BURAKOWSKI i in. 1991: Kat. Fauny Polski, XXIII, 17: 1-227.). Nowe stanowisko *C. ferruginea* stwierdzono w okolicach Poznania:

– Biedrusko ad Poznań (XU32), poligon, 26 V 1997, 2 exx., leg. U. WALCZAK.

*Cassida* (s. str.) *pannonica* SUFFRIAN, 1844

Gatunek znany z części Europy Środkowej, Azji Mniejszej i Środkowej oraz z Kaukazu. Północna granica jego zwartej zasięgu przebiega przez południowe dzielnice naszego kraju, gdzie znajduje się przeważająca większość polskich stanowisk tego tarczycy. *C. pannonica* był również podany z Niziny Mazowieckiej (okolice Warszawy) (BURAKOWSKI i in. 1991: Kat. Fauny Polski, XXIII, 17: 1-227.). To dawne znalezisko reprezentowało najdalej wysunięte na północ miejsce występowania omawianego gatunku w naszym kraju. Nowe dane wskazują na szerszy jego zasięg i mogą stanowić potwierdzenie tezy o ekspansji tego ciepłolubnego gatunku na północ:

– Biedrusko ad Poznań (XU32), poligon, 27 V 1998, 1 ex., leg. U. WALCZAK; 15 VI 2000, 2 exx.; 30 V 2000, 7 exx.; 30 VII 2000, 1 ex., leg. Sz. KONWERSKI; wszystkie okazy „wykoshone” zostały czerpakiem na murawach kserotermicznych.

Gatunek nowy dla Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej.

Okazy dowodowe znajdują się w zbiorach autorów.

Składamy podziękowania prof. dr hab. Lechowi BOROWCOWI za pomoc w oznaczeniu okazów, oraz koleżance Urszuli WALCZAK za przekazanie okazów.

Paweł JAŁOSZYŃSKI, Włocławek  
Szymon KONWERSKI, Zakł. Zool. Syst. UAM, Poznań