

phalus (OL.), 1 ex. / 0 ex.; *E. ochropterus* (MARSH.), 0 ex. / 6 ex.; *E. quadripunctatus* (HERBST), 1 ex. / 0 ex.; *Berosus spinosus* STEVEN*, 3 ex. / 1 ex.

Z podanych chrząszczy, na szczególną uwagę zasługuje rzadko łwiony *Cercyon bifene-stratus*. Interesujące jest też wykazanie halofilnego *Berosus spinosus*.

Paweł BUCZYŃSKI, Zakł. Zool. UMCS, Lublin
Witold KOWALIK, Kat. Zool. AR, Lublin
Marek PRZEWOŻNY, Poznań

340. Materiały do poznania ryjkowców (*Coleoptera: Curculionidae*) Roztocza

Contributions to the knowledge of the weevils (*Coleoptera: Curculionidae*) of the Roztocze region

KEY WORDS: Weevils, *Coleoptera, Curculionidae*, faunistics, Roztocze region, E Poland.

Tereny Roztocza Południowego były miejscem stosunkowo licznych prac faunistycznych. Wyniki ich mówią o występowaniu tu wielu bardzo rzadkich w skali kraju gatunków. Dotyczy to przede wszystkim fauny obszarów kserotermicznych. Jednak ze względu na dużą różnorodność biotopów tworzących krajobraz Roztocza (i potencjalne siedliska owadów) lista dotychczas stwierdzonych tu gatunków jest z pewnością niepełna. Poniżej podajemy cztery gatunki nowe dla tej krainy, odkryte w ostatnich latach.

CURCULIONIDAE

Otiorhynchus velutinus GERMAR, 1824

– Rezerwat „Biała Góra” ad Tomaszów Lubelski (FA79), 25 V 1995, 1 ex. złowiono za pomocą czerpaka w zbiorowisku kserotermicznym.

Gatunek kserotermofilny, żerujący na koniczynach i na janowcu; w Polsce poławiany na nielicznych stanowiskach na Wyżynie Małopolskiej i Lubelskiej.

Larinus turbinatus GYLLENHAL in SCHOENHERR, 1836

– Rezerwat „Biała Góra” ad Tomaszów Lubelski (FA79), 25 VI 1996, 1 ex. złowiono czerpakiem entomologicznym w okolicach zbiorowiska kserotermicznego.

Chrząszcz rzadko łwiony. Jako rośliny żywicielskie podawane są: *Carduus nutans* L. i *Cirsium* spp. Preferuje miejsca nasłonecznione, łąki, ugory, brzegi lasów.

Notaris maerkeli (BOHEMAN in SCHOENHERR, 1843)

– Rezerwat „Biała Góra” ad Tomaszów Lubelski (FA79), 9 IV 1996, 1 ex. wysiano sitem entomologicznym z runa lasu porastającego wąwóz.

Gatunek zamieszkujący wilgotne łąki śródleśne, występujący w Europie Środkowej. Poławiany rzadko i nielicznie w kilkunastu krainach.

Rynchaenus quedenfeldtii (GERHARDT, 1865)

– Rezerwat „Biała Góra” ad Tomaszów Lubelski (FA79), 2 V 1997, 2 ex. złowiono do parasola entomologicznego z drzew porastających zbocza wąwozu.

Gatunek rzadki, związany z wiązem pospolitym, spotykany w lasach, na suchych zboczach; w Polsce odławiany dotychczas na Śląsku, Polesiu Lubelskim i Wyżynie Małopolskiej.

Jacek ŁĘTOWSKI, Rafał GOSIK, Wojciech CZARNIAWSKI, Zakł. Zool. UMCS, Lublin