

401. Nowe stanowisko *Hypocacculus rufipes* (KUGELANN, 1792) (*Coleoptera: Histeridae*) w Polsce

New locality of *Hypocacculus rufipes* (KUGELANN, 1792) (*Coleoptera: Histeridae*) in Poland

KEY WORDS: *Coleoptera*, *Histeridae*, *Hypocacculus rufipes*, new locality, Poland.

Hypocacculus rufipes (KUGELANN, 1792) występuje w południowej Szwecji, Danii, środkowej i południowej Europie, na Krymie i Kaukazie oraz w południowej Syberii. W Polsce wykazany z Pobrzeża Bałtyku, Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej, Niziny Mazowieckiej i Sudetów Zachodnich oraz – w oparciu o znaleziska pochodzące sprzed około 100 lat – z Dolnego Śląska i Wzgórz Trzebieńskich. Ostatnie doniesienie o występowaniu tego gatunku w kraju pochodzi sprzed 30 lat (MAZUR 1972: *Fragm. faun.*, **18**, 20: 393-404).

Bionomia gatunku bardzo słabo poznana. Chrząszcz preferuje tereny piaszczyste, gdzie najczęściej spotykany jest na wydmach oraz w żwirowniach i piaskowniach. Znajdowany jest pod gnijącymi resztkami roślin, rzadziej w kompoście, pod odchodami i padliną, a także w norach susłów.

Poniższe stanowisko potwierdza aktualne występowanie tego gatunku w Polsce:

- Podlasie: Dubicze Cerkiewne ad Hajnówka (FD63), 28 IV 2004, żwirownia przy trasie Kleszczele – Hajnówka, 2 exx., leg. A. BYK.

Adam BYK, Sławomir MAZUR
Kat. Ochr. Lasu i Ekol. SGGW, Warszawa

402. Pierwsze stwierdzenie *Oreodytes sanmarkii* (C. R. SAHLBERG, 1826) (*Coleoptera: Dytiscidae*) na stanowisku niżowym w Polsce

First record of *Oreodytes sanmarkii* (C. R. SAHLBERG, 1826) (*Coleoptera: Dytiscidae*) on a lowland locality in Poland

KEY WORDS: *Coleoptera*, *Dytiscidae*, new record, biotope, Baltic Coastal Region, N Poland.

Rodzaj *Oreodytes* SEIDLITZ, 1887 jest w Palearktyce reprezentowany przez 13 gatunków, z których trzy w występują Europie. Wszystkie gatunki europejskie cechuje rozmieszczenie borealno-górskie; są szeroko rozsiadane na północy kontynentu, poza nią występują na obszarach górskich. Występują też w Polsce i także u nas podawano je dotąd tylko z regionów górskich i podgórskich, na ogół rzadko i sporadycznie (BURAKOWSKI i in. 1976: *Kat. Fauny Pol.*, Warszawa, XXIII, **4**: 1-307; GALEWSKI, TRANDA 1978: *Fauna słodk. Pol.*, Warszawa–Poznań, **10**: 1-396; PAWŁOWSKI i in. 1994: *OPN*, *Prace Mat. Muz. W. Szafera*, Ojców: 1-247; KUBISZ, SZAFRANIEC 2003: [W:] WOŁOSZYN B. W. i in. (red.): *Monografia Fauny Babiej Góry*. Inst. Ochr. Przyr. PAN, Kraków: 163-221).

Podczas badań prowadzonych na Pobrzeżu Bałtyku udało nam się stwierdzić obecność *Oreodytes sanmarkii* (C. R. SAHLB.):

- Wejherowo (CF25), rzeka Reda na zachodnim skraju miasta, 3 VI 2004, 13 exx., leg. P. BUCZYŃSKI, det. et coll. M. PRZEWOŹNY. Szerokość rzeki 6–8 m, głębokość 10–30 cm (w głęboczkach do 50 cm), woda klarowna, bezbarwna, nurt wolny. Dno w nurcie piasz-