

404. Nowe stanowisko *Aphodius (Phalacronothus) biguttatus* GERMAR, 1824 (*Coleoptera: Scarabaeoidea*) na Wzgórzach Trzebnickich

New record of *Aphodius (Phalacronothus) biguttatus* GERMAR, 1824 (*Coleoptera: Scarabaeoidea*) from Wzgórze Trzebnickie region

KEY WORDS: *Coleoptera, Scarabaeoidea, Aphodius biguttatus*, record, Wzgórze Trzebnickie region, SW Poland.

Obszar rozszedlenia *Aphodius biguttatus* GERM. obejmuje środkową i południową Europę, Kaukaz, Azję Mniejszą i Zakaukazie. W całym areale występowania gatunek jest rzadki. W Polsce notowany był dotąd z 8 stanowisk, rozproszonych w południowej i zachodniej części kraju: dwóch na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej, po jednym na Dolnym Śląsku, Wzgórzach Trzebnickich (Oborniki Śląskie), Wyżynie Krakowsko-Wieluńskiej, Wyżynie Małopolskiej, Wyżynie Lubelskiej, Beskidzie Wschodnim. W okresie powojennym gatunek podany został jedynie ze Śląska oraz z okolic Przemyśla i Częstochowy (BURAKOWSKI i in. 1983: Kat. Fauny Pol., Warszawa, XXIII, 9: 1-294). Pojawia się wiosną, pojedynczo również w sierpniu, na ciepłych stanowiskach w odchodach owiec, kóz i królików; niekiedy znajduje się w przedzionkach nor susłów i lisów. W trakcie badań faunistyczno-ekologicznych na terenie Wzgórz Trzebnickich w miejscowości Jary, autorka odkryła kolejne stanowisko występowania *Aphodius biguttatus*:

– Wzgórze Trzebnickie: Jary ad Oborniki Śląskie (XS38), 17 IV 2004, 1 ex., w odchodach ludzkich, na obrzeżu wilgotnego użytkowanego pastwiska przy granicy lasu mieszanego, leg. et coll. K. ŻUK.

Autorka dziękuje dr. Markowi BUNALSKIEMU za sprawdzenie oznaczenia i potwierdzenie jego poprawności.

Katarzyna ŻUK

Zakł. Bioróżn. i Takson. Ewol. Inst. Zool. U. Wr., Wrocław

405. *Sitaris muralis* (FORSTER, 1771) (*Coleoptera: Meloidae*) – nowe stanowisko w Polsce

*Sitaris muralis* (FORSTER, 1771) (*Coleoptera: Meloidae*) – new record from Poland

KEY WORDS: *Coleoptera, Meloidae, Sitaris muralis*, new record, SE Poland.

*Sitaris muralis* (FORSTER) zaliczany jest do grupy owadów stenotopowych, kserofilnych. Owady doskonale poławiane są najczęściej na skrajach dróg, na murach lub ruinach starych budowli, a także w nasłonecznionych miejscach starych, nie remontowanych domów, kamienic. Imago *S. muralis* pojawia się w końcu lata (najczęściej na przełomie sierpnia i września). Samica składa jaja do gniazd różnych gatunków błonkówek (m.in. z rodzajów: *Andrena* FABR., *Anthophora* LATR., *Colletes* LATR., *Eucera* LATR., *Halictus* LATR., *Nomada* SCOP., *Osmia* PANZ.). Z terenu Polski gatunek ten jako pierwszy wykazał SZULCZEWSKI, na początku XX wieku, z okolic Leszna na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej (SZULCZEWSKI 1922: Prace Kom. Mat.-Przyr. PZPN, B, 3-4: 183-243). Jednak doniesienie to określane jest przez wielu entomologów jako niepewne. Ostatecznie wątpliwości, co do występowania tego gatunku chrząszcza w Polsce, rozstrzygnął J. P. BABULA w 1991 roku, odławiając go w Łańcucie (KUBISZ, SZWAŁKO 1994: Wiad. entomol., 13: 13-19). Zebrano wówczas jeden okaz na