

– Poleski Park Narodowy, Bagno Bubnów (FB59) ad Sęków, 2 VII 1991 – 2 exx., do światła na obrzeżu torfowiska niskiego.

Gatunek nie podawany dotychczas z Polesia Lubelskiego, a w Kotlinie Sandomierskiej odnotowany był ostatnio tylko w okolicach Kolbuszowej.

*Arctia villica* (LINNAEUS, 1758)

– Sandomierz - Kamień Plebański (EB51), 20 VI 2001 – 1 ex., do samolówki świetlnej w środowisku antropogenicznym.

– Świdnik (FB17), 25 VI 1998 – 1 ex., do światła na skraju grądu.

Gatunek znany z Wyżyny Sandomierskiej jedynie z historycznych stanowisk, a z Lubelszczyzny podany ostatnio tylko z okolic Kazimierza nad Wisłą.

*Euplagia quadripunctaria* (PODA, 1761)

– Rybotycze (FA01), 20 VII 1996 – 11 exx., obserwowano w dzień na poboczu drogi leśnej.

– Siedliska (FA31), 15 VII 2001 – 1 ex., w dzień na kwiatach ostrożeńca polnego *Cirsium arvense* (L.) SCOP. w pobliżu rezerwatu „Skarpa Jaksmanicka”.

Gatunek nie podawany z najbliższych okolic Przemysła, a na Pogórzu Przemyskim był notowany w latach 60-tych ubiegłego wieku.

Anna MAZURKIEWICZ, Zakł. Zool. SGGW, Warszawa  
Krzysztof PAŁKA, Inst. Biol. UMCS, Lublin

#### 432. Nowe stanowisko *Eucarta virgo* (TREITSCHKE, 1835) (*Lepidoptera: Noctuidae*) w Polsce \*

A new locality of *Eucarta virgo* (TREITSCHKE, 1835) (*Lepidoptera: Noctuidae*) in Poland

KEY WORDS: *Lepidoptera, Noctuidae, Eucarta virgo*, new locality, N Poland.

W trakcie prowadzenia obserwacji nad motylami Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi” (woj. pomorskie) stwierdzono obecność na tym obszarze, w dwóch kolejnych sezonach *Eucarta virgo* (TREITSCHKE):

– Dębica Kaszubska (UTM: XA42), 13 VI 2003 – 1 ex., 3 VIII 2004 – 1 ex., oba okazy złowiono do światła lampy żarowo-rtęciowej.

Jest to aktualnie najdalej na północ wysunięte stanowisko tego gatunku w Polsce, położone w odległości około 40 km od Morza Bałtyckiego.

Paweł DANLOWSKI, Dębica Kaszubska

\* Druk pracy sfinansowany przez autora.