

430. Nowe dane o dwóch gatunkach motyli (*Lepidoptera: Oecophoridae, Adelidae*) w północnej Polsce *

New records of two species of *Lepidoptera* (*Oecophoridae, Adelidae*) in Northern Poland

KEY WORDS: *Lepidoptera, Oecophoridae, Adelidae*, new records, N Poland.

Na obszarze parku krajobrazowego „Dolina Słupi” (woj. Pomorskie) stwierdzono obecność występowania dwóch interesujących gatunków motyli.

Nemophora congruella (ZELLER, 1839) (*ADELIDAE*)

– Dębica Kaszubska (UTM: XA42), 4 VI 2004, 1 ex, złowiony w przydomowym ogrodzie.

Gatunek ten był wykazywany jedynie z Tatr, Puszczy Białowieskiej i rezerwatu „Jata” koło Łukowa (BARANOWSKI, BARAN 2004: Wiad. entomol., 23, 3: 176).

Batia lambdella (DONOVAN, 1793) (*OECOPHORIDAE*)

– Dębica Kaszubska (XA42), 27 VI 2001, 1 ex, złowiony w godzinach popołudniowych, na skraju lasu mieszanego, przy krzewach żarnowca *Cytisus scoparius* LINK.

W ostatnich latach notowany na Dolnym Śląsku, Ziemi Lubuskiej i w okolicach Władysławowa (Malkiewicz i in. 2004: Pol. Pismo ent., 73, 4: 347-354).

Paweł DANLOWSKI, Dębica Kaszubska

431. Nowe dane o występowaniu rzadkich gatunków *Arctiidae* (*Lepidoptera*) w Polsce

New data on the occurrence of rare species of *Arctiidae* (*Lepidoptera*) in Poland

KEY WORDS: *Lepidoptera, Arctiidae, Chelis maculosa, Pericallia matronula, Arctia villica, Euplagia quadripunctaria*, new localities, Poland.

Niniejsze doniesienie przedstawia wykaz nowych stanowisk, czterech rzadko spotykanych gatunków *Arctiidae*, umieszczonych w „Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt”.

Chelis maculosa (GERNING, 1780)

– rez. „Krzyżanowice” (UTM: DA69), 8 VII 2004 – 1 ex., do światła w środowisku kserotermicznych muraw nagipsowych.

– Pińczów (DB60), 24 VI 2004 – 2 exx., do światła w zbiorowisku roślinności kserotermicznej.

– Sandomierz - Kamień Plebański (EB51), 3 VIII 2001 – 1 ex., do samolówki świetlnej w sąsiedztwie lessowego zbocza z murawą kserotermiczną.

Gatunek znany zaledwie z kilku stanowisk w Polsce, z Poniidzia podawany przed ponad 40 laty, a na Wyżynie Sandomierskiej odnotowany był dotąd tylko z jednego stanowiska w okolicach Dwikoz.

Pericallia matronula (LINNAEUS, 1758)

– Huta Komorowska (EA58), 5 VII 1997 – 6 exx., do samolówki świetlnej na skraju grądu.

– Kotowa Wola (EB60), 1 VII 1997 – 2 exx., do samolówki świetlnej na skraju grądu niskiego.

* Druk pracy sfinansowany przez autora.

- Poleski Park Narodowy, Bagno Bubnów (FB59) ad Sęków, 2 VII 1991 – 2 exx., do światła na obrzeżu torfowiska niskiego.

Gatunek nie podawany dotychczas z Polesia Lubelskiego, a w Kotlinie Sandomierskiej odnotowany był ostatnio tylko w okolicach Kolbuszowej.

Arctia villica (LINNAEUS, 1758)

- Sandomierz - Kamień Plebański (EB51), 20 VI 2001 – 1 ex., do samolówki świetlnej w środowisku antropogenicznym.
- Świdnik (FB17), 25 VI 1998 – 1 ex., do światła na skraju grądu.

Gatunek znany z Wyżyny Sandomierskiej jedynie z historycznych stanowisk, a z Lubelszczyzny podany ostatnio tylko z okolic Kazimierza nad Wisłą.

Euplagia quadripunctaria (PODA, 1761)

- Rybotycze (FA01), 20 VII 1996 – 11 exx., obserwowano w dzień na poboczu drogi leśnej.
- Siedliska (FA31), 15 VII 2001 – 1 ex., w dzień na kwiatach ostrożenia polnego *Cirsium arvense* (L.) SCOP. w pobliżu rezerwatu „Skarpa Jaksmanicka”.

Gatunek nie podawany z najbliższych okolic Przemyśla, a na Pogórzu Przemyskim był notowany w latach 60-tych ubiegłego wieku.

Anna MAZURKIEWICZ, Zakł. Zool. SGGW, Warszawa
Krzysztof PAŁKA, Inst. Biol. UMCS, Lublin

432. Nowe stanowisko *Eucarta virgo* (TREITSCHKE, 1835) (*Lepidoptera: Noctuidae*) w Polsce *

A new locality of *Eucarta virgo* (TREITSCHKE, 1835) (*Lepidoptera: Noctuidae*) in Poland

KEY WORDS: *Lepidoptera*, *Noctuidae*, *Eucarta virgo*, new locality, N Poland.

W trakcie prowadzenia obserwacji nad motylami Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi” (woj. pomorskie) stwierdzono obecność na tym obszarze, w dwóch kolejnych sezonach *Eucarta virgo* (TREITSCHKE):

- Dębica Kaszubska (UTM: XA42), 13 VI 2003 – 1 ex., 3 VIII 2004 – 1 ex., oba okazy złożono do światła lampy żarowo-rtęciowej.

Jest to aktualnie najdalej na północ wysunięte stanowisko tego gatunku w Polsce, położone w odległości około 40 km od Morza Bałtyckiego.

Paweł DANLOWSKI, Dębica Kaszubska

* Druk pracy sfinansowany przez autora.