

## 288. Uwagi o występowaniu *Minyops carinatus* (LINNAEUS, 1767) (*Coleoptera: Curculionidae*) w Polsce

Notes on the distribution of *Minyops carinatus* (LINNAEUS, 1767) (*Coleoptera: Curculionidae*) in Poland

KEY WORDS: *Coleoptera, Curculionidae, Minyops carinatus*, new record, distribution, Poland

*Minyops carinatus* (L.) zamieszkuje Azję Mniejszą, Syrię, Iran, południowe obszary europejskiej części Rosji, Ukrainę, oraz południowe tereny środkowej i zachodniej Europy. Do połowy lat dziewięćdziesiątych morfologia stadiów przedimaginalnych oraz biologia i ekologia tego ryjkowca były nieznane i dopiero prace NAZARENKO (1995: Vest. Zool., 5-6: 81-85.; 1997: Vestn. Zool., 31: 62-66.) wniosły wiele danych z tego zakresu. Wyżej wymieniony autor stwierdził m.in., iż jest to chrząszcz biologicznie związany z roślinami z rodzaju *Ranunculus* – *R. acris* (w hodowli) i *R. polyanthemos* (w terenie).

Przez obszar Polski przebiega północna granica jego zasięgu. Pierwsze informacje o występowaniu tego ryjkowca pochodzą ze Śląska i Tatr. Dane dotyczące pierwszego regionu nie zostały potwierdzone przez ponad 75 lat, a drugiego – uznane za wątpliwe (BURAKOWSKI i in. 1995: Kat. Fauny Polski, XXIII, 20: 1-310.). W okresie powojennym został odnotowany z południowo-wschodniej części kraju przez Cmolucha (1963: Ann. UMCS, sec. C, 17: 17-75.) – Gródek k. Hrubieszowa (Wyżyna Lubelska) i Wanata (1993: Wiad. entomol., 12, 1: 31-36.) – Biała Góra k. Tomaszowa Lubelskiego (Roztocze).

Podczas badań faunistycznych prowadzonych w południowej części Roztocza stwierdzono kolejne stanowisko tego chrząszcza

– Machnów Stary (FA88) - 15 VI 1996, 1♀, leg. R. ROZWĄŁKA.

Odłowiono go do pułapki Barbera w zespole *Origano-Brachypodietum pinnati* występującym na podłożu wapiennym. Ponadto potwierdzono jego obecność na Białej Górze k. Tomaszowa Lubelskiego (2 ex. 13 V 1997). FRANZ i BEIER (1948: Ann. Naturhist. Mus. Wien, 56: 440-549.) uznali go za gatunek termofilny. Kolejne stwierdzenia tego ryjkowca na Roztoczu świadczą o utrzymywaniu się populacji w południowo-wschodniej Polsce oraz potwierdzają jego przywiązanie do siedlisk ciepłych i suchych. Dotychczasowe dane rejestracyjne z obszaru Polski wskazują, że gatunek w zajmowanych przez siebie siedliskach nie tworzy licznych populacji.

Jacek ŁĘTOWSKI, Lublin  
Robert ROZWĄŁKA, Lublin

## 289. Nowe stanowisko *Thera britannica* TURNER, 1925 (*Lepidoptera: Geometridae*) w Polsce

New record of *Thera britannica* TURNER, 1925 (*Lepidoptera: Geometridae*) from Poland

KEY WORDS: *Lepidoptera, Geometridae, Thera britannica*, new record, E Poland.

*Thera britannica* TURNER jest gatunkiem szeroko rozsiadłym w północnej, zachodniej i częściowo środkowej Europie. BUSZKO (2000: Atlas motyli Polski cz. III) podaje *Th. britannica* z południowej części kraju: Sudetów, Sobótki, Gór Świętokrzyskich, Babiej Góry oraz Tatr. Stwierdzony był on też na Pogórzcu Dynowskim i Przemyskim oraz w Bieszczadach