

Wiad. entomol.	20 (3-4): 157-158	Poznań 2002
----------------	-------------------	-------------

Rodzaj *Lepteucosma* DIAKONOFF, 1971 (*Lepidoptera: Tortricidae*) w Europie

The Genus *Lepteucosma* DIAKONOFF, 1971 (*Lepidoptera: Tortricidae*)
in Europe

JÓZEF RAZOWSKI

Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN, ul. Sławkowska 17, 31-016 Kraków

ABSTRACT: *Epinotia huebneriana* KOÇAK is transferred to *Lepteucosma* DIAKONOFF. The latter was to date known from the Oriental Region and Afganistan. The present distribution of the genus is given.

KEY WORDS: *Lepidoptera*, *Tortricidae*, *Lepteucosma huebneriana*, Europe.

Rodzaj *Lepteucosma* DIAKONOFF został utworzony dla pojedynczego orientalnego gatunku *L. oxychrysa* DIAKONOFF, 1971, a następnie scharakteryzowany ponownie (RAZOWSKI 1989) i umiejscowiony w pleminiu *Euco-smini* po rodzaju *Eucosma* HÜBNER, 1825. W katalogu palearktycznych gatunków tego pleminia (RAZOWSKI 1999) zaliczyłem do niego obok wyżej wymienionego gatunku typowego dalsze dwa, *L. lutescens* (RAZOWSKI, 1967) opisany z Afganistanu i *L. cerinodes* (MEYRICK, 1909) z Assamu, który poza Indiami znany jest także z północnego Wietnamu.

Obecnie zaliczam do *Lepteucosma* także *Epinotia huebneriana* KOÇAK, 1980, znany powszechnie pod zajęta nazwą *Tortrix ustulana* HÜBNER, [1811–1813] (nowa kombinacja nazw: *Lepteucosma huebneriana* KOÇAK, 1980 – **comb. n.**). KUZNETZOV (1978) włączył go do rodzaju *Epinotia* HÜBNER ilustrując genitalia samca i podobnie zaliczyłem go do tego rodzaju w katalogu palearktycznych *Euco-smini* (RAZOWSKI 1999). Dokładniejsze zbadanie kil-

ku okazów pozwoliło jednak na zmianę zaszeregowania tego gatunku. Wszystkie cztery gatunki *Lepteucosma* są do siebie zewnętrznie podobne, a różnice w genitaliach są równie niewielkie i ograniczają się głównie do proporcji poszczególnych ich części. Niestety, zbyt skąpe materiały nie pozwalają na wystarczająco dokładne zbadanie. Być może, że część ich to jedynie taksony infraspecyficzne.

L. huebneriana KOÇAK jest szeroko rozsielony w Palearktyce, od Zachodniej Europy po Ural, z wyjątkiem terytoriów północnych. Był łowiony na Zakaukaziu, południowej Syberii, Dalekim Wschodzie Rosji aż po Kuryle, w Korei, północnych Chinach i Japonii. W Polsce nie występuje. Wydaje się, że areal rodzaju jest dosyć zwarty, palearktyczno-orientalny. Potwierdzenia oznaczenia okazów wymaga doniesienie o występowaniu *L. ceriodes* w południowej części Japonii, na Shikoku.

SUMMARY

Epinotia huebneriana KOÇAK is transferred to *Lepteucosma* DIAKONOFF. This genus was known to date as Oriental in distribution and in Palaearctic known from Afghanistan only. Now, the area of distribution of *Lepteucosma* includes also Europe.

PIŚMIENNICTWO

- KUZNETZOV V. I., 1978: *Tortricidae (Olethreutidae, Cochylidae)* – listovertki. [W:] *Opredelitel nasekhomykh evropeiskoi casti SSSR*. Czeshuekrylye, 1. Nauka, Leningrad: 193-680.
- RAZOWSKI J., 1989: The genera of *Tortricidae (Lepidoptera)*. Part II: Palaearctic *Olethreutinae*. *Acta zool. cracov.*, **32** (7): 107-328.
- RAZOWSKI J., 1999: Catalogue of the species of *Tortricidae*. Part V: Palaearctic *Eucosmina* and *Enarmoniina (Insecta: Lepidoptera)*. *SHILAP Revta lepid.*, **27** (108): 437-506.