

Lebia (Lebia) cruxminor (LINNAEUS, 1758)

- Wyżyna Krakowsko-Częstochowska: Kazimierz Dolny - Góry Pierwsze (EB78), 20 VII 1999, 1 ex., leg. R. RUTA.

Gatunek palearktyczny z reguły spotykany rzadko i pojedynczo. Żyje na suchych, otwartych terenach porośniętych roślinnością trawiastą i zielną, na glebach wapiennych, kamienistych i gliniastych. W Polsce znany z większości krain.

Cymindis (Cymindis) angularis (FABRICIUS, 1794)

- Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Piła - Jadwiżyn (XU19), 27 III 1997, 1 ex., leg. R. RUTA.

Chrzaszcz żyjący w Europie Środkowej i południowej części Skandynawii. Znany również z zachodniej Syberii. Spotykany na suchych, piaszczystych i żwirowych glebach o znacznym nasłonecznieniu – najczęściej skąpo porośniętych roślinnością. Z terenu Polski znany z niewielu stanowisk, zawsze rzadko i pojedynczo spotykany.

Autorzy pragną serdecznie podziękować dr Bogusławowi SOSZYŃSKIEMU oraz mgr Agnieszce SOSZYŃSKIEJ za udostępnienie informacji dotyczących dwóch spośród wyżej wymienionych chrząszczy. Okazy dowodowe znajdują się w zbiorach autorów.

Radomir JASKUŁA, Kat. Zool. Bezkręg. i Hydrobiol. UŁ, Łódź
Rafał RUTA, Piła

330. *Synanthedon mesiaeformis* (HERRICH-SCHÄFFER, 1846) (*Lepidoptera: Sesiidae*) gatunek nowy dla fauny Puszczy Białowieskiej

Synanthedon mesiaeformis (HERRICH-SCHÄFFER, 1846) (*Lepidoptera: Sesiidae*)
a clearwing moth new to the fauna of the Białowieża Forest

KEY WORDS: *Lepidoptera, Sesiidae, Synanthedon mesiaeformis*, faunistics, pheromone traps, Białowieża Forest, E Poland.

W trakcie pobytu na XII Europejskim Kongresie Lepidopterologicznym odbywającym się w Białowieży w dniach od 29 maja do 2 czerwca 2000 r. odłowiono nie wykazany dotychczas z Puszczy Białowieskiej gatunek motyla z rodziny przeziernikowatych. Jest nim *Synanthedon mesiaeformis* (HERRICH-SCHÄFFER):

- Puszcza Białowieska: Białowieża - Park Pałacowy (UTM: FD94), 1 VI 2000, samiec odłowiony w lepną pułapkę feromonową. Pułapka była wywieszona w dniach 30 V – 1 VI 2000 w sąsiedztwie starych olch.

Gąsienice *S. mesiaeformis* żerują pod korą starych olch *Alnus glutinosa* GAERTN. Dwukrotnie zimują i przepoczwarzają się w maju w kokonie z drobnych skrawków kory. Motyle pojawiają się od końca maja do początku lipca.

S. mesiaeformis jest szeroko rozsiadlony, notowany był z Finlandii, Litwy, Estonii, Węgier, Rumunii, Bułgarii, Jugosławii, Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, Macedonii, Francji, Grecji, Turcji, Ukrainy, południowo-zachodniej Rosji i z północnego Kazachstanu.

W naszym kraju omawiany gatunek przeziernika wykazywany był dotychczas z nielicznych stanowisk na obszarze Polesia Lubelskiego, Roztocza, Pojezierza Mazurskiego, Puszczy Kozienickiej i Spały koło Tomaszowa Mazowieckiego.

Marek BĄKOWSKI, Zakł. Zool. Syst. UAM, Poznań (Polska)
Nils RYRHOLM, Uppsala (Szwecja)