

322. Nowe stanowiska *Pselaphinae* (Coleoptera: Staphylinidae) we wschodniej Polsce

New localities of *Pselaphinae* (Coleoptera: Staphylinidae) in Eastern Poland

KEY WORDS: *Coleoptera*, *Staphylinidae*, *Pselaphinae*, faunistics, E Poland.

Niniejsze doniesienie jest kontynuacją wcześniej rozpoczętych badań faunistycznych autora nad *Pselaphinae* wschodniej Polski (STANIEC 2001, Wiad. entomol., 19: 197-198). Niżej podano nowe stanowiska dwunastu gatunków należących do wymienionej podrodziny kusakowatych. Wszystkie odnotowane taksony są nowymi dla poszczególnych krain zoogeograficznych, zostały złowione przez autora i znajdują się w jego zbiorach.

Biblopectus ambiguus (REINCHENBACH, 1816)

- Podlasie: Wołczyń (FC80), 14 V 2001, 3 exx.; wysiane ze ściółki lasu łągowego w dolinie Bugu.

W Polsce nie często notowany.

Euplectus brunneus (GRIMMER, 1841)

- Podlasie: Poleski Park Narodowy, Pieszowola (FC40), 21 IX 2001, 1 ex.; znaleziony w dziupli 100–150 letniego dębu szypułkowego (*Quercus robur* L.), rosnącego w starej dąbrowie.

W kraju znany z nielicznych stanowisk w kilku krainach.

Euplectus karstenii (REICHENBACH, 1816)

- Podlasie: Rozpłucie (FB39), 21 VI 2001, 1 ex.; w dziupli lipy szerokolistnej (*Tilia platyphyllos* SCOP.)
- Wyżyna Małopolska: Golejów (EA19), 8 VIII 2000, 1 ex., znaleziony w mrowisku *Formica rufa* L. w borze sosnowym.

W Polsce chrząszcz dość często spotykany.

Euplectus kirbii DENNY, 1825

- Wyżyna Lubelska: Milejów (FB37), 7 III 2000, 1 ex.; w próchnie samotnie rosnącego kłonu pospolitego (*Acer platanoides* L.).
- Nizina Sandomierska: Wólka Biska (FA18), 4 VIII 2000, 1 ex.; złowiony w dziupli martwej, pojedynczo stojącej lipy drobnolistnej (*T. cordata* MILL.).
- Wyżyna Małopolska: okolice Golejowa (EA19), 8 VIII 2000, 2 exx.; znalezione w mrowisku *Formica rufa* w borze sosnowym.

W Polsce gatunek bardzo mało znany, do niedawna odnotowany jedynie ze Śląska Górnego, a ostatnio podany również z Puszczy Białowieskiej.

Euplectus nanus (REICHENBACH, 1816)

- Podlasie: Pieszowola (FC40), 8 VI 2001, 2 exx.; wysiane z próchna około 200-letniego dębu szypułkowego (*Q. robur*).

W kraju chrząszcz znany z kilkunastu krain.

Saulcyella schmidtii (MÄRKEL, 1844)

- Podlasie: Rozpłucie (FB39), 21 VI 2001, 1 ex.; wysiany z próchna samotnie rosnącej lipy szerokolistnej (*T. platyphyllos*).
- Wyżyna Lubelska: Łysołaje (FB37), 4 IX 2001, 1 ex.; w próchnie jesionu wyniosłego (*Fraxinus excelsior* L.), rosnącego w parku podworskim.
W kraju gatunek znany z nielicznych stanowisk w kilku krainach.

Batrisodes adnexus (HAMPE, 1863)

- Wyżyna Lubelska: Łysołaje (FB37), 4 IX 2001, 1 ex.; złowiony w próchnie płatanu klonolistnego (*Platanus acerifolia* WILLD.) w parku podworskim; Zalesie Kańskie (FB56), 18 X 2001, 1 ex.; wysiany z próchna wyjętego z dziupli blisko stuletniego dębu szypułkowego (*Q. robur*) rosnącego w grądzie.
W Polsce takson rzadko spotykany, dotychczas podany z kilku krain, a ostatnio wykazany z Bieszczadów i Puszczy Białowieskiej.

Batrisodes delaporti (AUBÈ, 1833)

- Wyżyna Lubelska: Ciecchanki Łańcuchowskie (FB37), 31 V 2001, 2 exx., w próchnie lipy drobnolistnej (*T. cordata*) zasiedlonej przez mrówki *Lasius* sp.
- Podlasie: Pieszowola (FC40), 8 VI 2001, 1 ex., wysiany z próchna dębu szypułkowego (*Q. robur*) w parku podworskim.
Znany z nielicznych stanowisk w kilkunastu krainach.

Batrisodes venustus (REICHENBACH, 1816)

- Podlasie: Pieszowola (FC40), 8 VI 2001, 1 ex.; wysiany z próchna dębu szypułkowego (*Q. robur*) w parku podworskim.
Znany z kilkunastu krain.

Bythinus burrelli DENNY, 1825

- Podlasie: Stary Bubel (FC58), 25 VII 2000, 2 exx., wysiane ze ściółki w wilgotnym wąwozie, porośniętym lasem liściastym, w dolinie Bugu.
W kraju chrząszcz znany z nielicznych stanowisk, w większości przypadkach podanych w XIX wieku, a ostatnio wykazany również z Puszczy Białowieskiej.

Bryaxis curtisii (LEACH, 1817)

- Wyżyna Lubelska: Parchatka (EB89), 26 IV 2000, 1 ex., wysiany ze ściółki w wilgotnym wąwozie porośniętym lasem grądowym.
Znany z nielicznych stanowisk.

Bryaxis nigripennis (AUBÈ, 1844)

- Wyżyna Lubelska: Kazimierz Dolny (EB68), 8 V 1997, 1 ex.; wysiany ze ściółki w wilgotnym, ocienionym wąwozie w grądzie.
- Roztocze: Guciów (FB40), 11 V 2001, 2 exx.; wysiane ze ściółki w lesie bukowym.
W Polsce owad dość rzadko łowiony, znany dotychczas z kilku krain.

Bernard STANIEC, Zakł. Zool. UMCS, Lublin