

znaleziska w Legnicy i w nadleśnictwie Przerwanki w Puszczy Rominckiej (BURAKOWSKI, ŚLIPIŃSKI 1986: Klucze oznacz. Owad. Pol., XIX, 59: 1-86). To ostatnie stanowisko, znajdujące się na terenie Pojezierza Mazurskiego, było jak dotychczas jedynym znanym miejscem występowania *S. separanda* w Polsce północnej. Gatunek ten niedawno został odnaleziony także w północno-zachodniej części kraju:

- Pojezierze Pomorskie: Cedynia vic. (UTM: VU45), 29 IV 2010, poczwarka pod korą silnie rozłożonej kłody brzoźowej na otwartym, nasłonecznionym stanowisku, wyhodowano imago (V 2010), leg. P. JAŁOSZYŃSKI et P. SIENKIEWICZ, coll. P. JAŁOSZYŃSKI.

Paweł JAŁOSZYŃSKI, Poznań

Paweł SIENKIEWICZ, Katedra Ochr. Środ. Przyr. UP, Poznań

520. Uwagi o zimowaniu imago Gracillariidae (Lepidoptera) w skrzynkach lęgowych w Polsce

Remarks on overwintering of adults of Gracillariidae (Lepidoptera) in nesting boxes in Poland

KEY WORDS: Lepidoptera, Gracillariidae, nesting box, overwintering.

Spośród krajowych przedstawicieli rodziny Gracillariidae ponad 20 gatunków zimuje w stadium imago.. Dotychczas opublikowano bardzo niewiele informacji na temat miejsc ich zimowania. Najczęściej wymieniane były słomiane strzechy lub zimozielone krzewy. Niektóre gatunki spotykano także na oknach w nieogrzewanych pomieszczeniach, np. na strychach budynków.

Podczas czyszczenia skrzynek lęgowych dla nurogęsi (*Mergus merganser* L.) w dniu 14 grudnia 2007, w Porcie Drzewnym w Toruniu (CD37), połączonego z kontrolą ich zasiedlenia, stwierdzono zimowanie w skrzynkach czterech gatunków motyli z rodziny Gracillariidae. Były to: *Phyllonorycter pastorella* (ZELL.), *Ph. comparella* (DUP.), *Ph. populifoliella* (TREIT.) i *Phyllocnistis unipunctella* (STEPH.). Prace przeprowadzono na plantacji topolowej oraz w szpalerze topól rosnących wzdłuż Wisły. Łącznie skontrolowano około 40 skrzynek. Zimujące motyle znaleziono tylko w jednej z nich. Skrzynka w której zimowały motyle zawieszona była na topoli kanadyjskiej (*Populus × canadensis* MOENCH), na wysokości około 7 m. Skład gatunkowy motyli zgodny jest z występowaniem roślin pokarmowych w otoczeniu. Należy uznać, że obecność zimujących Gracillariidae w skrzynkach lęgowych dla ptaków jest raczej przypadkowa i uwarunkowana specyficznymi warunkami środowiska w jakim znajduje się dana skrzynka.

Jarosław BUSZKO, Bartłomiej PACUK
Inst. Ekol. i Ochr. Środ. UMK, Toruń