

CHIMABACHIDAE

- *Dasytroma* [= *Dasystoma*] *salicella* (HBN.)*: Truskaw (DC89), 3 IV 2003 – 1 ♂, odłowiony w ciągu dnia na śródleśnej łące, leg. C. BYSTROWSKI.

MOMPHIDAE

- *Mompha divisella* H.–S.*: Warszawa - Ursynów (EC07), 8 V 2008 – 1 ♀; Sękocin (DC97), 15 X 2008 – 1 ♂; Falenty (DC97), 17 X 2008 – 1 ♂, leg. J. HILSZCZAŃSKI, odłowione na ścianach budynków, wewnątrz pomieszczeń.

GELECHIIDAE

- *Caryocolum alsinella* (ZELL.)*: Warszawa - Ursynów (EC07), 9 VII 2008 – 1 ♀, zwabiona do światła lampy.

Za nowe dla województwa mazowieckiego uznano gatunki niewymienione z tego województwa w opracowaniu pod redakcją BUSZKO i NOWACKIEGO (2000: Pol. entomol. Monogr., 1: 1-178). Gatunki te wyróżniono gwiazdką [*].

Tomasz JAWORSKI, Zakł. Ochrony Lasu IBL, Sękocin Stary

537. *Proserpinus proserpina* (PALLAS, 1772) (Lepidoptera: Sphingidae)
– nowe stanowisko w zachodniej Polsce

Proserpinus proserpina (PALLAS, 1772) (Lepidoptera: Sphingidae) – a new locality in western Poland

KEY WORDS: Lepidoptera, Sphingidae, *Proserpinus proserpina*, new locality, W Poland.

Postojak wiesiołkowiec – *Proserpinus proserpina* (PALLAS) jest gatunkiem stosunkowo rzadko notowanym w Polsce. Większość współcześnie znanych stanowisk znajduje się w południowo-wschodniej części kraju. W ostatnich latach notowany był również na kilku stanowiskach w zachodniej Polsce (BUSZKO 2004: [W:] GŁOWACIŃSKI, NOWACKI (red.): Polska czerwona księga zwierząt, Bezkręgowce. IOP PAN Kraków, AR, Poznań: 232-233). Gatunek prawnie chroniony i umieszczony w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt w kategorii LR (gatunki niższego ryzyka). Objęty także Konwencją Berneńską i Dyrektywą Siedliskową (program Natura 2000).

Gąsienice tego gatunku spotykane są w różnorodnych środowiskach, zarówno naturalnych czy półnaturalnych, jak i antropogenicznych. Motyle aktywne są głównie o zmierzchu i w nocy, choć latające osobniki obserwowano także w ciągu dnia.

Nowe stanowisko tego gatunku odkryto w Wielkopolsce, w okolicach Poznania:

- Rokietnica (UTM: XU11), 30 VII 2009, ogród przydomowy, 1 gąsienica na trawniku.

Na podanym stanowisku rośnie jedna z roślin pokarmowych – wiesiołek, na której prawdopodobnie żerowała larwa. Gąsienice obserwowano również w roku 2008.

Stwierdzenie *P. proserpina* w ogrodzie przydomowym świadczy o tym, że gatunek ten może rozwijać się również w środowisku zurbanizowanym, jeśli tylko występują tam odpowiednie warunki.

Dokumentacja fotograficzna znajduje się w zbiorach Darii BAJERLEIN.

Urszula WALCZAK, Wydz. Biologii UAM, Zakł. Zool. Systemat., Poznań

Daria BAJERLEIN, Wydz. Biologii UAM, Zakł. Takson. i Ekol. Zwierząt, Poznań