

Zu der
Öffentlichen Entlassung
aller Klassen
des
Königlichen Gymnasiums zu Matibor
und der
Entlassung des Abiturienten
den 5. und 6. April
lade ergebenst ein
das Lehrer - Collegium.



Inhalt:

1. Grundlage zur Kenntniß der Orthopteren (Gradflügler) Oberschlesiens und Grundlage zur Kenntniß der Käfer Oberschlesiens sc. (Progr. 1846.) Erster Nachtrag. Vom Oberlehrer Kelch.
2. Schulnachrichten vom Prorektor Guttmann.

Matibor, 1852.

Druck von Böger's Erben.

tel. Raife pfriemlich, stumpf. Legescheide halbrund, oben gerade. Mittelbrust fast halbrund. Hinterbrust halbmondförmig, beide am Hinterrande winkelig ausgeschnitten. Foramen (dieöffnung am Grunde der Vorderbeine bei mehreren Locustinen) offen.

Gryllotalpina Fieb. nov. Fam. Die 3 Paar Beine ungleich gestaltet, die vorderen zum Graben, Hinterschenkel keulich, zum Hüpfen. Fußglieder 3 an allen Beinen. Fühler peitschenförmig. Decken häufig mit Rippennehz. Geschlechtsunterschiede bisher nur in den Decken bemerkbar. Raife mas. und fem. pfriemenförmig.

Xydea Fieb. nov. Fam. Die 3 Paar Beine ungleich gestaltet, die vorderen zum Graben, Hinterschenkel stark, breitgedrückt, zum Hüpfen. Vorder- und Mittelfüße 3 gliedrig. Hinterfußglieder verlumpt. Hinterschienbeinende mit 2 Reihen Lamellen. Fühler perlenschnurartig. Decken pergamentarisch, ohne Rippennehz. Flügelrippen durch eine einzige Reihe Quernerven verbunden, Vorderfeld mit lederartigem Ende. Fem. mit Legestachel.

PANSTWOWE
MUZEUM ZOOLOGICZNE
BIBLIOTEKA
K. 7088

I. Pentamera.

1. Caraboidea.

1. Cicindela. L.

1. littoralis F. Bisher nur einmal vom H. Buchhalter Ellenberger (47.) am sandigen Rande eines Kieferwaldes b. Gleiwitz in 3 Ex. gfgn. Btschr. 49. p. 45.

3. *Tarus* Clairv. (Cymindis Latr.)

1. *flavomarginata* Ltzr. Am Altvater-Gebirge, sfn. (Ltzr.) Btschr. 50. p. 100.
2. *homagrlica* Dfts. Am südlichen Abhange d. Altvater-Gebirgs, sfn. (Ltzr.) Btschr. 50. p. 101.

3/4. Demetrias. Bon.

1. *imperialis* Mgl. Leobschütz. (Schramm.) Btschr. 50. p. 105.
2. *unipunctatus* Crtz. Borutin b. R., sfn. (Zb.) Btschr. 50. p. 104.

4. Dromius Bon.

1. *pallipes* Dj. Bis jetzt nur v. H. Zb. im April a. d. Rande eines Teiches, unfern Borutin b. R., gfgn. Btschr. 50. p. 111.

5. Lebia Latr.

1. *crux minor* F. 7. 47. Rauden, auf Hyperperforatum. (Cz.)

6. Brachinus Web.

1. *explodens* Dfts. 7. Guldau b. Beschen, auf thonigen Leckern. (Ltzr.) Uebers. 47. p. 102.

9. Cyphrus Web.

1. *elongatus* Hoppe. (var. v. *C. rostratus* L.) Ustron. (Ltzr.) Uebers. 50 p. 69.

13. Leistus Fröhl.

1. *rufomarginatus* Dfts. 7. 45. Ustron, 3 Ex. an d. steilen Wege nach der großen Czantory.

14. Nebria Latr.

1. *Jockischii* St. Im Thale der Oppa und der Neißer-Biele. Btschr. 49. p. 61.

17. Elaphrus F.

1. *Ullrichii* Bdtb. (smaragdinus Knl.) R., an feuchten, schlammigen Ufern d. Od., d. sfn.

22. Chlaenius Bon.

1. *spoliatus* F. Ende Mai 47 am Oberufer, oberhalb R., 1 Ex. mit *Nebria livida* zusammen. Später hat der Strom diesen Theil des Ufers zerstört.

24. Licinus Latr.

1. *silphoides* F. 11. 51. a.d. Dr.-D. b.R., 1 Ex.
32. *Anchomenus* Bon.

1. *angusticollis* F. var. *rugosus*. Herbst 51. bei Rauden, 1 Ex. (Dr. R.)

2. *livens* Gyll. 6. 48. Auf d. Wdke. 1 Ex.
38. *Amara* Bon.

1. (Acrodon Zmr.) *brunnea* Gyll. 4. 47. Rau- den, Schlawenzitz, im Park um Bmfst., z. sltn.
41. *Harpalus* Latr.

1. (Ophonus Zieggl.) *subulicola* Pz. 7. R., beim Buchthause, unter Steinen, sltn. (Zickler.)

2. *confusus* Dj. R., mit aeneus zusammen, z. hfg.
43. *Bradyceillus* Er.

1. *rufithorax* Shlb. 6. R., um Bmfst., sltn.
2. *rufulus* Dej. 7. R., Ob., unter Haidekraut 3 Ex.

3. *similis* Dj. Er. 4. R., Kupp., unt. Moos, sltn.
45. *Bembidium* Latr.

1. (Tachys Mgl.) *pallipes* Mgl. Ustron a. d. Weichsel. (Ltzr.). Uebers. 47. p. 103.

2. (Tachys Mgl.) *lucidum* St. R., Ob., unter Moos, sltn.

3. (Bemb.) *metallicum* St. 6. R., 3 Ex., dürfte doch wohl nur die glänzende Var. von *aerosum* Er. sein.

4. (Peryphus Mgl.) *obsoletum* Dj. (*cursor* F.) 7. R., a. d. Ob., sltn.

5. (Peryphus Mgl.) *brunnipes* Dj. (*ruficornue* St.) 7. R., Ob., unt. Steinen, sltn.

6. (Peryphus Mgl.) *splendidulum* St. 7. 46. R., a. d. Ob., nach einer Ueberschwemmung, sonst s. sltn.

7. (Leja Mgl.) *Sturmii* Pz. 6. 7. R., a. d. Ob., z. sltn.

8. (Leja Mgl.) *bipustulatum* Rdtb. 6. 7. R., Ob., Chnst., Ob., unter Moos und auf schlammigem Boden, hfg.

II. Hydrocantharida.**1. Haliplus Latr.**

1. *cinereus* Aubé. 7. 8. R., in Wassergräben, hfg.

2. *lineatocollis* Mrsh. Desgleichen, weniger hfg.

9. Agabus Leach.

1. *Kotschy* Ltzr. Ende Mai am Tuß b. Ustrois. (Ltzr.) Uebers. 48. p. 95.

13. Hydroporus Clairv.

1. *inaequalis* F. 5—7. R., in Wassergräben, z. hfg.

2. *erytrocephalus* L. 5—8. Desgl., aber seltener

3. *nitidus* St. 6. 47. R., Desgl., s. sltn.

4. *tristis* Pk. 5—7. Desgl., jedoch z. sltn.

5. *angustatus* St. Desgl., z. sltn.

14. Gyrinus.

1. *marinus* Gyll 7. 51. R., auf d. Teiche bei R.= Hammer und dem Grabowicz b. Kempa, s. hfg.

2. *opacus* Shlb. Desgl., jedoch weniger hfg. Die Uebergänge der beiden Arten machen die Scheidung ungemein schwer und es bleiben bei großen Massen immer eine Anzahl Ex. übrig, die sowohl zu der einen als zu der anderen Art gestellt werden könnten.

III. Brachelytra.**3. Falagria Leach.**

1. *sulcata* Gr. 8. 46. R., a. d. Ob. im lehmigen Ufer, z. sltn.

6. Calodera Mrhm. Er.

1. *humilis* Er. 6. 47. R., nach einer Ueberschwemmung in einem Seitengraben der Oder, (beim Schießhause) z. hfg.

8. Phlaeopora Er.

1. *reptans* Gr. 5. Jakobswalde, unt. Rinde, sltn. (Th.)

9. Homalota Mrhm.

1. *gracilicornis* Er. 6. R., unter Moos, sltn.

2. *linearis* Gr. 6. 47. R., im Weidenmulm zw. d. Ob. und d. Dr.-D., sltn. (Th.)

3. *plana* Gyll. 7. R., unter Moos, sltn.

4. *tenuis* Heer. 6. R., Ob., unt. Moos, sltn.

5. *luteicornis* Er. 6. R., Chnst., unt. Moos, sltn.

4. *flavipes* Gr. 7—10. R., unter Form. fuliginosa, b. Kobilla unt. Form. rufa, hfg.

7. *anceps* Er. 10. 51. R., b. Kobilla, in einem Ameisenhaufen, (F. rufa) s. hfg.

8. *cinnamomea*. Gr. Herbst, in Pilzen, s. sltn. (Th.)

9. *orbata*. Er. 6. R., Ob., unt. Moos, z. sltn.



10. Oxypoda Mrhm.

1. *umbrata* Gyll. 5. R., Zw. unt. Moos, sltn. (Th.)
2. *familiaris* Ksw. 6. 7. R., Zworkau, im austießenden Saft der Eichen, z. sltn.
3. *formicetica* Mkl. 10. 51. R., b. Kobilla, in einem Ameisenhaufen (*F. rufa*), z. hfg.
4. *lentula* Er. 6. R., unt. Moos, sltn. (Th.)

11. Aleochara Gr.

1. *ruficornis* Gr. 4-6. 50. R., Ob., unt. Moos, faulen Pilzen u., sltn.

13/14. Placusa Er.

1. *infima* Er. 5-7. R., Jakobswalde, Ustron, unt. Moos, Kiefernrinde u., z. sltn.

17. Myllaena Er.

1. *dubia* Gr. 10. 51. R., b. Kobilla, in einem Ameisenhaufen (*F. rufa*), z. sltn.

21. Tachinus Gr.

1. *elongatus* Gyll. Ende Mai 47. b. Ustron. (Ltzr.) Uebef. 48. p. 96.

22. Boletobius Leach.

1. *cingulatus* Mrhm. 9. 46. R., Ob. unt. Moos, um Eichen, sltn. (Th.)
2. *trinotatus* Er. 8. 46. R., Ob., unter Pilzen, sltn.

25. Xantholinus Er.

1. *fulgidus* F. 5. 47. R., Zworkau, in Lohhaufen, hfg. (Th.)
2. *suturatus* Schm. 5. Ustron, sltn.

29. Philonthus Leach.

1. *cinerascens* Gr. 6. R., unt. Moos, sltn.

31. Quedius Leach.

1. *attenuatus* Gyll. 6. R., unt. Moos, sltn.

36. Lathrobium Gr.

1. *rufipenne* Gyll. 7. R., Ob., unt. Moos, sltn.

41. Paederus Gr.

1. *limnophilus* Er. 5-7. R., an der Ob., nicht hfg. — Ende Mai 47. b. Ustron an d. Weichsel. (Ltzr.) Uebef. 48. p. 96.

43. Stenus Latr.

1. *canaliculatus* Gyll. 7. R., auf schlammigem Boden, Zworkau, im austießenden Saft der Eichen, z. sltn.

2. *nigritulus* Gyll. 7. R., an d. Ob., sltn.

46. Oxytelus Gr.

1. *complanatus* Er. 7. R., in Döbken., sltn.

49. Trogophloeus Mrhm.

1. *exiguus* Er. 4. R., an d. Ob., Altendorf, im feuchten Lehmb., sltn.

54. Anthophagus Gr.

1. *alpinus* F. Ende Mai 47. b. Ustron. (Ltzr.) Uebef. 48. p. 96.

59. Lathrimaeum Er.

1. *fusculum* Er. 5-7. R., unt. Moos, auf Bl., z. sltn.

2. *canaliculatum* Er. 6. Bsch., auf Bl., sltn.

60. Omalium Gr.

1. *inflatum* Gyll. 7. R., Zworkau, im austießenden Saft der Eichen, z. hfg.

63. Megarthrus Kby.

1. *sinuatocollis* Boisd. et Lac. 6. R., in Pilzen, sltn.

IV. Sternoxa.**14. Cratonychus Dej.**

1. *rufipes* Hbst. R., zu sehr verschiedener Zeit und an eben so verschiedenen Orten, nicht sltn; aber immer vereinzelt.

19. Limonius Eschs.

1. *minusculus* Dej. 7. 51. R., 1 Ex. auf einem Holzstielage.

20. Cardiophorus Eschs.

1. *ruficollis* L. 5. Jakobswalde, auf jungen Kiefern, z. sltn.

2. *cinerereus* Hbst. Desgl.

21. Ampedus Grm.

1. *lythropterus* Grm. 5-8. R., Rauden, meist in faulen Kieferstäben, nicht hfg.

2. *elegantulus* Sch. 7. 8. R., an Klafern auf Holzstielagen, z. sltn.

3. *erythrogramus* Grm. Im Herbst, b. Rauden, in faulen Kieferstäben, sltn. (Dr. R.)

4. *scrofa* Grm. Desgl.

28. Sericosomus Serv.

1. *tibialis* Lap. 5-7. R., Kupp, Jakobswalde, an jungen Kiefern, mit brunnea und fugax zusammen, z. hfg.

31. Adrastus Mgl.

1. *humilis* Er. 7. R., auf Bl., sltn.
2. *pusillus* F. Desgl.

V. Malacodermata.**2. Elodes** Latr. (Cyphon Pk.)

1. *marginata* F. 6—8. R., auf Bl., z. sltn.
3. *scyrtes* Jll.

2. orbicularis Pz. 5. R., unt. Moos, sltn.**9. Telephorus** De G.

1. *violaceus* Pk. 7. Ustron, s. sltn. — 47. auch von H. Ltzr. gfgn. Uebers. 48. p. 96.
2. *rufescens* Ltzr. n. sp. Im Gesenke. Uebers. 46. p. 76.

11. Malthinus Latr.

1. *maurus* Lap. 5—8. R., Db., a. d. Db., Pv., auf Bl., nicht sltn.

VI. Xylotrog.i.**2. Opilio** Latr.

1. *domesticus* St. R., zu sehr verschiedenen Zeiten, im trockenen Holze, in Stuben u., nicht sltn., jedoch immer nur vereinzelt.

5. Corynetes Hbst.

1. *rufipes* F. 5. R., unter Moos, um Bmst., s. sltn.

9. Xyletinus Latr.

1. *ater* Pz. 6. R., auf Holzschlägen, sltn.
2. *nicotiana* Bach. R., in Barinas-Rollen, oft s. hfg.; ob auch in anderen Tabaken, z. B. Dhlauer u., habe ich noch nicht ermitteln können.

11/12 Dryophilus Chevr.

1. *pusillus* Gyll. 7. 8. Kupp., z. sltn.

13. Ptinus L.

1. *latro* F. R., in Möbeln, jedoch sltn.
2. *crenatus* F. Desgl.

14. Scydmaenus Latr.

1. *rufus* M. et Kz. 7. R., Tworkau, in Lohhaufen, sltn. (Th.)
2. *Motschulskii* St. 7. R., Stw., unt. Moos, sltn. (Th.)
3. *rutilipennis* M. et Kz. Desgl.
4. *pusillus* M. et Kz. R., im Stw., unt. Moos, s. sltn. (Th.)

VII. Clavicornia.**1. Necrophorus** F.

1. *ruspator* Er. Unter Laas, in besonders dazu angelegten und mit todtten Maulwürfen u. versehenen Gruben, jedoch nie hfg.

6. Catops Pk.

1. *nigricans* Spc. 7. R., Db., unt. Moos, z. sltn.
2. *fuliginosus* Er. 5—7. R., Db., unt. Laub, mit Myrmidonien zusammen, z. sltn.

12. Epuraea Er.

1. *bisignata* St. 7. R., auf Bl., z. sltn.

2. variegata Hbst. Desgl.

3. *oblonga* Hbst. 7. R., Tworkau, auf Sp. ulmaria, z. hfg.

14/15. Ipidia Er.

1. *4-notata* F. 5—8. R., Lobsanau, Ustron, unter Rinde an faulen Stöcken, z. sltn.

16/17. Pria Krb.

1. *dulcamarae* Jll. 7. Rauden, auf Sol. dulcamara, jedoch sltn. (Cz.)

19. Cydramus Kug.

1. *4-punctatus* Hbst. 6—8. R., auf Sp. ulmaria, z. sltn.

2. fungicola Heer. Desgl., aber häufiger.

26. **Cryptophagus** Hbst.

1. *pubescens* St. R., Stw., unt. Moos, sltn. (Th.)

32. Dermestes L.

1. *vulpinus* F. 6. R., im angeschwemmten Gem., 6. Ex.

2. *Ianiarius* Jll. 5—8. R., Desgl., z. hfg.

33/34. Tiresias Steph. (Megatoma Hbst.)

1. *serra* F. In feuchten Stuben, wo alte Möbel stehen, jedoch z. sltn.

40. Saprinus Er.

1. *piceus* Pk. Mitte Oktober 51. R., bei Kobilla in einem Ameisenhaufen (Form. rufa) 10 Ex. gfgn.

43. Byrrhus L.

1. *ornatus* Pz. var. *glabratus* Heer. 7. 47. von H. Ltzr. b. Ustron gfgn. Uebers. 48. p. 96.

48. Parnus L.

1. *Viennensis* Heer. 5—8. R., auf schlammigem Boden an Flüssen und Zeichen, z. hfg.

49. Heterocerus F.

1. *marginatus* F. 6—8. R., besonders a. d. Db.,

- am Rande stehender Gewässer, auf schlammigem Boden, s. hfg.
2. *hispidulus* Ksw. Desgl., aber nicht hfg.
 3. *sericans* Ksw. Im Sommer 46. 47, a. d. Ob. s. hfg.
 4. *fusculus* Ksw. Wie 2.
 5. *pulchellus* Ksw. Desgl., aber s. sltn.

VIII. Palpicornia.

1. *Helophorus* F.

1. *biguttatus* St. 6. R., auf Schlamm, sltn.
3. *Berosus* Leach.
1. *luridus* F. 5—7. R., in Wassergräben, z. sltn.
13. *Cereyon* Leach.
1. *granarium* Er. 7. Ustron, auf Hutungspläßen, unt. Dgr., sltn.

IX. Lamellicornia.

3. *Aphodius* Jll.

1. *ater* De. G. 7—9. R., auf Hutungspläßen, z. sltn.
2. *granarius* L. 6—8. R., a. d. Ob., im Dgr., nicht hfg.
3. *foetidus* F. Im Herbst, bei Rauden, sltn. (Dr. R.)
4. *plagiatus* L. Wie 1.
5. *sticticus* Pz. 7. Ustron, auf Hutungspläßen, aber nur einige Ex.; von H. Ltzr. auch an den Vorbergen des Gesenkes gfgn. Uebers. 48. p. 98.
6. *depressus* Kug. 5. R., a. d. Obk., z. sltn.
- 6/7. *Psammodius* Gyll.
1. *sulcicollis* Jll. 5—8. R., Ustron, z. sltn.
15. *omaloplia* Mgl.
1. *ruricola* F. 6. R., Dirschel, auf Wiesen von niedrigen Weiden geklopft, z. sltn.

16. *Hoplia* Jll.

1. *praticola* Dfts. Ende Mai, in d. Ob., von niedrigem Laubholz geklopft, z. sltn.

21. *Cetonia* F.

1. *metallica* F. 6—8. R., in Gärten, auf Spiranen und Rosen, nicht hfg.

II. Heteromera.

I. Melasomata.

1. *Blaps* F.
1. *obtusa* F. 7. R., Ustron, in feuchten Stuben, Kellern u. z. sltn.

II. Taxicornia.

2. *Leiodes* Latr.
1. *humeralis* F. 6. R., in einem Weidenstock, s. sltn. (Th.)
8. *Sarrotrium* Jll.
1. *muticum* Latr. (*clavicone* L.) 10. Rauden, auf und unt. Steinen, z. sltn. (Cz.)

III. Tenebrionida.

Bor 1. *Eustrophus* Jll.

1. *dermestoides* Hellw. 10. Rauden, in Holzschwämmen, z. hfg. (Dr. R.)
- 3/4. *Dircea* F.
1. *discolor* F. (*laevigata* Hellw.) Im Herbst 1851 b. Rauden eine Anzahl aus faulen Kieferstäcken herausgegraben. (Dr. R.)
- 6/7. *Pytho* F.
1. *depressus* L. 4. 49. Rauden, unt. der Rinde von Kieferstäcken, z. sltn. (Cz.)

IV. Helopida.

4. *Cistela*.

1. *ceramboides* L. 5. 47. R.-Hammer, einige Ex. an Kieferklästern.
2. *rufipes* F. 7. Im Leobschützer Stadtwald, sltn. (Th.)
3. *murina* L. 6—8. R., am LehNST. Teichrande auf Wasserpflanzen, z. sltn.

V. Trachelida.

5. *Mordella* F.

1. *biguttata* Zgl. 6—8. R., und im Geb., auf Bl., nicht sltn.
2. *attenuata* Ahr. Desgl., jedoch seltener.
3. *pusilla* Rdtb. 5—7. R., Kupp, auf Bl., s. sltn.

4. *brunnea* F. 6—8. R., Lhnst., Zworfau, besonders auf Sp. *ulmaria*, s. hfg.

6. *Anaspis* Geoffr.

1. *lateralis* F. 5—7. R., R.-Hammer, auf Bl., z. sltn.

VI. Cantharida.

1. *Meloë* L.

1. *scabriusculus* Er. Im Spätherbst, a. d. Dr.-D., über den Weg laufend, jedoch sehr vereinzelt.

2. *rugosus* Mrsh. Desgl.

3. *coriarius* Hoffmg. Desgl.

VII. Stenelytra.

6/7. *salpingus* Ill.

1. *ater* Pk. 3. R., Stw., unt. Moos, um Eichenstämme, z. sltn.

III. Tetramera.

I. Rhynchopora.

1. *Bruchus* L.

1. *pisi* L. 6—8. R., auf Glockenbl., z. sltn.

2. *sertatus* Schh. 6. 7. R., Kupp, Ustron, meist auf Bl., z. sltn.

9. *Rhynchites* Hbst.

1. *auratus* Scop. 6—8. R., Ob, besonders auf jungem Laubholz, obwohl sltn.

12. *Apion* Hbst.

1. *elegantulum* Pk. 6. R., auf Bl., s. sltn.

12/13. *Ramphus* Clairv.

1. *flavicornis* Clairv. (*pulicarius* Pk.) 6. R., auf Birkenblättern, sltn.

15. *Strophosomus* Bilbg.

1. *limbatus* F. 6. R., unter Moos und Laub, z. sltn.

2. *hirtus* Sch. Desgl., s. sltn.

20. *sitones* Schh.

1. *8-punctatus* Grm. 5—8. R., an verschiedenen Orten, hfg.

2. *elegans* Schh. 5. 6. Bsfk., von Bl. geschöpft, z. sltn.

3. *ulicis* Spence. 7. R., Zworfau, auf Sp. *ulmaria*, s. sltn.

22. *Chlorophanus* Dalm.

1. *salicicola* Grm. 6—8. R., a. d. Ob., auf jungen Weiden, z. hfg.

23. *Polydrusus* Grm.

1. *intermedius* Zttst. 6—8. R., Ustron, auf jungem Laubholz, sltn.

2. *impressifrons* Schh. 5—8. R., a. d. Ob. u. an anderen Orten, auf jungen Weiden, nicht sltn.

3. *rubi* Gyll. 5—8. R., Kupp, auf jungem Laubholz, z. sltn.

35. *Plinthus* Grm.

1. *Tischeri* Grm. 7. Am Altwater, sltn.

37. *Phyllobius* Schh.

1. *uniformis* Mrsh. 7. R., a. d. Ob., auf Weiden, z. sltn.

39/40. *Peritelus* Gr.

1. *leucogrammus* Grm. 7. Ustron, von jungem Laubholz geklopft, z. sltn.

40. *otiorrhynchus* Grm.

1. *maurus* Gyll. 7. Ustron u. Karlsbrunn, unt. Steinen, z. sltn.

2. *porcatus* Hbst. Desgl.

41. *Lixus* F.

1. *paraplecticus* L. 6—8. R., an Teichrändern und anderen stehenden Gewässern, auf Wasserpflanzen, hfg. 1 Ex. in einem Garten, auf Spargel.

41/42. *Larinus* Grm.

1. *planus* F. 6—8. R., an gemauerten Häusern (Bahnhof) umherkriechend, z. sltn.

2. *carlineae* Ol. 6—8. R., Pw., auf Disteln, sltn.

44. *Eribinus* Schh.

1. *festucae* Hbst. 6—8. R., auf Brachfeldern, sltn.

45. *Dorytomus* Grm.

1. *macropus* Rdth. 5—8. R., im Frühj. und Herbst unt. Moos, im Sommer auf Blätt. im jungen Laubholz, z. hfg.

2. *variegatus* Schh. Desgl., jedoch sltn.

3. *costirostris* Schh. 6. R., Rauden, auf Bl., z. sltn.

4. validirostris Schh. 6—8. Desgl.

5. bituberculatus Zttst. Desgl.

52. Tychius Grm.

1. cuprifer Pz. 4—8. R., Pw., Markowit, geschöpft, sltn.

54. Phytophagus Schm.

1. 4-cornis Gyll. 7. R., an verschiedenen Orten geschöpft, d. sltn.

56. Orchestes Ill.

1. signifer Crtz. 6. R., auf Bl., s. sltn.

60. Bagous Grm.

1. puncticollis Schh. 6. R., von jungem Laubholz geklopft, s. sltn.

2. tibialis Schh. Desgl.

3. glabrirostris Hbst. Desgl., kommt auch auf Wasserpflanzen vor.

61. Baridius Schh.

1. picinus Gr. 6. R., auf nassen Wiesen vom Grase geschöpft, s. sltn.

62/63. Gasterocercus De Lap.

1. depressirostris F. R., Ewerkau, Falkenberg. In Eichen unt. d. Rinde, die Puppenhülle im Splint, mit dem Kopfe gegen die Rinde gekehrt. Beim Ausfliegen hinterläßt er ein rundes Loch mit Holzmehl, wodurch man auf das Vorhandensein desselben geleitet wird.

63. Coeloides Schh.

1. quercus F. 6. R., Ewerkau, am ausfließenden Saft der Eichen, d. sltn.

65. Centorhynchus Schh.

1. abbreviatulus Schh. 7. R., auf Brachen geschöpft, sltn.

2. trimaculatus F. Desgl.

3. pubicollis Schh. 7. R., Pw., Belasna, bes. auf Hyp. perf., d. hfg.

70. Clonus Clairv.

1. pulchellus Hbst. 6. R., Ehnl., d. sltn.

II. Xylophaga.

7. Cryphalus Er.

1. 2-nodus Rtz. 5—7. Falkenberg. Überwintert im Larvenzustande theils in der Rinde, theils auf der ersten Holzlage und verpuppt sich erst im Frühjahr, kleine, oberflächliche Vertiefungen machend. Er lebt in Gesellschaft mit

Agrilus tenuis, Saperda scalaris und verschiedenen Schueumonen. (Rd.)

9. Eucryptogaster Hbst.

1. noxius And. Falkenberg, in Weißbuchen. (Rd.)

20. Rhizophagus Hbst.

1. politus Hellw. 7. 46. R., Ewerkau im ausfließenden Saft der Eichen an 200 St. gfgn. Das Männchen hat auf dem letzten Hinterleibssegmente eine Vertiefung.

22. Lyctus F.

1. pubescens Pz 6. 51. R., auf einem Holzplatz an Eichenlaubtern mit canaliculatus und dem folgenden zusammen, d. hfg.

2. bicolor Perr. Desgl.

26. Silvanus Latr.

1. 2-dentatus F. Mit den vorigen zusammen, aber seltener.

28. Cucujus F.

1. haematodes Er. 7. Im Gesenke, bei Ustron, d. sltn.

30/31. Dendrophagus Gyll.

1. crenatus Pk. Im Gesenke. Ubers. 45. p. 40.

III. Longicornia.

7. Isarthron Dej.

1 fuscum F. 9. R., auf einem Holzplatz, jedoch sltn.

10. Callidium F.

1. coriaceum Pk. Ende Juli am Abhange des Ultwates. (Für Schlesien neu. Ltzr.) Ubers. 50. p. 69.

11/12. Anisarthron Dej.

1. barbipes Dhl. 8. 49. R., auf einem Holzplatz, sltn.

12/13. Stenopterus Ol.

1. rufus L. 7. Ustron, auf Sp. Aruncus, jedoch d. sltn.

17. Pogonocherns Mgl.

1. ovalis Gr. 8. 51. Rauden, sltn. (Dr. R.)

22. Saperda F.

1. solidaginis Mkl. 7. 45. Ustron, 2 Er. auf Solid. virgaurea.

33. Stenura Dej.

1. pubescens F. 7. Ustron, auf Spiräen, d. sltn.

IV. Chrysomelina.

1. Donacia F.

1. tomentosa Ahr. 5. 50. R., an Teichrändern, s. sltn.

4. Crioceris Geoffr. (Lema F.)

1. Erichsonii Suff. 6—8. R., mit cyanella zusammen, jedoch viel seltener.

7. Adimonia Laichtg.

1. sanguinea F. 5. 47. R.-Hammer, auf Klaferthal, z. sltn.

8. Galleruca Geoffr.

1. tenella F. 6—8. R., an Teichrändern, auf Wasserpf., z. sltn.

13. Graptodera Chevr.

1. mercurialis F. 7. Ustron, z. sltn. Von H. Ltzr. am Malinow b. Ustron hfg. gfgn. Uebers. 48. p. 96.

14. Crepidodera Chevr.

1. rufipes L. Um Tuł, auf Orobus vernus. (Ltzr.) Uebers. 48. p. 96.

2. femorata Gyll. Bisher nur im Gesenke. (Ltzr.) Uebers. 46. p. 82.

3. atropae Mkl. 7. Ecke. b. R., 6 Gr. gfgn.

15. Phyllotreta Chevr.

1. vittula Rdtb. 3—9. R., Escheit, unt. Moos, auf Bl., z. sltn.

17/18. Dibolia Latr.

1. occultans E. H. R., auf jungen Birkenblättern, 1 Gr.

19. Plectroscells Chevr.

1. Mannerheimii Gyll. R., im jungen Laubholz, z. sltn.

2. compressa Ltzr. n. sp. Im Gesenke. Uebers. 46. p. 85.

21/22. Apteropeda Chevr. Rdtb.

1. ciliata Ol. (H. graminis Pz.) Ustron, nicht sltn. (Ltzr.) Uebers. 48. p. 96.

24. Chrysomelina L.

1. analis L. R., an verschiedenen Orten, sehr vereinzelt.

2. lurida L. 5. 47. R., Gr.-Goritz, auf Laubholzschlag, sltn.

30. Phratora Chevr.

1. tibialis St. 8. 49. R., auf jungen Weiden, sltn.

31. Phaedon Mgl.

1. galeopsis Ltzr. Von H. Ltzr. b. Ustron gfgn. Uebers. 48. p. 96.

35. Clythra Laichtg.

1. 4-signata Mkl. Anfang Mai bis Ende Juni i. d. Ob. aus einem Ameisenhaufen (F. rufa) d. Eb. noch verpuppt in großer Menge gesammelt. Er mag früher schon als laeviuscula Rtzb. versendet worden sein; wurde im Juli auch bei Ustron gfgn.

36. Lapidostomis Chevr.

1. chalybeicornis Dhl. R., Ob. unt. Moos, s. sltn.

40. Cryptocephalus Geoffr.

1. coryli L. var. d. R., im Obholz 2 Gr. gfgn.

2. 6-pustulatus Rossi (8-guttatus F.) Im Herbst bei Räuden, jedoch sltn. (Dr. R.)

3. hypochoerides L. 7. R., Edfe., Ob., Ustron, z. sltn.

IV. Trimera.

8. Seymnus Kug.

1. abdominalis M. B. 6. R., a. d. Ob., a. Bl., z. sltn.

V. Dimera.

3. Euplectus Krb.

1. signatus Rehb. 5. R., Ob., um Bmst., sltn.

4. Bythinus Leach.

1. puncticollis Denny. Herbst. St., unt. Moos, sltn.

5. Pselaphus Hbst.

1. dresdensis Hbst. 5. R., Stw., um Bmst., s. sltn.

B. Käfer, die der neuen Fundorte oder ihres häufigeren Vorkommens wegen zu vermerken sind.

I. Pentamera.

I. Caraboidea.

4. Dromius Bon.

10. 4-notatus Pz. 4. 50. Auch b. Rauden gsgn. (Cz.)

12. fenestratus F. Später auch bei R. in mehreren Ex. gsgn.

14. marginellus F. Im Herbst 51. mehrere Ex. b. Rauden gsgn. (Dr. R.)

17. foveola Gyll. Bei Rauden s. hfg. (Cz.)

19. quadrillum Dfts. Auch bei R., a. d. Od., zuweilen z. hfg.

11. Carabus L.

34. Scheidleri F. 7. 8. R., an zwei verschiedenen Feldwegen nach Domshöhe mit Preyssleri zusammen, jedoch z. sltn. Dagegen fand ich Preyssleri an diesen Orten zuweilen ungemein hfg., oft an einem Tage 30 bis 40 Stück, so daß ich weit über 300 Ex. versenden konnte.

14. Nebria Latr.

63. livida L. 1847, vom 19. Mai bis Ende Juni, a. d. Oderufern unter Weidenwurzeln in ungeheurer Menge; es wurden über 300 St. gsgn. 48. viel seltener, und seit der Strom diese Uferstellen zerstört hat, findet man höchst selten einzelne Exemplare.

65. brevicollis F. Bei Markowiz 2 Ex. (Cz.)

66. Gyllenhalii Schn. 47. auch bei Ustron an reißenden Gebirgsbächen (der Czantory, Barania etc.) gsgn., steigt jedoch nicht bis Ustron herab. (Ltzr.) Uebers. 47. p. 103.

15. Omophron Latr.

67. limbatum F. 49. Ende Mai und Anfang Juni in dem Mühlgraben (Absl. d. Bodeksteiches) bei Markowiz in ungeheurer Menge. (Cz.) Auch an der Oder viel hfg. als früher.

16. Elaphrus F.

69. uliginosus F. 47. b. Ustron, a. d. Weichsel, auf feuchtem schlammigen Sande. (Ltzr.) Uebers. 47. p. 103.

18. Notiophilus Dum.

73. aquaticus F. Auch b. R. unt. Moos, bes. im Frühjahr und Spätherbst, jedoch immer vereinzelt und nicht hfg.

22. Chlaenius Bon.

80. vestitus F. und 81. Schrankii Dfts. bei Markowiz am Mühlgraben, z. hfg. (Cz.)

25. Badister Clairv.

87. 2-pustulatus F. bei Markowiz am Mühlgraben, z. hfg. (Cz.)

32. Anchomenus Bon.

104. albipes F. Später an den bezeichneten Orten z. hfg.

var: ruficollis auch bei Ratibor z. hfg.

106. marginatus L. R., auch auf schlammigem Boden hfg. 47. bei Ustron, a. d. Weichsel, hfg. (Ltzr.) Uebers. 47. p. 103.

33. Olisthopus Dej.

121. rotundatus St. 7. 47. Czantory b. Ustron. (Ltzr.) Uebers. 47. p. 103.

34. Pterostichus Bon.

127. striatopunctatus Mgl. Später auch an der Oder, jedoch z. sltn.

133. leucophthalmus F. fand ich im Juli 47. in

147. niger F. einem Keller, in und um eine leere Krauttonne in ungeheurer Menge, denen sich Car. Scheidleri, Preyssleri, violaceus, glabratus u. beigelegt hatten.

42. Stenolophus Mgl.

215. vaporariorum F. Auch an der Barania b. Ustron. (Ltzr.) Uebers. 47. p. 103.

218. suturalis Zgl. Später auch von mir an ähnlichen Orten und zwar z. hfg. gsgn.

44. Trechus Clairv.

225. discus F. Später s. hfg. a. d. Od., unter

Weidenwurzeln und in lehmiger Ufererde. Seit der Strom diese Uferstellen zerstört hat, nur sehr vereinzelt.

226. *littoralis* Zgl. Im Juli 47. bei hohem Wasserstande d. Od. in Seitengräben auf dem Wasser schwimmend, z. hfg.

228. *paludosus* Gyll. Bei Markowiz am Mühlgraben, aber seltner. (Cz.)

45. *Bembidium* Latr.

238. (*Tachys* Mgl.) *nanum* Gyll. An d. Weichsel bei Ustron 3 Ex. gfgn. (Ltzr.) Uebers. 47. p. 104.

251. (*Peryphus* Mgl.) *modestum* F. Bei Markowiz am Mühlgraben, s. hfg. (Cz.)

257. (*Peryphus* Mgl.) *prasinum* Mgl. 7. Ustron, an d. Weichsel, 2 Ex. (Ltzr.) Uebers. 47. p. 103.

258. — *fasciolatum* Mgl. 7. 46. u. d. Od., oberhalb R., z. hfg. gfgn.

262. — *decorum* Zenk. 51. R., im Herbst eine Anzahl Ex., an gemauerten Häusern (Bahnhof) umherkriechend, gfgn.

266. — *rufipes* Jll. 7. u. d. Weichsel b. Ustron. (Ltzr.) Uebers. 47. p. 104.

277. (*Leja* Mgl.) *guttula* F. Später auf schlammigem Boden s. hfg.

279. (*Lopha* Mgl.) *4-guttatum* F. Bei Rauden, in sandigen Kiefernwäldern, s. hfg. (Cz.)

II. Hydrocantharida.

1. *Halipus* Ltr.

2. *fulvus* F. 3. *ruficollis* De G. 4. *impressus* F. Später in verschiedenen Wassergräben um R. hfg. gfgn.

5. *Aciinus* Leach.

15. *sulcatus* L. Am 8. Juli 46. fand ich in einem schlammigen Uferrande eines stehenden Gewässers b. R., das bisweilen ganz austrocknet, eine ungeheure Menge Erdkugeln, in welchen sich dieser Käfer, meist schon vollständig entwickelt, oft zu 2, und nicht selten mas. und fem. in einer Kugel, vorkand.

7. *Colymbetes* Clairv.

25. *pulverosus* Kn. 28. *adspersus* F. Später in Wassergräben um R., s. hfg.

8. *Ilybius* Er.

31. *4-guttatus* Dj. 32. *fenestratus* F. Wie 25. 11. *Laccophilus* Leach.

47. *hyalinus* De G. Später in Wassergräben um R., s. hfg.

13. *Hydroporus* Clairv.

52. *geminus* F. 57. *palustris* L. 61. *lineatus* F. Wie 47.

14. *Gyrinus* Geoffr.

67. *minutus* F. 7. 51. R., auf dem Teiche bei R.-Hammer und d. Grabowiecz b. Kempa, s. hfg.

III. Brachelytra.

1. *Myrmeconia* Er.

2. *limbata* Pk. Später an ähnlichen Orten u. unter Laub und Moos hfg.

3. *Falagria* Leach.

13. *thoracica* Curt. Später an ähnlichen Orten hfg.

15. *nigra* Gr. Markowiz, besonders im Herbst in ungeheurer Menge auf Ackern, unt. Steinen und Erdstücken. (Cz.)

6. *Calodera* Mrhm.

21. *nigrita* Mrhm. 6. 47. R., nach einer Überschwemmung hfg.

7. *Tachyusa* Er.

26. *immunita* Er. 27. *atra* Gr. 28. *umbratica* Er. { Später an der Oder, auf schlammigem Boden hfg.

8. *Phloeopora* Er.

30. *corticalis* Gr. R., im Frühjahr unter Moos um Bmst, z. hfg.

9. *Homalota* Mrhm.

31. *graminicola* Gr. R., später an verschiedenen Orten, z. hfg.

42. *aequata* Er. 4. 47. R., unter Eichenrinde hfg.

51. *palleola* Er. 52. *inquinula* Gr. Später z. hfg.

10. Oxypoda Mrhm.

65. vittata Mkl. R., später an verschiedenen Orten, z. hfg.

11. Aleochara Gr.

75. rufipennis Er. 7. R., auf Schlamm, a. d. Od., z. hfg.

83. moesta Gr. 8. R., in den Nestern der Form. fuliginosa, z. hfg.

87. angulata Er. 10. 51. R., bei Kobilla, in einem Ameisenhaufen (Form. rufa), s. hfg.

20. Tachyporus Gr.

116. ruficollis Gr. 7. 46. R., Zworkau im ausschließenden Gaste der Eichen, z. hfg.

21. Tachinus Gr.

124. marginellus Gr. 6. 7. R., an der Oder, auf schlammigem Boden, z. hfg.

22. Boletobius Leach.

132. atricapillus F. Später an ähnlichen Orten, s. hfg.

25. Xantholinus Dhl.

147. latus Gr. Später auch von mir an verschiedenen Orten gfgn, jedoch immer nur sehr vereinzelt.

29. Philonthus Leach.

171. laevicollis St. R., im Frühj. und Spätherbst unt. Moos, jedoch z. sltn.

174. nitidus F. 7. 46. R., a. d. Od., öfterer gfgn.

175. carbonarius Gyll. Desgl.

183. umbratilis Gr. Desgl.

184. varius Gyll. Später an verschiedenen Orten hfg gfgn.

190. fuscus Gr. Später auch von mir gfgn, jedoch immer noch z. sltn.

193. fumigatus Ndm. Wie 184.

203. quisquiliarius Gyll. Später auf schlammigem Boden z. hfg.

207. fulvipes F. Später an verschiedenen Orten s. hfg.

208. tenuis F. Desgl, obgleich weniger hfg.

31. Quedius Leach.

224. fuliginosus Gr. Später an ähnlichen Orten z. hfg.

227. umbrinus Er. Im Frühj. und Spätherbst unt. Moos z. nicht sltn.

36. Lathrobium Gr.

234. brunnipes F. 5—7. Später unter Moos z. hfg.

244. scabricolle Er. Ende Mai 47. bei Ustron 3 Er. (Ltzr.) Uebers. 48. p. 96.

38. Lithocharis Dj.

247. brunnea Er. und 249. obsolete Ndm. Ende April 50, unter Weidenlaub am sandigen Ufer eines kleinen Baches (Domä-Mühle) s. hfg.

41. Paederus Gr.

262. ruficollis F. Später auch bei R., a. d Od., s. hfg.

45. Bledius Leach.

291. fracticornis Pk. 5—8. R.; auf Schlamm in ausgetrockneten Gewässern, a. d. Od., s. hfg.

295. crassicollis Boisd. Desgl.

296. opacus Block. 7. bei Ustron, jedoch z. sltn.

297. nanus Er. 6—8. R., in Lehmgruben, lehmigen Ufern z. hfg. Der Lehnmuß aufgekratzt werden, sonst findet man ihn nur s. sltn.

298. subterraneus. Wie 291., aber noch häufiger.

49. Trogophloeus Mrhm.

314. riparius Boisd. Später an der Oder bei R. hfg.

317. corticinus Gr. Desgl.

52. Deleaster Er.

323. dichrous Gr. 5—7. R., an der Od., Rau- den und einigen andern Orten nicht sltn., obwohl immer nur sehr vereinzelt.

54. Anthophagus Gr.

325. armiger Gr. Ende Mai 47. bei Ustron. (Ltzr.) Uebers. 48. p. 96.

326. caraboides L. 6. 47. R., a. d. Od., im

327. abbreviatus F. Lhnst., auf schlammigem Boden, hfg.

55. Lesteva Latr.

330. bicolor F. 5. 47. R., hinter der Lucasine z. hfg. Auch bei Ustron. (Ltzr.) Uebers. 48. p. 96.

56. Arpedium Er.

332. quadrum Gr. 6. 47. R., an d. Od., auf schlammigem Boden, z. hfg.

57. Olophrum Er.

337. assimile Pk. 6. 47. R., an d. Od., hfg.

60. Omalium Gr.

347. conicum Mrsh. 7. 51. R., an eichenen Klaftern, z. hfg.

IV. Sternoxa.**21. Ampedus Grm.**

57. ephippium F. 4. 48. bei Kupp, an jungen Kiefern, z. hfg.

58. praeustus F. Desgl., aber auch b. Rauden an Eichenstöcken.

61. balteatus L. Im Frühj. auf jungen Kiefern, wenn sie Harz ausschwitzen, bei Jakobswalde u., s. hfg.

22. Drasterius Eschs.

67. pulchellus L. Rauden und Markowitz im Grase, z. hfg. (Cz.)

23. Ludius Latr.

68. ferrugineus L. R., Ende Mai 48. auf den Weiden an der Straße nach der Lukasine 4 Er.

26. Diacanthus Latr.

- Pag. 53. 3. impressus F. 5—7. auch bei Kupp und Rauden, jedoch sltn.

28. Sericosomus Serv.

90. brunneus F. } Wie 61, jedoch nicht so hfg.
91. fugax F. }

V. Malacodermata.**9. Telephorus De G.**

44. assimilis Pk. Von H. Ltzr. auch b. Ustron fggn. Uebers. 48. p. 96.

VI. Xylotrogi.**11. Anobium F.**

1. pini F. 6. R., an Kieferklaftern, sltn.

VII. Clavicornia.**5. Scaphisoma Leach.**

23. agaricinum F. R., im Frühj. in dem Saft auf ein- bis zweijährigen Birkenstöcken (Brzezie) und später in Pilzen, s. hfg.

6. Catops Pk.

31. nigrita Er. 5—7. R., Ob., unt. Laub, mit Myrmedonien zus., z. hfg.

10. Cercus Latr.

45. pedicularius L. 4—8. R., Ob. u., später s. hfg.

15. Amphotis Er.

68. marginata F. 5. 46. u., an ähnlichen Orten auch von mir hfg. fggn.

17. Meligethes Stph.

73. pedicularius Gyll. 75. aeneus F. und besonders 80. viridescens F. machten 46 und in den folgenden Jahren in der hiesigen Gegend ungeheuren Schaden in den Rapsfeldern, wie er früher noch nicht wahrgenommen worden war. Der ausgebildete Käfer zerstörte in den sich entwickelnden Blüthen die Basis der Staubgefäß, so, daß die Blüthen abfielen, oder doch unfruchtbar blieben.

20. Cryptarcha Shuck.

83. strigata F. 7. 46. R., Tworkau, im austreibenden Saft der Eichen s. hfg., auch b. Falkenberg auf ähnл. Art nicht sltn.

21. Ips F.

86. 4-punctatus Hb. 7. 46. R., Tworkau mit 83. zusammen, nur weniger hfg. Rauden unter Fichten- und Kieferrinde hfg.

87. 4-pustulatus F. Rauden und Loslau unter Fichten- und Kieferrinde, hfg.

22. Atomaria Kirby.

109. atra Hb. 4—8. Später an verschiedenen Orten s. hfg.

112. umbrina Gyll. Desgl., jedoch weniger hfg.

118. nana Er. Wie 109.

29. Elachistus Hoffg.

122. globulus Gyll. 8. 46. R., an d. Oder, z. hfg.

33. Attagenus Latr.

132. 20-guttatus F. 5. R., Slingebutel, Rauden, in Wohnzimmern nicht sltn.

37. Hister L.

146. unicolor L. Später z. hfg.

49. Heterocerus F.

184. laevigatus Pz. 6—8. R., an der Od., u. an anderen Orten auf Schlamm, s. hfg.

VIII. Palpicornia.**3. Ochthebius Leach.**

7. pygmaeus F. 6—8. R., in Wassergräben z. hfg.

10. **Limnebius** Leach.

21. *truncatellus* Pk. 6—8. R., in Wassergräben s. hfg.

11. **Laccobius** Leach.

22. *minutus* L. 6—8. R., am häufigsten in Wassergräben.

13. **Cereyon** Leach.

28. *flavipes* F. 7. Auch bei Ustron s. hfg.

32. *terminatum* St. 5—8. R., in Wassergräben s. hfg.

IX. Lamellicornia.4. **Oniticellus** Zgl.

15. *flavipes* F. 5—8. R., an verschiedenen Orten, im Dr., jedoch nie hfg.

5. **Aphodius**.

19. *terrestris* F. Später auch b. R., ♂ hfg.

21. *foetens* F. Später bei R. u. bei Rauden ♂ hfg.

36. *2-maculatus* F. Desgl.

7. **Trox** F.

43. *sabulosus* L. 7. R., in Sandgruben, um Graswurzeln, s. hfg.

8. **Geotrupes** Latr.

48. *sylvaticus* F. Davon sing ♂. Czech 1 Gr., bei dem die linke Flügeldecke schwarz, (wie gewöhnlich) die rechte aber braungelb ist.

15. **Omaleplia** Mg.

64. *variabilis* F. Später bei Markowic und Rauden, unter Steinen, auf Sandboden, hfg., doch nie schwärzend; zu welcher Tageszeit auch die Fundorte besucht wurden; er scheint wie brunnea nur spät am Abend zu schwärmen. (Cz.)

II. Heteromera.**I. Melasomata.**3. **Microzoum** Dej.

3. *tibiale* F. Rauden, in sandigen Kiefernwäldern, unter Steinen, mit Myrmica-Arten zusammen, ♂ hfg. (Cz.)

4. **Crypticus** Latr.

4. *quisquelinus* L. Ende Mai b. Sackenhain in dem sandigen Graben an der Eisenbahn, um Graswurzeln, s. hfg.

II. Taxicornia.6. **Ulema** Latr.

13. *culinaris* F. 4—10. R., auch an anderen Orten, z. B. Jakobsvalde, Rauden ic., aber immer in alten Stöcken und sehr vereinzelt; scheint durch das ganze Gebiet bis ins Gebirge verbreitet zu sein.

III. Tenebrionida.3. **Hypulus** Pk.

4. *quercinus* Quens. 10. R., aus faulen Weidentöpfchen herausgegraben, jedoch seltn.

5. **Melandrya** F.

6. *caraboides* L. 6. R., an den Linden auf dem Dr.-D., obwohl sehr vereinzelt.

IV. Helopida.1. **Helops** F.

1. *lanipes* L. Ist bis Ende August durch das ganze Gebiet verbreitet und findet sich auch unter der Rinde fauler Stöcke; später scheint er ins Winterquartier zu ziehen.

2. *caraboides* Pz. Fand ich Ende Mai bei Jakobswalde in ungeheurer Menge auf jungen Kiefern; auch unter Fichtenninde nicht selten.

V. Trachelida.5. **Mordella** F.

10. *pumila* Gyll. 6—8. R., später ♂ hfg.

6. **Anaspis** Geoffr.

16. *thoracica* L. Wie 10.

VI. Cantharida.1. **Meloë** L.

4. *brevicollis* Hllw. R., auch im Spätherbst in einzelnen Ex. auf dem Dr.-D. gfgn.

2. **Cerocoma** Geoffr.

6. *Schäfferi* L. Im Frühjahr auf Chrys. Leucanth., ♂ hfg. (Cz.)

VII. Stenelytra.4. **Anoncodes** Schm. Dj.

10. *adusta* Pz. 6. 49. R., in Gärten auf Rosa centifolia, jedoch ♂ seltn.

5. *Chrysarthria* Schm.

13. *viridis* Ill. 7. 8. Auch b. Rauden, an Klafern.

III. Tetramera.**I. Rhynchophora.**1. *Bruchus* L.

5. *luteicornis* Hllw. Im Mai unt. Laub, wo er überwintert, später auf Bl., z. hfg.

20. *Sitones* Schh.

104. *regensteinensis* Hbst. 7. Ustron, z. sltn.

25. *Cleonus* Schh.

126. *albidus* F. Rauden, auf Holzschlägen, z. hfg.

127. *glaucus*. R., Rauden. Desgl.

37. *Phyllobius* Schh.

160. *oblongus* L. Vernichtete hier im Mai 1850 die Blüthenknospen der Aepfel- und Birnbäume, ja selbst die jungen Pfropfreiser fast ganz und gar, indem er die Stgf. und die jungen Knospen an der Basis vollständig abnagte, daher die Blüthen abfielen und die Pfropfreiser vertrockneten.

40. *Otiorrhynchus* Gr.

176. *nigrita* F. 6. R., Markowiz, unt. Moos, auch zwischen Gesträuch geschöpft.

61. *Baridius* Schh.

251. *chlorizans* Mllr. 4. 50. R., auf nassen Wiesen vom Grase geschöpft, s. hfg.

71. *Gymnetron* Schh.

312. *longirostris* Dej. R., in den Blüthen von *Camp. persicifolia*, *cervicaria* und *glomerata*, s. hfg.

III. Longicornia.10. *Callidium* F.

11. *dilatum* Pk. Auch bei R., Markowiz, nicht sltn. (Cz.)

11. *Clytus* L.

17. *detritus* L. 6. 51. R., auf einem Holzplatz an Eichenklafern, hfg.

24. *misticus* L. Desgl., weniger hfg.

13. *Necydalis* L.

28. *umbellatarum* F. 7. 51. Auch bei R., nicht sltn.

22. *Saperda* F.

39. *carcharias* L. Später öfter gfgn., obwohl immer vereinzelt.

40. *scalaris* L. Desgl.

28. *Rhagium* F.

55. *2-fasciatum* F. Später auch um R., Rauden, Jakobswalde, u. auf Holzschlägen, z. hfg. gfgn.

30. *Toxotus* Mgl.

57. *cursor* L. Später im Frühjahr bei Kupp, Jakobswalde u. auf jungen Eiern, besonders an sonnigen Vormittagen, z. hfg. gfgn.

IV. Chrysomelina.8. *Galleruca* Geoffr.

52. *nigricorne* ist zu streichen und dagegen *Aeglastica Halensis* L. einzutragen.

16. *Aphthona* Chevr.

80. *rubi* Pk. 7. 47. Ustron, v. H. Ltzr. hfg. gfgn. Uebers. 48. p. 96.

24. *Chrysomela* L.

110. *Dahlii* Kn. 7. 47. Ustron, auch von H. Ltzr. gfgn. Uebers. 48. p. 96.

123. *menthae* Schrk. ist zu streichen und dagegen *violacea* F. einzutragen.

31. *Phaedon* Mgl.

150. *carniolicus* Mgl. Von H. Ltzr. auch bei Ustron gfgn. Uebers. 48. p. 96.

153. *cochleariae* F. Desgl.

