

nications”. Późniejsze Walne Zgromadzenia nie wprowadziły już żadnych zmian profilu ani poprawek formy edytorskiej „PPE”. Aktualnie obowiązującym – legalnym wzorcem edytorskim Pisma jest więc nadal tom 52 wydany w 1982 r.

Zarząd Główny wybrany przez Walne Zgromadzenie we wrześniu 1995 r na XLII Zejeździe Towarzystwa w Poznaniu, nie zgłosił wówczas żadnych inicjatyw edytorskich (par. 27/2 Statutu) dotyczących „PPE”, które mogły być wówczas rozpatrzone i ewentualnie zaakceptowane przez Walne Zgromadzenie. Jednak w styczniu 1996 r. – bez upoważnienia ze strony tej najwyższej władzy, a jedynie w wyniku nielegalnego głosowania – zmienił formę i profil 65 tomu „Pisma”, wprowadzając podtytuł angielski zamiast francuskiego, likwidując obowiązkowe działy i ich tytuły oraz wprowadzając wyłączność języka angielskiego w miejsce dotychczasowych czterech (tj. polskiego, angielskiego, francuskiego i niemieckiego). Tym działaniem Zarząd Główny zignorował obowiązujące nadal uchwały Walnych Zgromadzeń z lat 1947, 1965 i 1981, a więc i paragraf 27/1 Statutu, co w myśl par. 17/1/c zagrożone jest wykluczeniem z Polskiego Towarzystwa Entomologicznego. Naruszenie obowiązujących uchwał zostało potwierdzone orzeczeniami Głównej Komisji Rewizyjnej z 15 XI 1997 oraz z 6 III i 16 IV 1998.

Jerzy PAWŁOWSKI, Kraków

Kierunki adaptacji środowiskowych w życiu larwalnym minujących błonkówek (*Hymenoptera: Tenthredinidae*)

Directions of environmental adaptations in larval life of mining hymenopterans (*Hymenoptera: Tenthredinidae*)

Omówiono, jako prawdopodobne, 4 etapy przystosowań. Za najbardziej pierwotne ze względu na biologię, morfologię i rośliny żywicielskie uznano gatunki z plemienia *Pseudodineurini* (PIERONEK, 1995: Biul. Sekcji hymenopterol., **4**: 15-16.). Następny etap obejmowałyby gatunki z rodzajów *Metallus*, *Parna* i *Scolioineura*, również pierwotne, ale niezdolne w czasie aktywnego życia do opuszczania min; III – rodzaje *Heterarthrus* i *Messa*, a IV – rodzaje *Fenusa* i *Profenusa* (oraz im pokrewne), u których przystosowania do minowania są najdalej posunięte.

Podano przykłady przemian adaptacyjnych w ontogenezie larwalnej u *Heterarthrus vagans* (FALLEN), *Fenusa dohrnii* (TISCHBEIN) i *Scolioineura betuleti* (KLUG) (PIERONEK, 1966: Acta zool. cracov., **11**: 499-553.; PIERONEK, 1973: Acta zool. cracov., **18** (3): 41-71.; BIERCA, 1995: Biul. Sekcji hymenopterol., **4**: 13-14.).

Barbara PIERONEK, Kraków