

546. *Hydrovatus cuspidatus* (KUNZE, 1818) (Coleoptera: Dytiscidae) gatunek nowy dla Niziny Mazowieckiej

*Hydrovatus cuspidatus* (KUNZE, 1818) (Coleoptera: Dytiscidae) species new for the Mazowsze Lowland

KEY WORDS: Coleoptera, Dytiscidae, *Hydrovatus cuspidatus*, new record, Mazowsze Lowland, C Poland.

*Hydrovatus cuspidatus* (KUNZE) należy do jednych z najrzadziej poławianych i wykazywanych w Polsce gatunków pływaków (Dytiscidae). Każde nowe stanowisko stanowi zatem cenną informację o jego rozmieszczeniu w Polsce. Do tej pory został on podany z naszego kraju z zaledwie z ośmiu krain: Pojezierza Pomorskiego, Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej, Podlasia, Śląska Dolnego, Wzgórz Trzebnickich, Śląska Górnego, Wyżyny Lubelskiej i Roztocza. W większości są to stare dane, pochodzące głównie z pierwszej połowy XX wieku (BURAKOWSKI i in. 1976: Kat. Fauny Pol., XXIII, 4: 1-307). Współcześnie znany jest z pojedynczych okazów z trzech stanowisk: Pamiątkowa na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej (PRZEWOŹNY, BARŁOŻEK 2008: Wiad entomol., 27, 1: 55-56), Ostrowa Nadrybskiego na Wyżynie Lubelskiej (BUCZYŃSKI, KOWALIK 2005: Ann. UMCS, C, 60: 19-39) i Zwierzyńca na Roztoczu (BUCZYŃSKI i in. 2009: Ann. UMCS, C, 63: 87-112).

Poniżej podajemy czwarte współczesne stanowisko tego gatunku w Polsce:

– Nizina Mazowiecka: Konstancin-Jeziorna (EC06), 28 VIII 2010 – 1 ex., w stawie (glinianka), w strefie szuwaru, leg., det. et coll. T. RYNKIEWICZ.

Staw, w którym odłowiono chrząszcza to silnie zeutrofizowany, bezodpływowy zbiornik wodny o powierzchni niespełna 2 ha, z dosyć gęsto porośniętą strefą litoralu. Występują w niej: trzcina, pałka wąskolistna i pojedyncze sity, w stawie brak natomiast grążela, licznego w innych zbiornikach Konstancina. Staw położony jest w terenie otwartym, od strony południowej i południowo-zachodniej sąsiaduje bezpośrednio z zadrzewieniami nadwodnymi. Jest niezagospodarowany, użytkowany umiarkowanie przez wędkarzy i sporadycznie jako obiekt rekreacyjny.

Chrząszcza odłowiono z brzegu, w płytkiej wodzie poprzez wyjęcie roślin wodnych. Występował razem z *Noterus clavicornis* (DEGEER, 1774), *Graptodytes pictus* (FABRICIUS, 1787), *Laccophilus poecilus* KLUG, 1834 i *Enochrus (Lumetus) testaceus* (FABRICIUS, 1801).

*Hydrovatus cuspidatus* preferuje głównie odsłonięte i niezagospodarowane zbiorniki wodne z gęsto porośniętą strefą litoralu (BOUKAL i in. 2007: Klapalekiana, 43: 93).

Tomasz RYNKIEWICZ, Warszawa

Marek PRZEWOŹNY, Zakł. Zool. Syst., Wydz. Biologii UAM, Poznań

547. Nowe stanowisko *Dreposcia umbrina* (ERICHSON) w północno-zachodniej Polsce (Coleoptera: Leiodidae: Cholevinae)

A new record of *Dreposcia umbrina* (ERICHSON) in NW Poland (Coleoptera: Leiodidae: Cholevinae)

KEY WORDS: Leiodidae, Cholevinae, *Dreposcia*, new record, NW Poland.

*Dreposcia umbrina* (ERICHSON, 1837) jest chrząszczem poławianym w Polsce bardzo rzadko i dotychczas znanym głównie z krain południowych. Według „Katalogu fauny Polski” (BURAKOWSKI i in. 1986: Kat. Fauny Pol., XXIII, 5: 1-356) gatunek ten wykazano z Dolnego