

613. Nowe stanowiska *Glaphyra marmottani* (BRISOUT, 1863) i *Poecilium glabratum* (CHARPENTIER, 1825) (Coleoptera: Cerambycidae) na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej

New localites of *Glaphyra marmottani* (BRISOUT, 1863) and *Poecilium glabratum* (CHARPENTIER, 1825) (Coleoptera: Cerambycidae) on Wielkopolska-Kujawy Lowland

KEY WORDS: Coleoptera, Cerambycidae, *Glaphyra marmottani*, *Poecilium glabratum*, new localites, Wielkopolska-Kujawy Lowland, W Poland.

*Glaphyra marmottani* (BRISOUT, 1863), jest bardzo rzadko znajdowanym w Polsce gatunkiem. Do niedawna wykazywany tylko z jednego stanowiska na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej: Gubin (BURAKOWSKI i in. 1990: Kat. Fauny Pol., XXIII, 15: 1-312). Ostatnio stwierdzony także na Nizinie Mazowieckiej: Sękocin vic. ad Warszawa, UTM: DC97 (WELNICKI 2004: Pol. Pismo Ent., 23, 2: 113), Sękocin Stary, UTM: DC97 (PLEWA i in. 2011: Nature Jurnal, 44: 120-131).

Odkryto kolejne stanowisko tego gatunku na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej w granicach Przemęckiego Parku Krajobrazowego:

– Leśnictwo Papiernia (UTM: WT85), 12 VI 2010 – 1 ex., na trawach w drzewostanie sosnowym. Ponadto w 2011 roku pozyskano larwy, poczwarki oraz zasiedlony materiał żywicielski, z którego w wyniku dalszej hodowli uzyskano do końca stycznia 2012, 43 exx. We wszystkich przypadkach rośliną żywicielską była sosna *Pinus sylvestris* L.

Poczynione obserwacje pozwalają stwierdzić, że gatunek ten preferuje nasłonecznione partie drzew na dobrze nasłonecznionych stanowiskach. Średnica zasiedlonego materiału wynosiła od ok. 3 mm do ok. 6 cm (odłamane przez wiatr gałęzie i cienkie szczytowe partie strzały). Najliczniej hodowano osobniki dorosłe z zamarych gałązek średnicy ok. 0,5–2 cm., z dobrze przylegającą korą. Chodniki larwalne o podłużnym przebiegu zapchane były drobnymi, dwubarwnymi trocinami; w przypadku opanowania przez larwy cieńszych gałązek łączyły się, a nawet wzajemnie przenikały. Kolebka poczwarkowa usytuowana była na końcu chodnika i ułożona wzdłuż osi drewna, natomiast otwór wejściowy zawsze prostopadle do włókien. Obserwowano zimowanie w stadium larwy i poczwarki. Z poczwarek pozyskiwanych w okresie zimowo-wiosennym imagines uzyskiwano w warunkach laboratoryjnych po ok. 2 tyg. Larwy zebrane w tym okresie żerowały do końca lata i opuszczały materiał jako imagines w okresie jesieni i zimy. Można przyjąć, że w warunkach naturalnych opuściłyby kolebki po drugim przezimowaniu w postaci poczwarki. W naturze dojrzałe imago znaleziono w kolebce najwcześniej 15 maja. Dane te wskazują na dwuletni rozwój tego gatunku w naszych warunkach.

Gatunkiem towarzyszącym był często *Pogonocherus decoratus* (FAIRMAIRE, 1855) (Coleoptera: Cerambycidae).

*Poecilium glabratum* (CHARPENTIER, 1825), to gatunek rzadko w Polsce spotykany, znany z nielicznych stanowisk w sześciu krainach. Na obszarze Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej spotykany częściej. Poniżej podano kolejne stanowisko znajdujące się w granicach wymienionej krainy:

– Leśnictwo Jurkowo (UTM: XT25), 9 XII 2006 – 2 exx., 4 I 2007 – 3 exx., wydobyto z obumarłej gałęzi *Juniperus communis* L.; 20 XI 2007 – 1 ex., wydobyto z kolebki w martwej gałęzi *Juniperus communis*, pozostawionej celowo, XII 2006, w koronie krzewu. Z tejże gałęzi w okresie od 2 I 2008 do 2 II 2008 uzyskano w hodowli 29 exx. tego gatunku.

Dariusz HOFMAŃSKI, Darnowo