Colon (Eurycolon) latum KRAATZ, 1850
– Beskid Wschodni: Góry Słonne ad Sanok, rez. „Góra Sobień" (EV98), 29 V 1997, 1 ex., leg. MW; Brylińce ad Przemyśl (FA10), 2 VI 1997, 1 ex., leg. MW.

Bardzo rzadki gatunek, znany tylko z Polski północno-zachodniej i południowej; z Beskidu Wschodniego podany ostatnio w 1969.

Colon (Myloechus) appendiculatum ZETTERSTEDT, 1824
– Puszcza Białowieska: droga Browska, o. 375 (FD94), 24 VI 1997, 1 ex., leg. J. GUTOWSKI, coll. PJ.

Gatunek bardzo rzadki, w Polsce notowany dotychczas tylko z trzech krain północnych oraz z południowego zachodu; niedawno odnaleziony na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej. Nowy dla Puszczy Białowieskiej.

Colon (Myloechus) clavigerum (HERBST, 1797)
– Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Owczary (VU71), murawa kwietna, 7 VII 2009, 1 ex., leg. P. SIENKIEWICZ, coll. PJ.
– Podlasie: Mielnik ad Siemiatycze, Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy "Głogi" (FD30), 21-23 V 2005, 1 ex., leg. MW.
– Wyżyna Małopolska: Skowronno ad Pińczów (DA69), 16 V 1991, 1 ex., leg. MW.

Gatunek znany z Polski północno-zachodniej i południowej (niewykazywany wcześniej z krain podanych tutaj), jednak lokalnie bywał poławiany w dużej liczbie osobników (SZOŁTYS, 1996, Acta entom. siles., 4 (1-2): 11-13).

Colon (Myloechus) murinum murinum KRAATZ, 1850
– Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Poznań Ogrody (XU20), ogród katedry Entomologii UP, ad lucem: 25 V 2009, 1 ex., 30 VI 2009, 1 ex., 23 VII 2009, 1 ex., leg. M. BUNALSKI, coll. PJ.
– Wyżyna Lubelska: Opoka Duża ad Annopol (EB63), 21–23 V 1993, 1 ex., leg. MW.

Gatunek ostatni raz podany z Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej ponad pół wieku temu, a z Wyżyny Lubelskiej w 1969, poza tym znany tylko z południa kraju.

Paweł JAŁOSZYŃSKI, Muz. Przyr. UWr, Wrocław
Marek WANAT, Muz. Przyr. UWr, Wrocław
Rafał RUTA, Kat. Bioróżn. i Taksonom. Ewoluc. UWr, Wrocław

624 Potwierdzenie występowania w Polsce *Orthocis linearis* (J. R. SAHLBERG, 1901) (Coleoptera: Ciidae)

A confirmation of the occurrence of *Orthocis linearis* (J. R. SAHLBERG, 1901) (Coleoptera: Ciidae) in Poland

KEY WORDS: Coleoptera, Ciidae, *Orthocis linearis*, occurrence, Poland.

Gatunek znany z Danii, Finlandii, Norwegii, Szwecji oraz północnych obszarów europejskiej części Rosji (JELÍNEK 2008: [W:] LÖBL, SMETANA (ed.): Catalogue of Palearctic Coleoptera, Vol. 5. Apollo Books, Stenstrup: 55-62). Na podstawie okazów muzealnych, schwytanych na przełomie XIX i XX wieku, podany zastał z Polski i Ukrainy (KRÓLIK 2002: Wiad. entomol., 21 (2): 97-101, KRÓLIK 2008: Acta ent. Siles., 16: 29-34). We wspomnianych pracach *O. linearis* wykazano ze stanowisk leżących na Nizinie Mazowieckiej i w Beskidzie Wschodnim.

Poniżej przedstawiamy kolejne nowe stanowiska tego gatunku:

- Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Smoszew ad Krotoszyn (UTM: XT72), 21 IV – 28 VI 2010, 2 ♂♂ – schwytane w pułapkę Moericke'go, zawieszoną na wysokości 20 metrów w koronach drzew w ok. 150-letnim drzewostanie dębowym, leg. R. PLEWA, det. R. KRÓLIK, coll. R. PLEWA et R. KRÓLIK.
- Wyżyna Małopolska: Góra Puławska ad Puławy (UTM: EB69), 31 V – 23 VI 2010, 1 ♂ – schwytany w pułapkę Moericke'go, zawieszoną na wysokości 4 metrów od gruntu w dolnej części ok. 150-letniego drzewostanu dębowego na jego południowej ścianie, leg. et coll. R. PLEWA, det. R. KRÓLIK.

Bionomia i wymagania ekologiczne tego gatunku nie są znane. Miejsca schwytania ww. okazów nasuwają przypuszczenie, że gatunek ten może być związany ze starymi oraz silnie nasłonecznionymi dąbrowami.

Jest to pierwsze doniesienie o współczesnym występowaniu tego gatunku na obszarze Polski.

Radosław PLEWA, Zakł. Ochrony Lasu IBL, Sękocin Stary
Roman KRÓLIK, Kluczbork

625. Nowe stanowiska *Cyrtanaspis phalerata* (GERMAR) w Polsce (Coleoptera: Scraptiidae)

New records of *Cyrtanaspis phalerata* (GERMAR) in Poland (Coleoptera: Scraptiidae)

KEY WORDS: Coleoptera, Tenebrionoidea, Scraptiidae, new records, Poland.

Rozmieszczenie w Polsce chrząszczy z rodziny Scraptiidae jest wyjątkowo słabo zbadane, a grupa ta nie cieszy się popularnością wśród koleopterologów. Dane niedawno podsumowane przez KUBISZA (KUBISZ 2006: Oedemeridae i Scraptiidae Polski (Coleoptera, Tenebrionoidea). Monogr. Faun., **24**: 1-166) wskazują na bardzo małą liczbę współczesnych doniesień dotyczących tych chrząszczy. Przyczyn takiego stanu rzeczy należy upatrywać w trudnościach z identyfikacją poszczególnych gatunków, zwłaszcza w dużym rodzaju *Anaspis* GEOFFR. Niektóre z tych chrząszczy wykazują dużą zmienność rozmiarów ciała i ubarwienia, a pewnych oznaczeń części przedstawicieli dokonać można tylko na podstawie drugorzędowych cech dymorfizmu płciowego samców. Wymaga to pewnej znajomości tej rodziny już na etapie preparowania, gdyż istotne cechy znajdują się na spodniej stronie ciała i tradycyjne naklejanie na kartoniki grzbietem do góry utrudnia późniejszą pracę.

Jednym z rzadko wykazywanych z Polski gatunków jest *Cyrtanaspis phalerata* (GERMAR). Spośród polskich Scraptiidae chrząszcz ten wyróżnia się kontrastowymi przepaskami na pokrywach. Ze względu na bardzo charakterystyczny wygląd i tym samym łatwość oznaczenia, nie można małej liczby doniesień kojarzyć z problemami wspomnianymi wyżej. Znamienne jest, że w toku szczegółowych, zespołowych badań przeprowadzonych przez doświadczonych koleopterologów w Puszczy Białowieskiej i Górach Świętokrzyskich ((SZUJECKI (red.) – Próba szacunkowej waloryzacji lasów Puszczy Białowieskiej metodą zooindykacyjną, Wyd. SGGW, 2001; BOROWSKI, MAZUR (red.) – Waloryzacja ekosystemów leśnych Gór Świętokrzyskich metodą zooindykacyjną, Wyd. SGGW, 2007) nie znaleziono tego gatunku, związanego wszakże