

ERASTRIA ARGENTULA Hb.
ab. *NOWICKII* ab. nov. m.

PODAŁ

FRYDERYK SCHILLE (Strzałków p. Stryj).

W lesie Strzałkowskim złowilem dnia 2 lipca b. r. niezwykłą odmianę *E. argentula* a nie znalazłszy takowej w najnowszych dziełach o motylach traktujących, opisuję i nazywam ją ku czci założyciela polskiej lepidopterologii śp. Max. Nowickiego ab. *nowickii*.

Dla orientacji cytuję krótki opis formy typowej.

Forma typ.

Skrzydła przednie zielono-żółto-gniade dwoma srebrzysto-białymi przepaskami w trzy półka podzielone.

Aberacja *nowickii*:

Tylko półko nasadowe i środkowe czarniawo-żółto-gniade, zaś półko zewnętrzne tak jak przepaski srebrzysto-białe połyskujące a między żeberkami czarniawo-brunatno upstrzone.

Am 2 Juli l. J. fand Autor eine ab. von *E. argentula* und benennt solche zu Ehren des Begründers der polnischen Lepidopterologie des verew. Max. Nowicki ab. *nowickii*. Zur Orientierung eine kurze Beschreibung der typ. Form.

Forma typica:

Vorderflügel grünlich-goldbraun durch die zwei silberweisse Querbinden in drei Felder geteilt.

Aber. *nowickii*.

Nur das Basal- und Mittelfeld schwärzlich-gelbbraun, das Saumfeld wie die Querbinden silberweiss glänzend, zwischen den Rippen schwärzlich-braun bestäubt.