

birges und nunmehr für die Alpen, die nordpersischen und armenischen Hochgebirge und die Hohe Tatra nachgewiesen.

*Ichnus truncator* Fabr. 1 ♀ aus der Umgebung von Poznań.

#### SUBFAM. PIMPLINAE.

*Polysphincta multicolor* Grav. 1 ♀ aus der Umgegend von Poznań. Das ♂ wurde von Błędowski bereits aufgeführt. Im Gegensatz zu dem von Błędowski erwähnten Exemplar entspricht der Nervellus des Hinterflügels bei dem vorliegenden der Diagnose.

*Teleutaea striata* Grav. Diese hübsche Pimpline war im sumpfigen Birkenwald auf Blüten von *Peucedanum palustre* nicht selten. Mehrere ♀♀ Sępólno.

*Clystopyga sauberi* Brauns. 1 ♀ Sępólno.

*Lycorina triangulifera* Holmgr. 1 ♀ Sępólno.

*Glypta genalis* Möll. 1 ♀ Sępólno.

*Conoblasta fronticornis* Grav. ♂♀ im August auf Blüten von *Sium latifolium* gemein. Sępólno.

*Diceratops bicornis* Grav. 1 ♂ Sępólno.

*Lampronota marginator* Schiödte. 1 ♀ Sępólno. Ein interessanter Fund, da die Art bisher nur aus Dänemark bekannt zu sein scheint.

*Lissonota variabilis* Holmgr. 1 ♀ Sępólno var. mit schwarzem Schildchen und schwarzen Hüften II und III ex *Cheimatobia boreata* Sępólno.

*Anax parthenope* de Selys na Pojezierzu brodnickiem.

[*A. parthenope* de Sel. auf der Seeplatte von Brodnica].

(Doniesienie tymczasowe)

podał

Dr. STANISŁAW M. SUMIŃSKI.

*Anax parthenope*, przedstawiciel podrodziny *Aeschninae* rzędu *Odonata*, jest gatunkiem, który według powszechnie przyjętych poglądów należy do fauny azjatycko-śródziemnomorskiej. To też Szwajcarya, gdzie ten gatunek pojawia się licznie, była uważana za najdalej wysunięty na północ kraj jego występowania, a stare (z r. 1850) dane Hagena o *An. parthenope* z okolic Berlina długo nie znajdowały potwierdzenia.

Dopiero w r. 1920 wykazał Hesse na podstawie danych z literatury i własnych obserwacji, że *Anax* ten żyje w Brandenburgji. W Polsce dane dotyczące tego gatunku posiadamy od r. 1918.

*Anax parthenope* w Polsce był dotychczas znaleziony: 1) w r. 1918 nad jez. Mikorzyńskim na Kujawach 1 ♂; (Poliński i Demel); 2) w r. 1921 i 22 nad jez. Wigierskim 1 ♂ i 3 ♀♀ (stanowisko to jest, jak dotąd najdalej wysunięte na północny-wschód; dane moje); 3) w r. 1926 w okolicach Piwnicznej nad Popradem. 1 ♂ (Zaćwilichowski); 4) w r. 1927 stwierdziłem liczne występowanie *Anax parthenope* nad jeziorami Zbiczno, Kochanka, Kurzyny i i. położonemi na północ od Brodnicy, na t. zw. pojezierzu brodnickim, stanowiącem zachodnią część pojezierza prusko-mazurskiego. Nad jeziorami temi, a głównie nad jez. Zbiczno złowiłem w ciągu lipca r. z. 13 ♂♂ i 5 ♀♀.

Posiadając jedyną w Polsce, jak dotąd, większą liczbę egzemplarzy tego bardzo rzadkiego u nas gatunku, postanowiłem przeprowadzić badania porównawcze okazów polskich i południowo-zachodnio europejskich. W niniejszej notatce pragnę tylko stwierdzić, że polskie okazy różnią się dość znacznie od tamtych, głównie pod względem wymiarów; nasze są większe.

Ponieważ jednak zagadnienie powyższe wymaga obszerniejszego opracowania, przeto narazie poprzestaję na tem doniesieniu; dokładny opis terenu i szczegółowe sprawozdanie z rezultatów moich poszukiwań zamierzam opublikować w najbliższej przyszłości.

---

Der Verfasser beschreibt in einer vorläufigen Mitteilung das Vorkommen einer sehr seltenem *Anax*-Art.: *Anax parthenope* de Selys, welche von ihm in der Umgebung von Brodnica (Polnisches Pommern) in 18 Exemplaren (13 ♂♂ u. 5 ♀♀) angetroffen worden ist.

Die ganze Beschreibung d. Fundortes und auch die Untersuchung der Exemplare, die von den west- und südeuropäischen sehr abweichen, wird in einer grösseren Arbeit des Verfassers ausführlicher besprochen und in der nächsten Zeit veröffentlicht werden.

---