


PAMIĘTNIK FIZYOGRAFICZNY.

Tom XXII.

Wydany z zapomogi Kasy pomocy dla osób, pracujących
na polu naukowem, imienia D-ra med. Józefa Mianowskiego.




KOMITET REDAKCYJNY STANOWIĄ:


F. Chłapowski, W. Gorczyński, K. Hadaczek, H. Hoyer, L. Krzywicki, K. Kulwieć, J. Lewiński,
E. Loth, E. Majewski, S. Miklaszewski, J. Morozewicz, J. Nusbaum-Hilarowicz, W. Raciborski,
E. Romer, W. Rothert, M. Siedlecki, J. Siemiradzki, K. Stołytvo, J. Talko-Hryniewicz,
S. J. Thugutt, J. Trzebiński, Z. Weyberg, Z. Woycicki, R. Zuber.

Redaktor: **K. STOLYHWO.**

Wydawca: **K. KULWIEĆ.**



Dział I — Meteorologia. Dział II — Geografia, Geologia, Mineralogia i Pedologia.
Dział III — Zoologia. Dział IV — Botanika. Dział V — Antropologia, Archeologia
i Etnografia.



WARSZAWA.

DRUK. I LIT. JANA COTTY, KAPUCYŃSKA 7.

1914.

Dr. Witold Eichler.

Przyczynek do tegopokrywych Ojcowa.

Skąpa ilość wykazów tegopokrywych Królestwa Polskiego skłoniła mnie do ogłoszenia niniejszej skromnej listy, bo zawierającej zaledwie 238 gatunków i odmian. Na usprawiedliwienie swoje dodam, iż zebrałem je w czasie krótkim, mianowicie od 20 sierpnia do 1 września 1912 roku, i nieco już spóźnionym; warunki atmosferyczne były przytem bardzo niesprzyjające: niska temperatura i prawie ciągłe deszcze.

Robiłem poszukiwania i w grotach Wierzchowskiej, Nietoperzowej i innych, a mianowicie na przynętę z zepsutego mięsa w wypróżnieniach nietoperzów, tak obfitych w grocie Nietoperzowej, oraz wprost przesiewając warstwy ziemi,—lecz nigdy nic nie znalazłem.

Wogóle jednak Ojców należy uważać za wdzięczny teren dla poszukiwań coleopterologicznych. Oprócz powyżej wymienionej liczby, na końcu spisu podaję 10 gatunków, znalezionych kiedyindziej, które posiadam w swym zbiorze, wreszcie posiadam jeszcze około 30 gatunków i odmian dokładnie nie określonych, które podam w przyszłości.

Cicindelidae—Piaskowce.

1. *Cicindela germanica*. L.

bardzo widać tutaj pospolita, przytem w licznych odmianach; wszystkie egz., w ilości około 15 sztuk, znalazłem 30/VIII na wilgotnem rzysku w pobliżu groty Wierzchowskiej. Oprócz poniżej wyszczególnionych odmian, posiadam jeszcze jedną, nieokreśloną na razie, bez białych plam na bokach pokryw, a tylko z półksiężycowatemi na ich końcu. Jest to jedyny z piaskowców krajowych, który przy chwytaniu nie podrywa się do lotu, lecz ucieka pieszo.

2. *C. germ. a. Steveni* Dej.

30. VIII tamże 2 egz.

3. *C. germ. a. denteros* D. Torre.

30. VIII „ 1 egz.

- | | | | |
|--|----------|---|--------|
| 4. <i>C. germ. a. coerulea</i> Herbst. | 30. VIII | „ | 1 egz. |
| 5. <i>C. germ. a. cuprea</i> Westh. | 30. VIII | „ | 2 egz. |

Carabidae—Szczypawkowate.

- | | | |
|---|---------------|--|
| 6. <i>Procrustes coriacens</i> L. | 25. VIII | świeżo rozdeptany egzemplarz na drodze, w dolinie Ojcowskiej. |
| 7. <i>Carabus granulatus a. rubripes</i> Géh. | 22. VIII | 2 egz. w Pieskowej Skale, na zboczu, pod kamieniami. |
| 8. <i>Goniocarabus cancellatus</i> Ill. | 22. VIII | 1 egz. tamże. |
| 9. <i>Carpalophilus Linnei v. polonicus</i> Motsch. | 25. VIII | 1 egz. pod kamieniem na Chełmowej Górze. |
| 10. <i>Notiophilus palustris</i> Duft. | 31. VIII | 1 egz. na pniu sosnowym. Jamki. |
| 11. <i>N. biguttatus</i> F. | 26. VIII | 2 egz. pod kamieniem w dolinie Ojcowskiej. |
| 12. <i>Lorocra pilicornis</i> F. | 22. VIII | 2 egz. pod kamieniem nad Prądnikiem, po drodze do Piesk. Skały. |
| 13. <i>Clivina fossor</i> L. | 25. VIII | 1 egz. pod kamieniem w dolinie Ojcowskiej. |
| 14. <i>Cl. collaris</i> Herbst. | 21. VIII | 2 egz. sparzone, na zboczu doliny Ojcowskiej. |
| 15. <i>Dyschirius rufipes</i> Dej. | 30. VIII | 1 egz. na rżysku wilgotnym w pobliżu groty Wierchowskiej; 1. IX 1 egz. pod korą jodły. Ojców. |
| 16. <i>Brosicus cephalotes</i> L. | 22. VIII | 2 egz. w rowie. Doł. Ojcowska. |
| 17. <i>Asaphidion flavipes</i> L. | 21—31. VIII | b. obficie w piwnicy; 1 egz. na grzybie w Jamkach. |
| 18. <i>Metallina lampros</i> Herbst. | 25. VIII | 4 egz. w piwnicy. |
| 19. <i>Notaphus varius</i> Ol. | 22. VIII | 1 egz. nad wysychającą sadzawką po drodze do Pieskowej Skały. |
| 20. <i>Peryphus ustulatus</i> L. | 26 i 31. VIII | po 1 egz. pod kamieniami. Dolina Ojcowska. |
| 21. <i>Lopha quadrimaculata</i> L. | 21. VIII | 2 egz. pod korą pnia jodłowego pod Smardzewicami. |
| 22. <i>Trepanes articulatus</i> Gyllh. | 21—31. VIII | b. obficie, gdzie № 18. |
| 23. <i>Trechus quadristriatus</i> Schruk. | 22. VIII | 1 egz. wysiany z próchna w dziupli lipowej. Pieskowa Skała. |
| 24. <i>Tr. rubens</i> F. | 31. VIII | 1 egz. wysiany z liści opadłych Jamki. |
| 25. <i>Tr. marginalis</i> Schm. | 20—23. VIII | 12 egz. wysianych z opadłych liści w dolinie Sąspowskiej, 1 egz. wśród liści pod pniem jodłowym na Chełmowej Górze, 1 egz. w liściach u wejścia do groty Łokietka. |
| 26. <i>Epaphius secalis</i> Payk. | 31. VIII | 1 egz. pod kamieniem. Jamki. |
| 27. <i>Chlaenius nitidulus</i> Schruk. | 22. VIII | 1 egz. na rżysku. Pieskowa Skała. |
| 28. <i>Pseudophonus pubescens</i> Müll. | 22. VIII | 2 egz. pod kamieniem w dolinie Ojcowskiej. |

29. *Harpalus aeneus* F.
 30. *H. aeneus a. viridis*
 31. *Lasioharpalus distinguendus* Duft.
 32. *Amblystus quadripunctatus* Dej.
 33. *Anisodactylus binotatus* F.
 34. *Zabrus tenebrioides* Goeze.
 35. *Triaena plebeja* Gyllh.
 36. *Amara similata* Gyllh.
 37. *Bradytus apricarius* Payk.
 38. *Cyrtonotus aulicus* P a u z.
 39. *Abax ovalis* Duft.
 40. *Poecilus lepidus* Leske.
 41. *P. cupreus* L.
 42. *P. coerulesceus* L.
 43. *Bothriopterus oblongopunctatus* Fabr.
 44. *Platysma niger* Schall.
 45. *Omasacus vulgaris* L.
 46. *Pseudomaseus nigrinus* F.
 47. *Ps. anthracinus* Illig.
 48. *Calathus fuscipes* Goeze.
 49. *C. melanocephalus* L.
 50. *Limodromus assimilis* Payk.
 51. *Agonum sexpunctatum* L.
 52. *A. Mülleri* Herbst.
 53. *A. dolens* Sahlb.
 54. *A. viduum* P a u z.
21. VIII 2 egz. pod kamieniem.
 21. VIII 1 egz. tamże.
 21. VIII 1 egz.
 31. VIII 1 egz. pod kamieniem koło Sfinksa;
 1 egz. dol. Ojcowska.
 21. VIII 3 egz. pod kamieniami. Dolina Ojcowska.
 22. VIII 1 egz. w rowie. Dolina Ojcowska;
 1 egz. na oście.
 26. VIII pospolita na drogach. Dol. Ojcow.
 22. VIII 1 egz. na rżysku. Pieskowa Skała.
 30. VIII 1 egz. na drodze pod grota Wierzchowską.
 20. VIII 3 egz. pod kamieniami. Dolina Ojcowska.
 24—29. VIII dość pospolity pod kamieniami w dol. Ojcowskiej, Sąspowskiej, Bentkowskiej; w Jamkach.
 20. VIII 1 egz. pod kamieniem. Dolina Ojcowska.
 26. VIII 2 egz. pod kamieniem. Dolina Bentkowska.
 31. VIII 1 egz. pod kamieniem w Jamkach.
 21. VIII 2 egz. pod kamieniami w Jamkach;
 1 egz. w pniu jodłowym pod Smardzewicami.
 25. VIII 2 egz. pod kamieniem na drodze do Chełmowej Góry.
 20—26 pospolity pod kamieniami. Dolina Ojcowska i Bentkowska.
 20 i 31. VIII po 1 egz. pod kamieniami. Dolina Ojcowska.
 21. VIII 1 egz. tamże.
 21. VIII 2 egz. Dol. Ojcowska.
 27. VIII 1 egz. na rżysku pod Wierzchowską grota.
 22. VIII 1 egz. pod kamieniem w Pieskowej Skale.
 20—25. VIII b. pospolity pod kamieniami. Ojcowska dol.; pod korą pnia jodłowego pod Smardzewicami.
 21. VIII 2 egz. Dol. Ojcowska pod kamieniem.
 26. VIII 1 egz. tamże.
 22. VIII 1 egz. pod kamieniem. Pieskowa Skała.
 22. VIII 1 egz. tamże.

Haliplidae—Płytnikowate.

- | | |
|--|--|
| 55. <i>Brychius elevatus</i> Pauz. | 27. VIII 5 egz. z Prądnika; siatką obok tamy w Ojcowie. |
| 56. <i>Haliphus lineatocollis</i> Marsh. | 26. VIII 1 egz. Bentkowska dol.; w zagłębieniu koło wodospadu. |

Dytiscidae—Pływakowate.

- | | |
|--|--|
| 57. <i>Oreodytes Saumarki</i> C. R. Sahlb. | 27. VIII 5 egz. z Prądnika, siatką, obok tamy w Ojcowie. |
| 58. <i>Agabus congeuer</i> Payk. | 26. VIII 1 egz. z Bentkówki, siatką, w dol. Bentkowskiej. |
| 59. <i>Ilybius fuliginosus</i> F. | 26. VIII 1 egz. Bentkowska dol., w zagłębieniu koło wodospadu. |

Staphylinidae—Kusakowate.

- | | |
|---|---|
| 60. <i>Megarathrus sinuatocollis</i> Lac. | 26. VIII 2 egz. z grzybów kapeluszowych, Chełmowa Góra. |
| 61. <i>Omalius rivulare</i> Payk. | 22. VIII 2 egz. wysiane z próchna dziupli lipowej, Pieskowa Skała. |
| | 31. VIII 5 egz. w grzybach kapeluszowych, Góra Chełmowa. |
| | 31. VIII 2 egz. wysiane z opadłych liści w Jamkach. |
| 62. <i>Anotylus inustus</i> Grav. | 25. VIII 3 egz. Ekskrem. krowie, dolina Ojcowska. |
| 63. <i>Pyctocraerus avenarius</i> Geoffr. | 22. VIII 1 egz. Ekskrem ludzkie. |
| | 25. VIII 1 egz. w grzybie kapelusz. Chełmowa Góra. |
| 64. <i>Oxyporus maxillosus</i> F. | 31. VIII 6 egz. na grzybie kapelusz., wyrosłym na zbutwiałym pniu jodłowym w Jamkach. |
| 65. <i>O. maxill. v. angularis</i> Gebl. | 31. VIII 1 egz. tamże. |
| 66. <i>Stenus biguttatus</i> L. | 22—31. VIII 5 egz. wysianych z próchna dziupli lipowej w Pieskowej Skale, z liści obok sadzawki w dol. Ojcow. u mrówki czarnej pod kamieniem około Sfinksu. |
| 67. <i>St. Juno</i> Payk. | 22. VIII 1 egz. wysiany z próchna dziupli lipowej w Pieskowej Skale. |
| 68. <i>St. providus</i> Er. | 22. VIII 1 egz. tamże. |
| 69. <i>St. fuscipes</i> Grav. | 22. VIII 1 egz. tamże. |
| 70. <i>St. similis</i> Herbst. | 26. VIII 1 egz. z roślin, Bentkowska dol. |
| | 30. VIII 1 egz. na rzysku, Wierzchowska dol. |
| 71. <i>Astenus filiformis</i> Latr. | 30. VIII 1 egz. pod kamieniem; dol. Ojcowska. |

72. *Paederus caligatus* Er.

73. *P. brevipennis* Lac.

74. *Stillicus similis* Er.

75. *Scopaens laevigatus* Gyll.

76. *Medou castaneus* Grav.

77. *Gyrophypnus punctulatus* Payk.

78. *Xantholinus tricolor* F.

79. *Gefyrobilus decorus* Grav.

80. *G. marginatus* Stroem.

81. *Philonthus fimetarius* Grav.

82. *Ph. cephalotes* Grav.

83. *Gabrius vernalis* Grav.

84. *Abemus fossor* Scop.

85. *Platydracus stercorarius* Ol.

86. *Staphylinus erythropterus* L.

87. *Ontholestes tessellatus* Geoffr.

88. *Creophilus maxillosus* L.

89. *Sauridus picipes* Manth.

90. *Bolitobius lunulatus* L.

91. *Conosoma littoreum* L.

92. *C. pedicularium* Grav.

93. *Tachyporus obtusus* L.

94. *Tachinus rufipes* Degger.

21. VIII 3 egz. na zboczu pod kamieniem. Ojców.

24. VIII 1 egz. u mrówki czarnej, pod kamieniem w dol. Ojcowskiej; 30 VIII 1 egz. z olszyny obok grotu Wierchowskiej.

22. VIII 1 egz. nad wysychającą sadzawką. Ojców.

1. IX 1 egz. pod kamieniem, na polu; dolina Ojcowska.

22. VIII 1 egz. z próchna dziupli lipowej. Pieskowa Skała.

31. VIII 2 egz. wysiane z liści opadłych. Jamki.

31. VIII 1 egz. tamże.

31. VIII 1 egz. tamże.

22. VIII 3 egz. pod kamieniami; dolina Ojcowska.

23. VIII 1 egz. pod kamieniem; Chełmowa Góra.

27. VIII 1 egz. Ekskrem krowie; dolina Ojcowska.

22. VIII 5 egz. na rżysku w dol. Ojcowskiej; na przynętę z flaków kurzych.

27. VIII 1 egz. na drodze, dol. Ojcowska.

31. VIII 1 egz. pod kamieniem; dolina Ojcowska.

28. VIII 1 egz. dol. Ojcowska.

31. VIII 1 egz. pod kamieniem, Jamki.

22. VIII 1 egz. „ dol. Ojcowska.

22. VIII 1 egz. tamże.

27. VIII 2 egz. na rżysku; na przynętę z flaków kurzych. dolina Ojcowska.

27. VIII 2 egz. tamże.

24. VIII 1 egz. pod kamieniem; dolina Ojcowska.

26. VIII 1 egz. Sąspowska dol.

31. VIII 1 egz. na grzybie kapelusz. Jamki.

25. VIII 1 egz. dol. Ojcowska.

22. VIII 2 egz. pod kamieniami koło Smardzewic.

22. VIII 1 egz. w Pieskowej Skale.

31. VIII b. obficie wysiane z opadłych liści. Jamki. Też na grzybach.

31. VIII b. pospolity; wysiane z liści opadłych; Jamki.

26. VIII na grzybach, góra Chełmowa.

95. *T. marginellus* F. 30. VIII 1 egz. z olszyny koło Wierchow-
skiej grotty.
96. *Notothecta flavipes* Grav. 31. VIII 1 egz. wysiany z liści opadłych.
Jamki.
97. *Lyprocorrhe auceps* Er. 23. VIII 1 egz., wysiany z liści u wejścia
do groty Łokietkowej.
98. *Otypoda lividipennis* Manuh. 22. VIII 2 egz. wysiane z próchna lipowego
w Pieskowej Skale.
99. *Aleochara crassicornis* Lac. 31. VIII 5 egz., wysianych z liści opadłych.
Jamki.
100. *A. curtula* Goeze. 31. VIII 1 egz. tamże.
31. VIII 1 egz. na przynętę z flaków kurzych.
Dol. Ojcowska.
27. VIII b. obficie tamże.

Clavigeridae — Rozrożkowate.

101. *Claviger testaceus* Preyssl. 22. VIII 4 egz. pod jednym kamieniem
u mrówki żółtej przy drodze do
Olkusza niedaleko Ojcowa; jedna
para była sparzona.

Silphidae — Omarlicowate.

102. *Sciodrepa fumata* Spence. 1. IX 7 egz. pod Smardzewicami na przy-
nętę z flaków kurzych i na zde-
chłym nietoperzu.
103. *Necrophorus humator* Goeze. 31. VIII 2 egz. na przynętę z flaków ku-
rzych; dolina Ojcowska.
104. *N. interruptus* Steph. 25—31. VIII b. pospolity i stale tamże.
105. *N. vespillo* L. 25—31. VIII 4 egz. tamże.
106. *Tanatophilus sinnatus* F. 31. VIII 1 egz. na przynętę z flaków ku-
rzych pod Smardzewicami.
107. *Phosphuga atrata* L. 31. VII 1 egz. na drodze, w parku Ojcowskim

Histeridae — Gnilikowate.

108. *Paromalus complanatus* Pauz. 26. VIII—1. IX pospolity pod korą jodeł
próchniejących; Chełmowa góra.
109. *Saprinus semistriatus* Scriba. 27. VIII 2 egz. na przynętę z flaków ku-
rzych; dol. Ojcowska.
110. *Plegaderus vulneratus* Pauz. 23. VIII—1. IX 6 egz. pod korą butwieją-
cych świerków i jodeł; Jamki.

Hydrophilidae — Kałużnicowate.

111. *Hydrophilus caraboides* L. 26. VIII 1 egz. w zagłębieniu pod wodospa-
dem w dol. Bentkowskiej.

- | | |
|---|--|
| 112. <i>Coelostoma orbiculare</i> F. | 22. VIII 1 egz. w Pieskowej Skale. |
| 113. <i>Sphaeridium scarabacoides</i> L. | 22. VIII obficie w ekskrem. krowich. Pieskowa Skała. |
| 114. <i>Sph. bipustulatum</i> F. | 22—26. VIII dość pospolity w ekskrem. krowich; dolina Ojcowska, dol. Bentkowska. |
| 115. <i>Cercyon quisquilius</i> L. | 22. VIII 2 egz. w ekskrem. końskich. Pieskowa Skała. |
| 116. <i>Magasternum boletophagum</i> Marsh. | 20. VIII 2 egz. pod kamieniami w Sąspówce. |
| 117. <i>Cryptopleurum crenatum</i> Paus. | 29. VIII 1 egz. w ekskrem. krow, Bembło. |

Cantharidae — Omowilkowate.

- | | |
|------------------------------------|---|
| 118. <i>Phausis splendidula</i> L. | 26. VIII—31. VIII masa gąsienic, Ojców przy drodze do Olkusa. |
| 119. <i>Rhagonycha fulva</i> Scop. | 20. VIII pospolita na rozmaitych roślinach; dolina Ojcowska. |

Sphaeritidae.

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 120. <i>Sphaerites glabratus</i> F. | 22. VIII 1 egz. na grzybie kapelusz, Ojców. |
|-------------------------------------|---|

Nitidulidae — Łyszczynkowate.

- | | |
|--|--|
| 121. <i>Epuraca obsoleta</i> F. | 26. VIII 1 egz. na grzybie kapelusz; góra Chełmowa. |
| 122. <i>Odonthogethes hebes</i> Er. | 20. VIII 1 egz. z ziół; czerpakiem na łące; dolina Ojcowska. |
| 123. <i>Meligethes coeruleovireus</i> Först. | 20. VIII 1 egz. z <i>Mentha aquatica</i> , dol. Sąspowska. |
| 124. <i>M. aeneus</i> F. | 20. VIII pospolity, z rozmaitych kwiatów, Ojców. |
| 125. <i>M. mubrosus</i> Sturm. | 26. VIII 1 egz. z kwitnącej cykoryi, Ojców. |
| 126. <i>Rhisophagus dispar</i> Payk. | 1. IV 6 egz. pod korą butwiejących jodeł i buków, Ojców. |
| 127. <i>Rh. bipustulatus</i> F. | 1. IX 2 egz. pod korą buków; Ojców. |

Cryptophagidae — Skrytojadkowate.

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 128. <i>Atomaria Barani</i> Bris. | 25. VIII 1 egz. dolina Ojcowska. |
| 129. <i>A. gravidula</i> Er. | 22. VIII 1 egz. wysiany z próchna lipowego, Pieskowa Skała. |
| 130. <i>Ostypus globosus</i> Waltl. | 22. VIII 1 egz. tamże. |

Erotylidae — Zadrzewki.

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 131. <i>Triplax aenea</i> Schall. | 22. VIII 1 egz. wysiany z próchna lipowego, Pieskowa Skała. |
|-----------------------------------|---|

Phalacridae — Pleszakowate.

132. *Phalacrus fimetarius* F. 20—23. VIII 6 egz. czerpakiem z roślin; —
łąka, Ojców.
133. *Stilbus testaceus* P a u z. 31. VIII 5 egz. z sosny, Jamki.

Cisidae — Hubowcowate.

134. *Cis boleti* Scop. 25. VIII 2 egz. pod korą pnia wierzbowego;
dol. Ojcowska.

Colydiidae — Walcowate.

135. *Cerylon histeroides* F. 27. VIII 2 egz. w próchnie wierzbowym; do-
lina Ojcowska.

Coccinellidae — Biedronkowate.

136. *Subcoccinella 24-punctata* L. 26. VIII 2 egz. z olszyny na parasol. Ojców.
137. *Cynegetis impunctata* L. 31. VIII 1 egz. z roślin, Ojców.
138. *Aphidecta oblitterata* a. 6-notata. 20. VIII 1 egz. z modrzewia na parasol,
Th u n b. Ojców.
139. *Adalia bipunctata* L. 20—31. VIII pospolita na rozmaitych roślinach,
Ojców.
140. *Coccinella 7-punctata* L. 20—31. VIII tamże.
141. *C. 5-punctata* L. 20—31. VIII tamże.
142. *Synharmonia sinuato-marginata* 25. VIII 1 egz. z roślin czerpakiem; Ojców
F a l d.
143. *Mysia oblongoguttata* L. 28. VIII 1 egz. z sosny na parasol; dolina
Ojcowska.
144. *Propylaea 14-punctata* L. 20—31. VIII pospolita; z rozmaitych krzewów
na parasol, Ojców.
145. *Pr. 14-punct. a. c. tertragonata* 20. VIII 1 egz. z olszyny, Ojców.
L a i c h.
146. *Pr. 14-punct. a. c. bilunata* Walter. 25. VIII 2 egz. z krzewów na parasol, Ojców.
147. *Pr. 14-punct. a. c. angularis* Sajo. 22. VIII 2 „ „
148. *Pr. 14-punct. a. c. lunata* Walt. 25. VIII 1 „ „
149. *Pr. 14-punct. a. c. palustris* Sajo. 25. VIII 1 „ „
150. *Pr. 14-punct. a. c. biflexuosa* Weise. 20. VIII 2 „ „
151. *Pr. 14-punct. a. c. Frivaldszkyi* 26. VIII 2 „ „
S a j o.
152. *Chilocorus bipustulatus* L. 26. VIII 1 „ „
153. *Exochomus quadripustulatus* L. 27. VIII 1 „ „
154. *Clitosthetus arcuatus* Rossi. 28. VIII 1 „ z sosny na parasol, koło Oj-
cowa.

Helodidae — Jarzmikowate.

155. *Helodes minuta* L. 27. VIII 1 egz. w Prądniku koło tamy, wypadkowo, Ojców.

Dryopidae.

156. *Dryops luridus* Er. 22. VIII 2 egz. na rżysku w Pieskowej Skale.
 157. *Latelmis opaca* Müll. 27. VIII pospolity w Prądniku, w Ojcowie koło tamy, też w Sąspówce pod kamieniami.
 158. *Rtolus cupreus* Müll. 27. VIII tamże pospolity.

Dermestidae — Skórnikowate.

159. *Authrenus pimpinellae* F. 1. IX 1 egz. na ścianie stodoły pod Smardzewem.

Buprestidae — Bogatkowate.

160. *Trachys minuta* L. 28. VIII 2 egz. z sosny na parasol, Ojców.

Anobiidae — Kołatkowate.

161. *Oligomerus brunneus* Oliv. 22. VIII 1 egz. wysiany z próchna lipowego; Pieskowa Skała.
 162. *Trypopitys carpini* Herbst. 20. VIII 1 egz. w lot; Ojców.

Lagriidae — Omiękowate.

163. *Lagria hirta* L. 20. VIII pospolita, z traw, ziół i krzewów, Ojców.

Tenebrionidae — Czarnuchowate.

164. *Tenebrio molitor* L. 24. VIII 1 egz. w sieni; Ojców.

Cerambycidae — Kózkowate.

165. *Spondylis buprestoides* L. 20. VIII 1 egz. na drodze; dol. Ojcowska.
 166. *Prionus coriarius* L. 22. VIII 1 egz. w rowie obok lasu, dolina Ojcowska.
 26. VIII 1 egz. w lot o 7½ w. dol. Bentkowska.
 167. *Rhagium mordax* Deg. 31. VIII 1 egz. młody pod korą jodłową; Ojców.
 168. *Hargium inquisitor* L. 26—31. VIII masowo gąsienice i poczwarki pod korą jodłową; z zebranych poczwarek wylęgły się chrząszcze między 31 VIII i 3 IX.

Chrysomelidae — Żłotki.

169. *Lema cyanetta* L. 25—30. VIII po 1 egz. z roślin na łące, w dolinie Ojcowskiej, pod kamieniem i z olszyny w pobliżu grotty Jerzmanowskiej.
170. *Cryptocephalus pini* L. 29. VIII 3 egz. z młodej sosny na parasol; Jamki.
171. *Cr. Moraci* L. 20. VIII 1 egz. z trawy; dol. Ojcowska.
172. *Cr. Moraci a. bivittatus* Gyll. 30. VIII 1 egz. na rżysku w pobliżu grotty Wierzchowskiej.
173. *Cr. ocellatus* Drap. 21. VIII 2 egz. z brzozy na parasol; Ojców.
174. *Cr. rufipes* Goeze. 30. VIII 1 egz. na rżysku w pobliżu grotty Wierzchowskiej.
175. *Pachnophorus pilosus* Rossi. 28. VIII 1 egz. z roślin czerpakiem; dolina Ojcowska.
176. *Chrysomela rufa* Duft. 23. VIII 2 egz. sparzone pod kamieniem, dolina Ojcowska.
177. *Chr. staphylea* L. 28. VIII 2 egz. na drodze; dol. Ojcowska.
178. *Phaedon cochleariae* F. 22. VIII 2 egz. z roślin nadwodnych nad Prądnikiem; Ojców.
179. *Lochnuaca capreae* L. 20—31. VIII pospolite; z wierzbiny; dolina Ojcowska.
180. *Galerucella lincola* F. 22. VIII pospol. z mentha aquatica; dolina Ojcowska.
181. *Crepidodera ferruginea* Scop. 22. VIII 2 egz. z leszczyny, Pieskowa Skała.
182. *Chaetocuma aridula* Gyll. 25. VIII 1 egz. z roślin, czerpakiem, dolina Ojcowska.
183. *Haltica tamaricis* Schrauk. 20. VIII pospol. z wierzbiny, dol. Ojcowska.
184. *Phyllotreta sinuata* Steph. 25. VIII 1 egz. z roślin, czerpakiem, dolina Ojcowska.
185. *Ph. atra* F. 22. VIII 3 egz. tamże.
186. *Ph. cruciferae* Goeze. 25. VIII 2 „ „
187. *Aplitona euphorbiae* Schrauk. 20—28. VIII po 1 egz. z wierzbiny na parasol; dolina Ojcowska.
188. *Longitarsus brunneus* Duft. 26. VIII 2 egz. z roślin; czerpakiem, dolina Ojcowska.
189. *L. luridus* Scop. 22. VIII 1 egz. z leszczyny, Ojców.
190. *L. tabidus* F. 26. VIII 1 egz. z roślin czerpakiem, dolina Ojcowska.
191. *Cassida stigmatica* Suffr. 20. VIII 2 egz. tamże.
192. *C. sanguinolenta* Müll. 20. VIII 2 „ „
193. *C. rubiginosa* Müll. 20. VIII 1 „ „
194. *C. nebulosa* L. 20. VIII 1 „ „
195. *C. flaveola* Thunb. 28. VIII 1 egz. z roślin, czerpakiem, koło Sfinksa.
196. *Cassidula nobilis* L. 30. VIII 1 egz. z olszyny na parasol, w pobliżu grotty Wierzchowskiej.

Curculionidae — Ryjkowce.

197. *Otiorrhynchus Juscipes* Ol. 20—26. VIII masowo z kruszyny, Ojców; z leszczyny Pieskowa Skała; 1 egz. wysiany z liści, dol. Sąspowska.
198. *O. raucus* F. 26. VIII 1 egz. na drodze, dol. Ojcowska.
199. *Tournieria ovata* L. 26. VIII 1 egz. pod kamieniem; Jamki.
200. *Thomsoneonymus sericeus* Schall. 29. VIII pospol. z leszczyny; Ojców.
201. *Strophosomus melanogrammus* Forster. 20. VIII pospol. z wierzby, na parasol, dolina Ojcowska.
202. *Str. capitatus* Degr. 20. VIII 1 egz. z leszczyny, koło Jerzmanowskiej groty.
203. *Str. albolineatus* Seidl. 28. VIII pospol. z osiny, koło Sfinksu.
204. *Neliocarus faber* Herbst. 20. VIII pospol. z wierzby, dol. Ojcowska.
205. *Brachyderes incanus* L. 29. VIII 2 egz. z sosny koło Jerzmanowskiej groty.
206. *Sitona lineata* L. 20—25. VIII 6 egz. czerpakiem z roślin, dolina Ojcowska, też 1 egz. u mrówek czarnej pod kamieniem, tamże.
207. *S. sulcifrons* Thunb. 20—29. VIII pospol. z sosny koło Sfinksu, z koniczyny w dol. Bentkowskiej, z roślin rozm., dol. Ojcowska.
208. *S. flavescens* Marsch. 22. VIII 2 egz. nad Prądnikiem; dol. Ojc.
209. *Chlorophanus viridis* L. 27. VIII 1 egz. z tataraku nad Prądnikiem. Ojców.
210. *Fhytonomus punctatus* F. 20—31. VIII 5 egz. z wierzby, z roślin, dolina Ojcowska; na rżysku koło Wierzchowskiej groty.
211. *Ph. pedestris* Payk. 22. VIII 1 egz. na pastwisku; Pieskowa Skała.
212. *Brachonyx pineti* Payk. 29. VIII 3 egz. z sosny; Bembło.
213. *Orchestes stigma* Germ. 27. VIII 1 egz. z wierzby koło Sfinksu.
214. *Gymnetron villosulum* Gyll. 22. VIII 1 egz. z trawy nad wodą; dolina Ojcowska.
215. *Cionus tuberculosus* Scop. 22. VIII 1 egz. z wierzby, Ojców.
216. *Ceratapion onopordi* Kirby. 20. VIII 2 egz. z roślin; dol. Ojcowska.
217. *C. penetrans* Germ. 26. VIII 1 egz. tamże.
218. *Exapion hungaricum* Desbr. 20. VIII 1 „ „
219. *Oxystoma pomonae* F. 26. VIII 1 egz. z jarzębiny, Ojców.
220. *O. craccae* L. 20. VIII 3 egz. z roślin, dol. Ojcowska.
221. *Podapion flavipes* Payk. 28. VIII 2 egz. z jodły około Sfinksu.
222. *Apion vireus* Herbst. 26. VIII 1 egz. z jarzębiny; Ojców.
223. *Pselaphorhynchites nanus* Payk. 29. VIII 1 egz. z leszczyny; Bembło.
224. *Lasiorrhynchites sericens* Herbst. 29. VIII pospol. z wierzby; Ojców.
225. *Involuvulus cupreus* L. 26. VIII 1 egz. z jarzębiny; Ojców.
226. *Byctiscus populi* L. 28. VIII 3 egz. z młodej osiny koło Sfinksu.
227. *Apoderus coryli* L. 22. VIII 1 egz. z leszczyny; Pieskowa Skała.

Ipidae — Kornikowate.

- | | |
|--|---|
| 228. <i>Myelophilus piniperda</i> L. | 22. VIII 1 egz. pod korą sosnową, Ojców. |
| 229. <i>Pityogenes quadrideus</i> Hartig. | 21. VIII pospolity pod korą powalonych pni świerkowych o rozmaitem zabarwieniu; też dużo poczwerek. |
| 230. <i>Dryocoetes autographus</i> Ratzeb. | 31. VIII 2 egz. pod korą świerkową; Jamki. |
| 231. <i>Xyloterus lineatus</i> Oliv. | 20. VIII i I. IX po jednym egz. pod korą jodeł; Ojców. |

Scarabacidae — Chrabąszczowate.

- | | |
|--|--|
| 232. <i>Colobopterus erraticus</i> L. | 29. VIII 1 egz. w ekskrem. krowich; Bembło. |
| 233. <i>Otophorus haemorrhoidalis</i> L. | 27. VIII 2 egz. w ekskrem. krowich, dolina Ojcowska. |
| 234. <i>Aphodius fimetarius</i> L. | 22. VIII pospol. ekskr. krowie, Ojców, Pieskowa Skała. |
| 235. <i>Bodilus rufus</i> Moll. | 25. VIII pospol. tamże. |
| 236. <i>Acrossus rufipes</i> L. | 22. VIII „ „ |
| 237. <i>Geotrupes stercorarius</i> L. | 25. VIII 1 egz. w ekskrem krowich, drugi egz. pod flakami z kury; dol. Ojcowska. |
| 238. <i>Anoplotrupes stercorosus</i> | 21—26. VIII pospol. w ekskrem. krowich; dol. Ojcowska. |

Oprócz powyższych posiadam w zbiorze swoim w Ojcowie następujące gatunki:

- | | |
|---|---|
| 1. <i>Chaetocarus intricatus</i> L. | V. 1910 para w pobliżu groty Łokietka. |
| 2. <i>Cryptocephalus vittatus</i> F. | VI. 1912 } ofiarowane mi łaskawie przez |
| 3. <i>Cryptoc. flavipes</i> F. | VI. 1912 } p. Hildta. |
| 4. <i>Phytodecta viminalis</i> L. | VI. 1912 „ z licznymi odmianami. |
| 5. <i>Ph. viminalis a. 10-punctata</i> L. | VI. 1912 |
| 6. <i>Ph. vimin. a. 6-punctata</i> | VI. 1912 nie posiada punktu tylniego wewnętrznego. |
| 7. <i>Ph. vimin a.</i> | VI. 1912 nie posiada punktu tylniego zewnętrznego. |
| 8. <i>Ph. Linnaeana</i> Schrauk. | VI. 1912 ofiarowana mi łaskawie przez p. L. Hildta. |
| 9. <i>Ph. Linnaeana a.</i> | VI. 1912 „ |
| 10. <i>Elleschus scanicus</i> Payk. | VI. 1912 „ |

Wykaz niniejszy ułożyłem podług „Catalogus Coleopter. Europae“. L. v. Heyden, E. Reitter, J. Weise, 1906 r.

Obok nazw łacińskich rodzin podałem i polskie, według K. Kulwiecia (Chrząszcze Polskie), proponując dla rodzin nie wymienionych u powyższego autora, następujące nazwy polskie: *Sphaeritidae* — Kulkowate, *Cisidae* — Hubowcowate, *Colydiidae* — Walcowate, *Dryopidae* — Pleśniakowate, *Scarabaeidae* — Chrabąszczowate (u K. Kulwiecia: Wachlarzorożne, lecz obejmują i Jelonkowate).

W określeniu niektórych gatunków dopomógł mi łaskawie p. L. Hildt, za co Mu niniejszem składam podziękowanie.