

Aeshna viridis (EVERSMANN, 1836)

- Nadwieprzański Park Krajobrazowy, Ciechanki Łańcuchowskie k. Łęcznej (FB38). 25 VII 1993, 1 samica, głębokie oczko wodne zasilane własnym źródłem z panującym zespołem roślinnym *Nupharo-Nymphaetum*;
- otulina Poleskiego Parku Narodowego, użytek ekologiczny Ciesacin, (FB49). 10 VIII 1993, torfowisko niskie z oczkami wodnymi.
Gatunek wschodni, znany z większej części kraju.

Aeshna affinis (VANDER LINDEN, 1820)

- Tyszowce k. Zamościa (FB90). 23 VII 1992, 1 samiec, wysychające zbiorniki wodne wśród kserotermów, leg. K. PAŁKA.
Gatunek południowy, występujący głównie na południu kraju. W Polsce przebiega jego północna granica rozmieszczenia.

Orthetrum albistylum (SELYS, 1848)

- Zalew Zemborzycki, Zemborzyce k. Lublina (FB07), zbiornik zalewowy na Bystrzycy. 21 VI 1992, 1 samiec, 1 samica, złowione nad płytką zatoką „Rękaw”;
- rez. Jezioro Brzeziczno (FB49), 30 VII 1993, 2 samce, 1 samica;
- Park Krajobrazowy Lasy Janowskie, Lipa k. Janowa Lubelskiego (EB79). 4 VIII 1993, płytkie stawy otoczone rowami melioracyjnymi.
Gatunek południowy, wykazany w Polsce jedynie z kilku regionów: Jury Krakowsko-Wieluńskiej, Rostocza, Karpat Zachodnich, Śląska i Sudetów. Z Wyżyny Lubelskiej podawany dotąd jedynie z Kijan nad Wieprzem na podstawie obserwacji pojedynczego samca.

Leucorrhinia albifrons (BURMEISTER, 1839)

- rez. Jezioro Moszne (FC40), 28 VII 1992, 1 samiec.
Gatunek szeroko rozsiedlony, choć występujący bardzo lokalnie. Wykazany z Pomorza, Pojezierzy Mazurskiego i Suwalskiego, Wyżyny Lubelskiej oraz Wielkopolski, Kujaw, Śląska i Sudetów.

Serdecznie dziękuję Panu dr Andrzejowi ŁABĘDZKIEMU za sprawdzenie oznaczeń.

PAWEŁ BUCZYŃSKI, Lublin

86. Nowe stanowisko *Pterostichus (Adelosia) macer* MARSHAM, 1802 (*Coleoptera: Carabidae*) w Polsce

A new record of *Pterostichus (Adelosia) macer* MARSHAM, 1802 (*Coleoptera: Carabidae*) from Poland

Pterostichus macer MARSH. to gatunek szeroko rozprzestrzeniony w Europie. W Polsce rzadko znajdowany, wykazany z kilkunastu stanowisk rozmieszczonych na terenie prawie całego kraju, jednak większość doniesień pochodzi sprzed kilkadziesiąt lat (BURAKOWSKI i in., 1974: Kat. Fauny Polski, cz. XXIII, t. 3). Związany z żyznymi glebami, częstszy w ciepłych biotopach górskich (BURAKOWSKI i in., 1974), jednak znany dotąd zaledwie z kilku stanowisk w Karpatach: dorzecze górnej Soły, Rabka, okolice Przemyśla (BURAKOWSKI i in., 1974) oraz Barwinek (WOJAS, 1992: Wiad. Entomol., 11: 143–147). W Karkonoszach, gdzie gatunek ten nie był notowany, autor złowił 1 ex. (det. T. WOJAS) 21 VII 1988 w okolicy schroniska PTTK „Pod Łabskim Szczytem” około 1500 m n.p.m., na wilgotnej łące pod kamieniem (kwadrat UTM – WS42). Gatunek nowy dla polskich Sudetów.

ANDRZEJ LASOŃ, Białystok