

AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI W KRAKOWIE.

SPRAWOZDANIE  
KOMISYI FIZYJOGRAFICZNEJ


obejmujące

pogląd na czynności dokonane w ciągu roku 1890,

oraz

Materyjały do fizyjografii krajowej.

Tom dwudziesty szósty.



KRAKÓW,

NAKŁADEM AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI.

SKŁAD GŁÓWNY W KSIĘGARNI SPÓŁKI WYDAWNICZEJ POLSKIEJ.

1891.

6084.

# WYKAZ

## chrząszczów nowych dla fauny Galicyi.

Napisał

A. M. Łomnicki.



Od czasu ukazania się ostatniego wykazu<sup>1)</sup> chrząszczów galicyjskich (*Catalogus coleopterorum Haliciae, Leopoli 1884*), zawierającego podówczas 3182 gatunków i 130 odmian, badania w tym rzędzie owadów nie ustawały w ostatniem pięcioleciu. Zbierałem je w rozmaitych okolicach Galicyi wschodniej a głównie około Lwowa, zkąd też stosunkowo największa liczba nowych gatunków przybywa. Do wykrycia wielu tych form przyczynił się mój syn Jarosław, zajęty w latach poprzednich zbieraniem owadów w okolicy Markowej (pow. podhajecki) nad Złotą Lipą, w Nadorożniowie pod Brzeżanami, tudzież w różnych miejscowościach powiatu złoczowskiego i brodzkiego, jakoteż J. Mazurek, uczeń gimn., tak w okolicy Lwowa jak Pieniak (pow. brodzki).

Liczba dotychczas znanych w Galicyi gatunków po wykreśleniu z dawniejszego spisu 4 wątpliwych<sup>2)</sup> a włączeniu poniżej wykazanych 162 form wraz z 22 odmianami wynosi obecnie 3340 i 162 odmian<sup>3)</sup>.

<sup>1)</sup> Pierwszy wykaz galicyjskich chrząszczów, zestawiony przed 30 laty przez Dr. M. Nowickiego (*Coleopterologisches über Ostgalizien, Sambor, 1858*) zawierał tylko 1045 g., podówczas głównie z okolicy Sambora, Lwowa i Brodów znanych.

<sup>2)</sup> Opuścić należy: *Agabus confinis* Gyll., *Rhynchites giganteus* Kryn., *Rhopalopus femoratus* L., *Phytoecia fumigata* Klst.

<sup>3)</sup> Z sąsiednich krajów jedynie fauna Śląska pruskiego, prowincyi najdokładniej w środkowej Europie zbadanej, przewyższa naszą, gdyż według osta-

- Cychnus semigranosus* Palld. Kilka okazów wykrył mój syn w Markowej nad Żłotą Lipą pod spróchniałymi kłodami w starym lesie bukowym.
- Megadontus obliquus* Thoms. var. *Andrzejowskii* Fisch. Okazy pochodzą z okolicy Grzymałowa (Bucyki) w Tarnopolskiem i z pode Lwowa, gdzie się atoli dość rzadko znajdując tak na otwartych stanowiskach pod kamieniami jakoteż na przedlesiach, w ogrodach i zacienionych debrach. Zniesienie, Krzywczyce, Kleparów, Pohulanka i t. d., głównie na wiosnę i w jesieni. Okazy jednak lwowskie odstępują nieco od typowej formy podolskiej, która dotychczas uchodziła w spisach za *M. violaceus* L.
- Ophonus cordatus* Duft. Wszystkie okazy pochodzą z Makutry i Hołdów w okolicy Brodów, zebrane d. 1 Sierpnia pod kamieniami wraz z *C. scabriusculus* Ol. var. *erythropus* Fisch. i *C. Estreicherii* Fisch.
- Europhilus gracilis* Gyll. Dwa okazy w lesie bukowym pod opadłym liściem; Czartowska Skała 17. VI., Krzywczyce 28. IX.
- Olisthopus Sturmii* Duft. Bardzo rzadko znajdując się w bardzo zacienionych i wilgotnych debrach pod mechem i opadłym liściem. Krzywczyce pode Lwowem na wiosnę (5. V) i w jesieni (26. IX).
- Masoreus Wetterhali* Gyll. Jedyne okazy pochodzą z Hołoska, gdzie go w borku sosnowym d. 7. VI na piaszczysku pod wrzosem wykryłem.
- Haliphys amoenus* Ol. (*obliquus* Er.) W bagnach na Snopkowie (przedm. Lwowskie) rzadki; 5. V—10. X.
- Bidessus parvulus* Müll. (*unistriatus* St.). W najmniejszych potoczkach i bagnach zwyczajny; Zniesienie, Bogdanówka i t. d. 1. V—7. X.
- Hydroporus minimus* Scop. (*granularis* L.). Lesienice pod Czar-towską Skałą, 8. IX.
- Agabus striolatus* Gyll. Według Dr. G. SEIDLITZA (*Bestimmungstabelle der Dytiscidae u. Gyrinidae des europäischen Faunengebietes*. Brünn. 1887) znajduje się w Galicyi wschodniej (l. c. str. 88) na podstawie okazów ze zbioru L. Millera.
- Autalia impressa* Ol. Hołosko, 13. IX.
- Aleochara ruficornis* Grav. Gaj pod Buczaczem, 20. IV; pod liściem opadłym.

---

niego opisu LETZNERA zawiera 3860 g.; Prusy wschodnie według LENTZA wykazały do r. 1879 tylko 3256 g., Morawia wraz ze Śląskiem austriackim według E. REITERA 3105 g., Czechy według LOKAJA 2898 g., Siedmiogród według KIRSCHBERGA tylko 2660 g.

- Aleochara erythroptera* Grav. We Lwowie na murze kamienicznym, 22. IV.
- Aleochara crassiuscula* Sahlb. Snopków pode Lwowem, 28. IX.
- Aleochara villosa* Mannh. Złapana na murze na Łyczakowskiem przedmieściu we Lwowie; 9. VI.
- Aleochara succicola* Thoms. Dwa okazy we Lwowie na murach kamienicznych 13 i 23. IV. (J. Łomnicki).
- Aleochara spadicea* Er. Bardzo rzadka w okolicy Lwowa.
- Myrmedonia lugens* Grav. Jedyne okaz pochodzi ze Zniesienia pode Lwowem złapany pod kamieniem d. 7. V. (J. Łom.).
- Homalota granigera* Kiesw. Sywula w górach stanisławowskich, powyżej górnej granicy lasów; w Sierpiu.
- Homalota pilicornis* Kiesw. Pohulanka (przedm. Lw.); 29. IX.
- Homalota sericans* Grav. Dość zwyczajna w okolicy Lwowa w lasach pod liściem i kłodami spróchniałemi; Pohulanka, Kortumówka, Hołosko i t. d.
- Homalota oblita* Er. Hołosko, 21. IX. (J. Łom.).
- Homalota putrida* Kr. Pohulanka w Lipcu.
- Homalota palustris* Kiesw. Lonszanówka (Kaiserwald), 19. IV.
- Homalota ravilla* Er. Lwów, 27. III. (J. Łom.).
- Placusa complanata* Er. Hołosko, 27. VIII; w lesie sosnowym.
- Placusa pumilio* Grav. Hołosko, 27. VIII; Angiełów nad Łomnicą (pow. kałuski), 18. VII.
- Thectura linearis* Grav. Wszystkie okazy pochodzą z okolicy Lwowa: Pohulanka, Bogdanówka, Hołosko; IV—X.
- Oxyypoda humidula* Kr. Czartowska Skała pode Lwowem, 16. V. pod liściem opadłym w lesie bukowym.
- Tachinus rufipennis* Gyll. Jedyne okaz pochodzi z Krzywezyce pode Lwowem, złapany d. 19. IV.
- Tachyporus atriceps* Steph. (*humerosus* Er.). W okolicy Lwowa dość rzadki: Pohulanka, Grzybowice; 30. IV—5. IX.
- Megacronus analis* Payk. Wysoki zamek, 20. IV. (J. Łom.).
- Heterothops 4-punctula* Gyll. Lwów, na murach kamienicznych 9. IV.; Hołdy pod Brodami 8. VI (J. Ł.).
- Quedius limbatus* Heer. Wołczyniec pod Stanisławowem, 31. V.
- Actobius villosulus* Steph. Dość rzadki, tak w mieście po murach jak i w najbliższej okolicy Lwowa: Snopków, Pasięki; 11. V. 3. VI.
- Actobius procerulus* Grav. W okolicy Lwowa rzadki tak w samem mieście po murach, jak w najbliższej okolicy.
- Philonthus longicornis* Steph. W okolicy Lwowa rzadki; Hołosko, Lesienice; 3. IV—21. X.
- Philonthus fumarius* Grav. Krzywezyce pode Lwowem, 12. V.
- Philonthus nigrita* Grav. Lesienice; w lesie bukowym pod liściem jedynny okaz złapany d. 11. IV.

- Xantholinus procerus* Er. W okolicy Lwowa rzadki; pod kamieniami w debrach i po lasach: Krzywezyce, Polulanka, Mokrotyn; 23. VI—28. VIII.
- Xantholinus decorus* Er. Jedyny okaz tego połud. europejskiego (Węgry, Grecyja) kusaka pochodzi z Markowej (pow. podhajecki), złapany w lesie bukowym pod spruchniałą kłodą dnia 30. VII. (J. Łom.).
- Lathrobium castaneipenne* Kr. Wysoki Zamek; 3. IV. pod kamieniem (J. Łom.).
- Lathrobium terminatum* Grav. Czartowska Skała przy Lesienicach d. 14. IV.
- Scopaeus sulcicollis* Steph. (*minutus* Ed.). Zwyczajny pod kamieniami na suchych zboczach okolicznych wzgórz lwowskich. Snopków, Hołosko i t. d. 26. IV—28. IX.
- Stilicis geniculatus* Steph. Dość rzadki około Lwowa; Snopków, Janów; 17. IV—1. VI.
- Sunius immaculatus* Steph. (*intermedius* Er.). Zniesienie, Krzywezyce; pod kamieniami; 7. V—5. VII.
- Stenus atratulus* Er. Krzywezyce pod Lwowem, 1. X.
- Stenus argus* Grav. Monasterzyska, 26 Kwietnia.
- Stenus crassus* Steph. W okolicy Lwowa, zład wszystkie okazy pochodzą, dość rzadki tak wśród miast po murach jak po debrach okolicznych wzgórz; Lwów (miasto), Łyczakowskie przedmieście i t. d. 2. IV—17. VII.
- Stenus Erichsoni* Rye (*flavipes* Er.). W lasach po wilgotnych debrach w mehu i pod liściem opadłym; Krzywezyce, Lesienice; 19. V—21. VIII.
- Bledius atricapillus* Germ. Jedyny okaz pochodzi ze Zniesienia, (Wężowa dolina), złapany na mokrawinie przy źródle, 7. VI.
- Bledius procerulus* Er. Krzywezyce, 5. VII.
- Bledius nanus* Er. Dwa okazy złapane pod Łyczakowską rogatką d. 26. V.
- Platystethus capito* Heer. Snopków, d. 1 Maja.
- Oxytelus hamatus* Fair. Obroszyn, 13. V.
- Trogophloeus gracilis* Mannh. Bucyki pod Grzymałowem na mokrej łące d. 25. VII.
- Trogophloeus pusillus* Grav. Jedyny okaz złapany na murze we Lwowie d. 6 Kwietnia.
- Lathrimaenum melanocephalum* Ill. Krzywezyce, 2. V.
- Homalium lapponicum* Zett. Hołosko pod Lwowem, 27. VIII.
- Siagonium quadricorne* Krb. Bardzo rzadkie w okolicy Lwowa; dotychczas znalazłem tylko dwa okazy: w Krzywezycach d. 5. VII i na Wysokim Zamku d. 27. VIII.
- Bythinus distinctus* Chaud. Bucyki pod Grzymałowem w Sierpniu.

- Scydmaenus scutellaris* Müll. Hołosko, 13 Września pod liściem opadłym.
- Euconnus denticornis* Müll. Zniesienie, 11 Czerwca, w mchu.
- Eumicrus tarsatus* Müll. Jeden okaz pochodzi z samego Lwowa, złapany na murze d. 16 Maja (J. Łom.); drugi okaz ze Zniesienia pode Lwowem, 8 Czerwca.
- Eumicrus Hellwigii* F. Markowa, 2 Sierpnia (J. Łom.).
- Choleva intermedia* Kr. Lwów; wśród miasta złapany na murze kamienicznym d. 21. VI.
- Ptomaphagus fuscus* Panz. Złapany we Lwowie wśród miasta na murze d. 10. IV. (J. Maz.)
- Ptomaphagus chrysoloides* Pr. Złapany we Lwowie na Łyczakowskim przedmieściu, d. 18. IV.
- Ptomaphagus Kirbyi* Spence. Czartowska Skała, 12. VI..
- Colon angulare* Er. Jedyny okaz pochodzi ze Zniesienia, złapany d. 9 Czerwca.
- Colon latum* Kr. Lesienice, 2 Czerwca.
- Parasilpha oblonga* Küst. Jedyny okaz pochodzi z Mieczyszczoza (pow. brzeżański) złapany d. 18. VIII.
- Parasilpha polita* Sulz. Żulicka góra pod Złoczowem; w Sierpniu (J. Łom.).
- Necrophorus vestigator* Hersch. W okolicy Lwowa nierezadki; najwięcej okazów zebrałem na ścierwie pod Lonszanówką, na Zniesieniu i pod rogiatką Łyczakowską; 17. IV—12. IX.
- Liodes Triepkei* Schmidt. Obroszyn, 13 Sierpnia.
- Liodes brunnea* St. Wszystkie okazy zebrane są w okolicy Lwowa: Wulka, Łyczaków, Krzywezyce, Pasieki; 7. VI—21. VIII.
- Liodes rubiginosa* Schmidt. Kleparów, 20. V.
- Liodes parvula* Sahlb. Pohulanka, 27. V.
- Cyrtusa minuta* Alr. Bartatów, 31. VII.
- Scaphisoma subalpinum* Reitt. Markowa, 2 Sierpnia pod korą buka (J. Łom.).
- Olibrus aenescens* Küst. Kilka okazów znalazłem w okolicy najbliższej Lwowa i w samym mieście po kwiatach; Łyczaków, Zniesienie; 22. IV—11. VI.
- Triplax rufipes* F. Pasieki pode Lwowem 11. VIII. w grzybie drzewnym.
- Dapsa denticollis* Germ. Jedyny okaz pochodzi z Kręciłowa nad Zbruczem (pow. skałański), gdzie go d. 1 Maja znalazłem przy „pustelni“.
- Telmatophilus Typhae* Fall. Lesienice, 11. IV. na łące w dolinie Marunki pod Winnikami.
- Atomaria atricapilla* Steph. Dwa okazy pochodzą ze Stanisławowa a jeden z Angielowa (pow. kałuski), złapany pod korą drzewa d. 26 Lipca.

- Atomaria atra* Hbst. Hołosko, 26 Kwietnia.  
*Enicmus testaceus* Steph. Markowa, 2 Sierpnia (J. Łom.).  
*Cartodere elegans* Aube. Krzywezyce, 23 Maja.  
*Melanophthalma distinguenda* Com. Bucyki pod Grzymałowem,  
 d. 25. VII.  
*Melanophthalma truncatella* Mannh. Angielów nad Łomnicą (pow.  
 kałuski) d. 22. VII.  
*Tritoma 10-punctata* F. Pohulanka, 27 Maja.  
*Brachypterus unicolor* Hbst. Wulka pode Lwowem, 3 Czerwea; Sta-  
 nisławów, 14 Czerwea.  
*Meligethes pumilus* Er. Lesienice pod Lwowem 2 Czerwea.  
*Meligethes Friwaldzkyi* Reitt. Jedyny okaz pochodzi ze Lwowa.  
*Orthocerus tereticornis* Er. Zniesienie, 14. IX; Pasiaki, 5. IX; na  
 zboczach suchych i trawiastych dość rzadki.  
*Rhysodes sulcatus* F. Jedyny okaz pochodzi z Markowcj, złapany  
 d. 30. VII w buku spróchniałym (J. Łom.).  
*Monotoma conicicollis* Aube. Pochodzi z Galicji zachod. (zb. Kotula).  
*Monotoma quadricollis* Aube. Lonszanówka (Kaiserwald), 13. VIII.  
 na suchem zboczu.  
*Monotoma picipes* Hbst. W okolicy Lwowa rzadka: Zamarstynów,  
 7. VI; śródmieście (na murze), 13. VI; Bartatów, 28. VII.  
*Dermestes atomarius* Er. Kleparów, 15 Maja.  
*Platysoma filiforme* Er. Angielów nad Łomnicą, gdzie znajdowa-  
 łem je dość często pod korą drzewną, d. 29. VIII.  
*Hister succicola* Thoms. Zubrza i Bogdanówka w okolicy Lwowa  
 w Maju; Markowa, 2 Sierpnia.  
*Onthophilus striatus* Forster. W okolicy Lwowa znalazłem tylko  
 jeden okaz na brzegu lasu Biłhoreckiego pod nieżywą żabą.  
*Abraeus globulus* Creutz. Zniesienie, 4 Lipca.  
*Abraeus granulum* Er. Markowa w spróchniałym buku, 2. VIII.  
*Aceritus atomarius* Aube. Markowa, razem z poprzednim (J. Łom.).  
*Onthophagus semicornis* Panz. Sadržawki (pow. skałacki), 1 Maja.  
*Psammodius vulneratus* Sturm. Krzywezyce; 9 Czerwea.  
*Agrilus hastulifer* Ratz. Krzywezyce, 23 Maja.  
*Dirrhagus lepidus* Rosh. Hucisko Brodzkie, 30 Lipca. (J. Maz.).  
*Athous Łomnickii* Reitt. W okolicy Lwowa zwyczajny po przedle-  
 siach i porębach w Maju i Czerweu. Hołosko, Zniesienie,  
 Krzywezyce i t. d.  
*Phloeophilus Edwardsi* Steph. Markowa nad Złotą Lipą (pow. pod-  
 hajceki); w lesie bukowym, 11. VIII. (J. Łom.).  
*Niptus hololeucus* Fald. Jedyny okaz pochodzi ze Lwowa, złapany  
 d. 6. X. na murze (J. Łom.).  
*Bruchus pusillus* St. Nierzadki w najbliższej okolicy Lwowa: Kle-  
 parów, Snopków i t. d., także po murach i parkanach wśród  
 miasta; 2. IV—20. V.

- Ernobius angusticollis* Ratz. Okolice Lwowa: Krzywezyce, Zniesienie, Hołosko i t. d.; w Czerweu.
- Hedobia regalis* Dft. Dość zwyczajny w okolicy Lwowa: Pohulanka, Czartowska Skala i t. d. po kwiatach; 16. V—12. VI.
- Dorcotoma serra* Pz. Jedyny okaz pochodzi z Pieniak, złapany d. 22 Lipca (J. Mazurek).
- Cis bicornis* Mel. E. Reitter (*Beitrag zur Coleopterenfauna d. Karpaten*, str. 56). Bardzo rzadki w Beskidzie, na Śląsku i w Karpatach wschodnio-galicyskich.
- Rhopalodontus fronticornis* Pz. Wszystkie okazy złapałem w muzeum J. Exc. hr. Dzieduszyckiego. Wylęgły się one w drugiej połowie Maja z grzybów drzewnych.
- Ennearthron opaculum* Reitt. E. Reitter (*Beitrag zur Coleopterenfauna d. Karpathen*, str. 57). W okolicy Cieszyna i w wschodnich Karpatach.
- Tribolium ferrugineum* F. Jedyny okaz pochodzi ze Lwowa.
- Phryganophilus rufiventris* Hampe. Lwów, 16 Maja.
- Lissodema 4-pustulatum* Mrsh. Kilka okazów pochodzi z okolicy Lwowa: Wulka, 18. VI., Zniesienie, 11. VI.
- Sitones Waterhousei* Walt. Snopków pode Lwowem. 28. IX.
- Sitones ononidis* Sharp. Uście Biskupie nad Dniestrem, 1 Sierpnia.
- Hypera anceps* Boh. Sokolniki koło Dzikowa (J. Jachno).
- Liosoma cribrum* Gyll. Jedyny okaz pochodzi z Kleparowa pode Lwowem, złapany d. 20 Maja w lesie powyżej kamieniołomu.
- Pissodes piniphilus* Hbst. Hołosko, 13 Czerwea; na młodych pędach sośniny rzadki.
- Dorytomus Silbermanni* Weneke. Hołosko, 11 Stycznia.
- Acalles turbatus* Boh. Bogdanówka w okolicy Lwowa, 28 Października.
- Magdalis carbonaria* L. Jedyny okaz pochodzi z lasu Lesienieckiego, złapany d. 13. VI.
- Magdalis barbicornis* Latr. Jeden okaz złapany w samym Lwowie na murze a drugi w lesie Krzywezyckim, 10 Czerwea.
- Bradybatus subfasciatus* Gerst. Dwa okazy pochodzą ze Lwowa, złapane w Maju i Czerweu.
- Tychius Schneideri* Hbst. Hołosko, 25 Maja.
- Tychius flavicollis* Steph. W okolicy Lwowa: Zniesienie, Pohulanka, i t. d. 11. VI—29. IX.
- Tychius Medicaginis* Bris. W okolicy Lwowa pospolity: Zniesienie, Pohulanka, Pasički, Snopków, Wysoki Zamek i t. d. 4. V—6. VII.
- Tychius difficilis* Tourn. Zniesienie, 4. Lipca.
- Sibinia potentillae* Germ. Zniesienie, 11 Czerwea.
- Gymnetron melanarium* Germ. Lesienice, 4 Czerwea; Hołosko, 10. VI.
- Nanophyes brevis* Boh. Zniesienie, 19. IX; Bartatów, 22. V.



- Rhinoncus albocinctus* Gyll. We Lwowie wśród miasta na murze, 28. V.; Zniesienie, 19. V.
- Baris nitens* F. Jeden okaz otrzymałem od p. Stobieckiego, złapany na Podolu nad dnierzańskiem.
- Apion Curtisii* Curt. Jeden okaz pochodzi ze Lwowa, złapany we we Wrzesniu, a drugi z Bucyck pod Grzymałowem w Sierpniu.
- Rhynchites uncinatus* Th. Dość zwyczajny po głogach i tarninie w drugiej połowie Maja: Pohulanka, Lesienice, Wysoki Zamek i t. d.
- Tropideres undulatus* Panz. Na płocie pod Cetnerówką, 2. VII.
- Mylabris pallidicornis* Boh. Kilka okazów złapałem w Czerwcu w okolicy Lwowa: Zniesienie, Wulka.
- Tomicus bidentatus* Hbst. Hołosko, 9. VI.
- Xyleborus dryographus* Ratz. Jedyne okaz pochodzi z Wysokiego Zamku, 26. V.
- Rhopalopus macropus* Germ. (*clavipes* Gyll.). W lasach po kwiatkach w okolicy Lwowa zwyczajny: Krzywezyce, Snopków, Pasiaki, Hołosko i t. d., 30. V—29. VI. Ryków (pow. złoczowski), 25. VI.
- Saperda similis* Laich. (*phoca* Fröhl). W okolicy Lwowa bardzo rzadki: Lesienice, 16. VI. Podał go także Dr. M. Nowicki z okolicy Sambora (*Coleop. a. Ostgal. Samborer Gym. Prog.* 1858); w późniejszych jednak spisach został opuszczony.
- Phytoecia virgula* Chrp. (*punctum* Muls.). Snopków, 15. VI.
- Donacia impressa* Payk. (♀ *brevicornis* Kunze). Janów nad Wereszycą, 17. VI.
- Plateumaris discolor* Panz. Wulka, 8. VI.
- Lema Erichsoni* Suffr. Rzadka w okolicy Lwowa; kilka okazów pochodzi ze Snopkowa, 1. V.
- Chrysomela oricalcia* Müll. Jedyne okaz pochodzi z Podegrodzia nad Gniłą Lipą pod Rohatynem, złapany w namulisku rzeczonym d. 7. IV. (Jar. Łom.).
- Chrysomela quadrigemina* Suffr. Wszystkie okazy pochodzą z Hołoska; bardzo pospolity na świętojańskim ziele (*Hypericum*) w drugiej połowie Czerwca; 14. VI—28. VI.
- Orina decora* Richt. Górską tę stonkę podaje Reitter z Karpat śląskich na pograniczu Galicyi.
- Phyllodecta laticollis* Suffr. Dwa okazy pochodzą z pod Czartowskiej Skały pode Lwowem, złapane w Maju i Czerwcu na iwinię.
- Galleruca melanocephala* Ponza (*haematidea* Germ.). Jedna para na wiklinie, 12 Maja pod Biłohorszcą na torfowisku (J. Ł.).
- Chaetocnema compressa* Letz. Na suchych i otwartych stanowiskach trawiastych dość rzadka. Hołosko, Zniesienie (w Czerwcu).

- Longitarsus Linnei* Dft. W okolicy Lwowa miejscami na ostronleczu (*Euphorbia cyparissias*) dość zwyczajny: Pohulanka, Zniesienie, Wulka, Wysoki Zamek; 7. VI—10. VII.
- Halysia sedecimguttata* L. Zwyczajna szczególnie w lasach bukowych wszędzie w okolicy Lwowa. Pohulanka, Krzywezyce, Lesienice, Wysoki Zamek i t. d. 25. III—27. VIII. Najliczniej pojawia się w połowie Maja.

### Ôdmiany nowe gatunków znanych w Galicyi.

- Cicindela germanica* L. var. **obscura** F. Okolice Lwowa: Wulka, Pasieki, Bednarówka i t. d.
- Carabus obsoletus* St. var. **carpathicus** Palld. Urycz; jeden okaz otrzymałem od prof. E. Turczyńskiego.
- Carabus Estreicheri* Fisch. var. **Jaegeri** Mén. Kilka okazów wraz z typowym gatunkiem złapał J. Łom. na Hołdach w okolicy D itkowiec (pow. brodzki).
- Calosoma inquisitor* L. var. **violaceum** Westh. W okolicy Lwowa dość rzadki (przy końcu Maja i w pierwszej połowie Czerwca).
- Dytiscus marginalis* L. var. **circumductus** Serv. (♀). W okolicy Lwowa rzadki.
- Dytiscus circumcinctus* Ahr. var. **dubius** Gyll. (♀). Zniesienie, 13 Stycznia.
- Graphoderes cinereus* L. var. **intermedius** West. Hołosko, 1 Maja.
- Graphoderes cinereus* L. var. **simulator** Westh. Bogdanówka, 8 Maja.
- Oxyopoda ruficornis* Gyll. var. **spectabilis** Maerk. Jedyne okaz pochodzi z Pasiiek, złapany pod liściem opadłym w lesie.
- Mycetoporus brunneus* Marsch. var. **bimaculatus** Lac. Jeden okaz pochodzi ze Snopkowa a drugi z samego Lwowa, złapany d. 5 Maja.
- Stenus providus* Er. var. **Rogeri** Kr. J. Weise podaje tę odmianę z Czarnohory.
- Attagena piceus* Ol. var. **sordidus** Heer. We Lwowie na murze ogrodowym, 18 Lipca.
- Cetonia floricola* Hbst. var. **obscura** And. Czartowska Skała pod Lwowem, 17 Czerwca.
- Cetonia floricola* Hbst. var. **vollhynensis** Gory. Czartowska Skała, Kamienopol pod Lwowem w Czerwcu i Lipcu.

- Melolontha hippocastani* F. var. **nigripes** Com. W okolicy Lwowa zarówno pospolicie jak typowa forma (pojawia się w drugiej połowie Kwietnia a pierwszej Maja).
- Anthonomus pomorum* L. var. **Piri** Koll. Snopków, 15. IV.; Kleparów, 20. V.
- Crioceris Asparagi* L. var. **campestris** F. Zamarstynów, 15. VIII.
- Gastroidea polygona* L. var. **ruficollis** F. Krzywezyce, 24. V.
- Chrysomela analis* L. var. **lomata** Hbst. Snopków, 23. III.
- Hydrothessa hannoverana* F. var. **Calthae** Weise. Pohulanka, 21. V.
- Crepidodera helvinae* L. var. **cyanea** Marsh. Hołosko, 4. VI.
- Cassida ornata* Creutz var. **lucida** Suffr. Lonszanówka 19. IX.

Niektóre w dawniejszych spisach podawane gatunki występują u nas nie w typowych formach, jak w zachodniej i środkowej Europie, lecz mniej lub więcej zbaczają od nich, jako zastępcze ich odmiany. Są one właściwe naszej krainie, leżącej na rozgraniczu fauny zachodnio i wschodnio europejskiej. Żanim dokładna rewizycja przez porównanie naszej fauny z postronną wykaże i w innych rodzinach zastępcze formy, podaje tymczasowo tylko kilka zwyczajniejszych gatunków, nieokreślanych dawniej jako odmiany.

*Procrustes coriaceus* L. = *P. cor.* var. **rugifer** Krtz.

*Carabus cancellatus* Ill. = *C. can.* var. **tuberculatus** Schm.

*Megadontus violaceus* L. = *M. viol.* var. **Wolfi** Dej.

*Orina luctuosa* Ol. (z Janowa) = *O. luct.* var. **rugulosa** Suffr.