

kwiecie mniszka pospolitego w rezerwacie „Mokry Bór” (Świętokrzyski Park Narodowy), obejmującym fragmenty podmokłych zespołów leśnych boru bagiennego i boru trzcinnikowego.

Z kolei jeden egzemplarz *E. primulae* odłowilem 24 V 1996 r. na łące przylegającej do lasu jodłowo-bukowego rosnącego w granicach Świętokrzyskiego P. N., w miejscowości Huta Szklana. Ten nieczęsto poławiany w Polsce gatunek, znany jest z około 10 stanowisk zlokalizowanych głównie na południu kraju. Jest elementem europejskim, nie należy jednak do grupy gatunków górskich.

Oba okazy dowodowe znajdują się w moim zbiorze.

Tadeusz WOJAS, Kraków

198. Informacje o występowaniu w Poznaniu *Cybocephalus politus* (GYLLENHAL, 1813) i *Cybocephalus fodori* ENDRÓDY-YOUNGA, 1965 (*Coleoptera: Cybocephalidae*)

The data on the occurrence of *Cybocephalus politus* (GYLLENHAL, 1813) and *Cybocephalus fodori* ENDRÓDY-YOUNGA, 1965 (*Coleoptera: Cybocephalidae*) in Poznań

KEY WORDS: *Coleoptera, Cybocephalidae, Cybocephalus politus, Cybocephalus fodori*, records, Poznań, Poland.

Rodzina *Cybocephalidae* obejmuje drobne chrząszcze, o kulistym ciele, charakteryzujące się specjalizacją pokarmową polegającą na odżywianiu się mszycami (*Aphidodea*) i czerwcami (*Coccodea*). Mimo znaczenia obu grup pluskwiaków, jako szkodników rolniczych i leśnych, wiedza o ich naturalnych wrogach, jakimi są *Cybocephalidae*, jest nadal niewystarczająca. Spośród pięciu gatunków podawanych z Europy środkowej, w Polsce stwierdzono do tej pory trzy, przy czym informacje o ich bionomii, ekologii i rozmieszczeniu w kraju są bardzo wrywkowe.

W trakcie obserwacji faunistycznych prowadzonych w Poznaniu w roku 1997, stwierdzono obecność dwóch gatunków omówionych poniżej.

Cybocephalus politus (GYLLENHAL, 1813)

– Poznań (UTM: XU31): 16 VI 1997 (1♂, 3♀), 21 VI 1997 (2♂♂, 5♀) i 26 VI 1997 (1♀), leg. Tian MINGYI. Osobniki znajdowane były wśród kolonii *Lepidosaphes ulmi* L. (*Diaspididae*), żerujących na pędach *Salix* sp. przy ulicy Obornickiej.

Jest to drugie po Żaganiu stanowisko tego gatunku na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej.

Cybocephalus fodori ENDRÓDY-YOUNGA, 1965

– Poznań (XU31): 9 VII 1997 (1♂, 2♀), 11 VII 1997 (1♂, 1♀) i 26 VII 1997 (1♀), leg. Tian MINGYI. Osobniki znajdowane były na pędach *Rhamnus* sp. i *Salix* sp. (przy ulicach Obornickiej i Witosa) wśród kolonii *Lepidosaphes ulmi* L.

Jest to drugie stanowisko tego gatunku w Polsce i pierwsze na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej.

Materiały dowodowe znajdują się w kolekcjach autorów.

Tian MINGYI, Guangzhou (Chińska R. L.)
Marek BUNALSKI, Poznań (Polska)