

bläschenförmigen Gespinst zu verwandeln. Die Gespinste findet man bei der Zucht entweder an trockenen Blättern oder an den Wänden des Zuchtkastens.

CHRZĄSZCZE NOWE DLA FAUNY EUROPEJSKIEJ I POLSKIEJ

[FÜR EUROPÄISCHE UND POLNISCHE FAUNA NEUE KÄFER]

podał

R. PATKIEWICZ (Lwów).

Lebia crux minor var. *sexmaculata* mihi. Nogi czerwono-żółte, kolanka czarne, głowa czarna, przedplecze czerwone, na bokach aż do tylnych kątów szeroko, z przodu bardzo wąsko poczernione. Pokrywy czarne, z przodu z dwiema czerwono-żółtymi plamkami, które nie sięgają po przedni brzeg pokryw, małą czerwoną plamką grzbietową i strzępiastą tylną. Złowiona w Bolechowie, na zarynk Sukiela w lipcu 1919. Forma typowa jest dość rzadką u nas; znaczędziem ją głównie na zarynk rzecznym, w miejscach piaskowych, suchszych, pod mchem i kamieniami.

Liosoma deflexum ab. *brunneum* mihi. Pokrywy oraz przedplecze czerwono-brunatne. Dołka obok Bolechowa, 28. IV. i 8. VI. 1913 w dwu okazach, z których jeden Muzeum im. Dzieduszyczych oddałem.

Lebia crux minor var. *scutellata* Letzn. Jedyny okaz mojego zbioru schwytalem w lesie w Dolęce obok Bolechowa 5. IV. 1912.

Rosalia alpina a. *prolongata* Reitt. Jedyny okaz w mym zbiorze, schwytany został w Taniawie obok Bolechowa przez leśniczego p. Kaczanowskiego dnia 15. VI. 1911.

Rosalia alpina a. *multimaculata* Th. Pic. Schwytana w Ja-merstalu obok Bolechowa w czerwcu 1917. *Rosalia alpina* należy u nas do rzadszych owadów; w ciągu 18 lat schwytalem jakieś 20 okazów, głównie na zrębach bukowych w Taniawie obok Bolechowa.

Caccobius schreberi a. *conjunctus* J. Müll. Znalazłem we Lwowie za rogałką Łyczakowską, w kilku okazach obok toru kolejowego dnia 24. IV. 1920.

RÉSUMÉ.

Verfasser gibt neue, von ihm gesammelte Coleopteren-Abarten an, und zwar:

1. neu für die paläarktische Fauna:

Lebia crux minor var. sexmaculata n. var. von der typischen Form dadurch abweichend, dass die Halsschildränder vorne sehr schmal, an den Seiten breiter geschwärzt sind, die 2 vorderen Flecke der Flügeldecken deren Basis nicht erreichen und die schwarze Basis an jeder Flügeldecke noch je einen rotgelben Fleck trägt. Fundort: Bolechów, Kleinpolen, VII.

Liosoma deflexum a. brunneum n. ab. Das ganze Tier rotbraun. Fundort: Dołzka b. Bolechów IV. VI.

2. neu für die Fauna Polens:

Lebia crux minor v. scutellata Letzn. Dołzka b. Bolechów, Kleinpolen, 5. IV. 1912.

Rasalia alpina a. prolongata Reitt. Taniawa b. Bolechów, 15. VI. 1911.

Rosalia alp. a. multipunctata Th. Pic. Jamerstal b. Bolechów, Juni 1917.

Caccobius schreberi a. conjunctus J. Müll. Lemberg 24. IV.
Alle obigen Arten in seiner Sammlung, 1 Expl. der letzten Form im Dzieduszycki'schen Museum in Lemberg.

NOWE DLA EUROPY I MAŁOPOLSKI ABERACJE MOTYLI WIĘKSZYCH (*MACROLEPIDOPTERA*)

[NEUE FÜR EUROPA UND KLEINPOLEN ABERRATIONEN VON MACROLEPIDOPTEREN]

podat.

TYTUS F. KAUCKI.

Po ostatnim badaniu moich zbiorów motyli większych (*Macrolepidoptera*) Małopolski podaje niektóre aberacje (lub odmiany) u nas dotychczas nie ogłoszone, wśród nich kilka nowych i dla Europy.

Erycinidae.

NEMEOBIUS Stph.

Lucina L. nov. ab. „supra subtusque pallidior, alis posteriorebus fascia media subtus supraque alba“. Nowa ta aberacja od-