

60. Nowe stanowiska i uwagi o niektórych polskich pustoszożowatych (*Coleoptera, Ptinidae*)

New localities and notes on some Polish spider beetles (*Coleoptera, Ptinidae*)

Niptus hololeucus (FALDERMANN, 1835)

- Pojezierze Drawskie, Międzyzlesie k. Szczecinka, 12 VIII 1991, 1 ex., w domu (leg. R. WÓJCIK).
Gatunek synantropijny, rzadko poławiany ze względu na ukryty tryb życia.

Ptinus (Pseudoptinus) coarctiollis STURM, 1837

- Puszcza Białowieska, 31 V 1991, 1 ex., Monitoring B (pułapki Barbera), powierzchnia 5 (leg. J. M. GUTOWSKI);
- Wyżyna Małopolska, Rogów k. Koluszek, 6 VI 1989, 1 ex., prześwietlony LMśw, w runie, na czerpak (leg. J. BOROWSKI).

Gatunek rzadko i pojedynczo poławiany, związany z lasami mieszczymi zwłaszcza z dużym udziałem dębu.

Ptinus (Bruchoptinus) rufipes OLIVIER, 1790

- Nizina Mazowiecka, Warszawa, 13 VI 1991, 8 exx., w projektowanym rezerwacie „Skarpa Ursynowska”, na martwicach bocznych drzew liściastych: lipa drobnolistna *Tilia cordata* MILL., wierzba biała *Salix alba* L., robinia akacja *Robinia pseudacacia* L. (leg. J. BOROWSKI);
- Wyżyna Małopolska, Rogów k. Koluszek, 25 VIII 1992, 1 ex., w ogrodzie, w żółte miski wkopane w ziemię (leg. J. SAWONIEWICZ)

Jeden z pospolitszych gatunków pustoszy związanych z drewnem gatunków liściastych, szczególnie chętnie zasiedlający cienkie gałęzie robinii akacji *Robinia pseudacacia* L.

Ptinus (Ptinus) subpilosus STURM, 1837

- Puszcza Białowieska, 19 IV 1991, 6 exx., Monitoring Mk (pułapki Moericke'go zawieszane w koronach drzew), powierzchnia 4; na innych powierzchniach - 29 exx., (leg. J. M. GUTOWSKI);
- Pojezierze Pomorskie, Stara Brda Pilska k. Miastka, 24 VIII 1989, 3 exx., pod odstającą korą dębu szypułkowego *Quercus robur* L. (leg. J. BOROWSKI).

Najpospolitszy pustosż Puszczy Białowieskiej, związany głównie z obumarłymi dębami *Quercus* spp.

Ptinus (Cyphoderes) raptor STURM, 1837

- Beskid Sądecki, Kopciowa k. Krynicy, 4 IX 1992, 4 exx., w stajni, (leg. J. BOROWSKI); larwy rozwijały się w trutce na szczury a następnie przepoczwarzały w drewnianym parapecie okiennym;
- Nizina Mazowiecka, Warszawa, 20 XI 1992, 1 ex., w gablocie z wylinkami ważek (leg. C. BYSTROWSKI).

Gatunek występujący w pomieszczeniach zamkniętych oraz na terenach otwartych, głównie w lasach. Jest gatunkiem stosunkowo często odławianym.

JERZY BOROWSKI, Warszawa