

166. Nowe stanowiska *Dromaeolus barnabita* (VILLA et VILLA), *Hylis olexai* (PALM) i *H. foveicollis* (THOMSON) (Coleoptera, Eucnemidae) w Polsce

New records of *Dromaeolus barnabita* (VILLA et VILLA), *Hylis olexai* (PALM) and *H. foveicollis* (THOMSON) (Coleoptera, Eucnemidae) from Poland

*Dromaeolus barnabita* (A. VILLA et J. VILLA, 1838)

Gatunek rzadko spotykany, wykazywany z rozproszonych stanowisk w środkowej i południowej części Europy; notowany też z Algierii i Kaukazu. W Polsce znany z nielicznych stanowisk w sześciu krainach, głównie w zachodniej i południowej części kraju.

- Puszcza Białowieska: ad Hajnówka (UTM – FD74), 14 VII 1982, na gałęzi dębu, 1 ex., leg. J. M. GUTOWSKI, coll. L. BUCHHOLZ et M. OSSOWSKA; ad Pogorzelce, oddz. 312B/313A (FD84), 2 VIII 1990, 1 ex., leg. J. M. GUTOWSKI, coll. L. BUCHHOLZ et M. OSSOWSKA;
- Dolny Śląsk: Wrocław (XS37), V 1953, 1 ex., leg. et coll. A. GRUSZKA; Borowa Oleśnicka (XS57), 24 VI 1994, 1 ex., leg. et coll. A. GRUSZKA.

Nowy dla Puszczy Białowieskiej.

*Hylis olexai* (PALM, 1955)

Stosunkowo niedawno opisany, mało znany gatunek, wykazywany głównie z Europy Środkowej, rzadziej z południowych części Szwecji, Finlandii i Karelii. W Polsce notowany dotychczas tylko z Murcek koło Katowic, Babiej Góry i Kłaja pod Krakowem (Puszcza Niepołomska).

- Puszcza Białowieska: ad Białowieża (ok. 10 km na północny zachód, przy „Drodze Narewko-wskiej”) (FD84), 24 VII 1993, 5 exx., leg. A. et E. GRUSZKA, coll. D. TARNAWSKI, 25 VII 1993, 6 exx. leg. et coll. A. GRUSZKA; Białowieży Park Narodowy (rezerwat ścisły), oddz. 398B (FD94), 11 VII 1993, 1 ex. (♀) na liściu pokrzywy, leg. D. KUBISZ, coll. L. BUCHHOLZ et M. OSSOWSKA, oddz. 254D/284B (FD94), 28 VII 1994, grąd *Tilio-Carpinetum circaetosum* przechodzący w ols *Carici elongatae* – *Alnetum*, 1 ex. (♂) na liściu rośliny zielnej w miejscu prześwietlonym, w sąsiedztwie pozbawionego kory, powalonego pnia świerkowego, leg. et coll. L. BUCHHOLZ et M. OSSOWSKA; ad Skupowo, oddz. 122D (FD85), 10 VII 1993, 1 ex. (♀) na sęgu drewna topolowego i brzoźowego, leg. D. KUBISZ, coll. L. BUCHHOLZ et M. OSSOWSKA.

Nowy dla Puszczy Białowieskiej.

*Hylis foveicollis* (THOMSON, 1874)

Dość rzadko znajdowany gatunek europejski, w Polsce znany dotychczas z sześciu krain. Wydaje się być najpospolitszym w Europie Środkowej przedstawicielem rodzaju *Hylis* GOZIS.

- Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Skoroszów koło Milicza (XS59), 16 VII 1992, 1 ex., leg. et coll. A. GRUSZKA; Gołuchów (YT05), 6 VII 1990, 1 ex. (♀) na leżącym pniu grabu porośniętym grzybami, w miejscu silnie nasłonecznionym, leg. A. MELKE, coll. L. BUCHHOLZ et M. OSSOWSKA;
- Dolny Śląsk: Bolesławiec (VS84), 15 VIII 1995, 1 ex., nad brzegiem rzeki Bóbr, leg. J. BŁAUCIAK, coll. D. TARNAWSKI;
- Beskid Zachodni: Gorce, ad Lubomierz (DV49), 17 VII 1992, 1 ex. (♀), leg. J. MICHALSKI, coll. L. BUCHHOLZ et M. OSSOWSKA.

Nowy dla Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej i Dolnego Śląska.

Praca wykonana w części dotyczącej Puszczy Białowieskiej, w ramach projektu nr 4 S401 098 06 finansowanego w latach 1994–1996 przez Komitet Badań Naukowych.

LECH BUCHHOLZ, Poznań  
ANDRZEJ GRUSZKA, Wrocław  
DARIUSZ TARNAWSKI, Wrocław