

der Mitte deutlich, wenn auch flacher u. breiter als an den Seiten. Bauch dichter u. länger behaart, die Endfransen an den Ringen 2.-4. viel besser ausgebildet.

Ich habe 4 ♀ u. 5 ♂ untersucht, die aus Sanaa in Yemen (Südarabien) stammen. Type des ♂ u. des ♀ im Besitze des Zoologischen Museums in Hamburg.

Nowe dla fauny polskiej gatunki i odmiany Kózek oraz nowe miejsca rozszedlenia.

Neue für Polens Fauna Arten und Aberrationen und neue Fundorte
der *Cerambycidae* (Col.).

podał

M. SULMA.

Aegosoma scabricorne Scop. Brak tego gatunku w wykazie Łomnickiego (3) i pracy Kinela (2). Hildt (1) pisze: „Znajdował go ś. p. Michał Rybiński u stóp Czarnohory w okolicach Worochty“. Jeden okaz samca mam z Czarnohory (Gardżyna). Lipiec 1927.

Rhamnusium bicolor ab. *glaucopterum* Schall. Wykaz Łomnickiego (3): Sil.; Trella (8) zbierał tę odmianę w ok. Przemysła; Dr. Ciszkievicz w ok. Warszawy. Mam 2 okazy z ok. Puław. Należy przypuszczać, że wszędzie występuje z formą typową.

Rhamnusium bicolor ab. *gracilicorne* Thery. 16 VIII 1926. Wolica (południowa część pow. Puławy).

Oxymirus cursor ab. ♀ *lineatus* Letzn. W wykazie (3): „Sil.“; Kinel (2): Czarnohora (Pożyżewska Połonina). Mój okaz został znaleziony na Babiej Górze w sierpniu 1926 r.

Oxymirus cursor ab. *verneuli* Muls. Wykaz (3): Sil.; Kinel (2) podaje go z Błotka, Oslaw, Ludwinowa; Trella (8): Brylińce. 7 VII 1929 znalazłem 1 okaz w dol. Roztoki koło Rytra; W lipcu 1929 Dr. Ciszkievicz znalazł tę odmianę po drodze z Bukowiny do Morskiego Oka.

Stenochorus quercus ab. ♀ *dispar* Panz. Wykaz: Sil.; Kinel (2): Jagielnica. 1 okaz tej odmiany schwyciałem dniu 18 VI 1926 w Wolicy na kwitającym głogu.

Evodinus interrogationis ab. *ebeninus* Muls. 10 VII 1928
Potok Pieniński — na *Spirea*.

Leptura sexmaculata ab. *rybińskiej* Reitt. 14 VII 1928, Do-
lina Strążyska — skoszony.

Leptura maculata ab. *sinuata* Muls. W latach 1928 i 1929
w okolicy Rytra, Szczawnicy, Pienin — zebrałem kilkadziesiąt
okazów tego gatunku. Pomędzy zebranymi okazami sporo było
odmiany ab. *externepunctata* Muls., ab. *binotata* Muls. i 3 okazy
ab. *sinuata* Muls. z tych jeden z Rytra, 2 z Pienin. Oprócz wy-
mienionych mam w zbiorze kilkanaście sztuk *L. maculata* Pod-
a których nie można podciągnąć pod żaden opis odmian podanych
przez Reittera (4).

Gracilia minuta F. Wykaz (3): Sil. Pos. Bor.; Tenenbaum
(5) podaje okolice Warszawy. Kilkanaście okazów tej ciekawej
Kózki znalazłem w Wolicy w czerwcu 1926 (ściana domu obita
chróstem).

Plagionotus arcuatus ab. *connatus* Mors. 16 VI 1926 Wo-
lica pow. Puławy z formą typową (4 okazy).

Plagionotus floralis ab. *basicornis* Reitt. 18 VII 1927, Ka-
zimierz n. Wisłą. Tenenbaum (7) podaje go z Ojcowa.

LITERATURA.

1. Hildt Ludwik Fryderyk: Krajowe owady Kózkowate. Pamiętnik
Fizjograficzny, tom XXIV. Warszawa, 1917.

2. Kinel Jan: Kózki Polskie. Rozprawy i Wiadomości z Muzeum im.
Dzieduszyckich, tom III, zes. 1-2.

3. Łomnicki M.: Wykaz chrząszczy czyli tegopokrywych ziem Polskich,
Kosmos, 1913.

4. Reitter E.: Fauna germanica, tom IV.

5. Tenenbaum Szymon: Przybytki do fauny chrząszców Polski od
roku 1913. Rozprawy i Wiadomości z Muzeum im. Dzieduszyckich, tom VII—VIII.

6. Tenenbaum Szymon: Kilkadziesiąt nowych dla Polski chrząszczy
P. P. E. T. IV, zes. 2.

7. Tenenbaum Szymon: Nowe dla Polski gatunki i odmiany chrząszczy
P. P. E. T. V, zes. 1-2.

8. Trella T.: Wykaz chrząszców okolic Przemyśla. *Cerambycidae*. Pol-
skie Pismo Entomologiczne, tom IV, zes. 2.