

‡ *reitt. a. subcarpathica* nov. z poprzednią.¹⁾

Helops lanipes L. pospolity.

H. quisquilius St. Vl. Dubiecko.

RÉSUMÉ.

Es werden unter den in der Umgebung von Przemyśl vorgefundenen Heteromeren 5 neue Aberrationen unterschieden:

1. *Anaspis thoracica* L. a. *signata* nov. Hahschild in der Mitte mit einer schwärzlichen Makel, sonst wie Stammform.

2. *Melandrya dubia* Schall. a. *brunnea* nov. rostgelb, Kopf, Halsschild und Schenkel schwärzlich.

3. *Hypophloeus unicolor* Pill. a. *abietis* nov. $\frac{2}{3}$ der Fliegeldecken rostgelb, sonst schwarzbraun.

4. *Tenebrio molitor* L. a. *flavus* nov. gelbbraun, Fühler und Beine schwärzlich.

5. *Laena reitteri* Wse. a. *subcarpathica* nov. rostgelb, Kopf dunkler, Fühler und Beine rotbraun; (Stammform: Körper schwärzlich bis schwarz, Fühlerbasis und Beine rotbraun).

TRZY GATUNKI DLA FAUNY POLSKI NOWYCH CHRZĄSZCZY

[DREI FÜR POLENFAUNA NEUE KÄFER]

PODAJ.

T. TRELLA.

Staphylinus L. *chloropterus* Pnz., dwa okazy wysiane z pod suchych liści w lesie pikulickim, IV, X.

Selatosomus Steph. *depressus* Grm., jeden okaz w lipie wypróchniałej na przedmieściu Popielówka, 1 p. VII.

Enoplium Latr. *serraticorne* Oliv., dwa okazy na zsychnającym dębie w lasku Budy Mł., 2 p. VI, 26. VII. 22.

¹⁾ *Laena reitteri* Wse. a. *subcarpathica* nov. żółto-brązowa, głowa ciemniejsza, rożki i nogi czerwonawe; za typowe uważam ubarwienie ciemno-brunatne, do czarnego, nasada rożków i nogi czerwono-brunatne.