

bezeichnet. Unter den Letzteren wurde eine ganz neue Aberration von *Dichonia aprilina* nämlich: ab. *pallida* Kaucki beschrieben. Näheres bei der Art.

Wykaz chrząszczów okolic Przemyśla.

(Verzeichnis der Käfer der Umgebung von Przemyśl).

CICINDELIDAE, CARABIDAE, RHYSODIDAE.

podał

T. TRELLA.

CICINDELIDAE.

Cicindela: *silvatica* L. Trzcieniec; *silvicola* Latr.; *hybrida* L.; *h. a. riparia* Latr.; *campestris* L.; ♀ *c. a. impunctata* West.; *c. a. affinis* Fisch.; ♀ *c. a. 5-maculata* Beuth.; *germanica* L.; + *g. a. deuterus* Torre (Tenenbaum: Zamojskie, Ojców, Warszawskie); ♀ *g. a. protos* Torre; *arenaria* Fuessl. v. *viennensis* Schrk. Sośnica, 2 ok.

CARABIDAE.

Cychrus: *rostratus* L.; *r. v. pygmaeus* Chaud.; + *attenuatus* Fbr., Brylince, Turnica (w wyk. Carp., Tenenbaum: Wołyń).

Calosoma: *inquisitor* L.; ♀ *inq. a. viridimarginatum* Letzn.; *sycophanta* L.; Zamek 1 ok.

Carabus; *coriaceus* L. v. *rugifer* Kr.; *irregularis* Fbr., Turnica; + *irr. a. montandoni* Buyss., z poprz. (w wyk. Carp.); + *violaceus*¹⁾ L. v. *andrzejowskii* Fisch. (w wyk. Pod.); *intricatus* L.; ♀ *intr. v. angustulus* Haury., Budy Wk. 1 ok.; *variolosus* Fbr.; *auronitens* Fbr., rzadki; *aur. v. escheri* Pall., tylko na płd. od Sanu; ♀ *aur. a. subcatenulatus* Wesh. z poprz.; *convexus* Fbr.; *nilens* L. Ralce, 1 ok.; *clathratus* L., Starzawa; + *menetriesi* Hum., Starzawa, 1 ok. (w wyk. Leop. Bor. Lith.); *granulatus* L.; *gr. a. rubripes* Geh.; *cancellatus* Ill. a. *femoralis* Geh.; *ullrichi* Grm.; *arvensis* Hrbst.; + *obsolete* Strm., Brylince, Turnica, Ja-

¹⁾ Uderzającem jest, że forma podolska zastępuje czy też wyparła formy karpackie.

błonów (w wyk. Sil.-Beskid); + *obs. v. sacheri* — z poprz. (w wyk. Carp.); + *obs. v. euchromus* Pall. z poprz. (w wyk. Carp.); + *o. v. carpathicus* Pall. z poprz. (w wyk. Carp.); + *scheidleri* Pnz. *v. preyssleri* Dft., na pld. od Sanu (w wyk. Carp. occ.); + *sch. v. excellens* Fbr., Hurko (w wyk. Pod.); + *scabriusculus* Ol., Zamek, Kruhel Mł., Siedliska (w wyk. Pod.); + *sc. v. erythropus* Fisch., z poprz. (w wyk. Pod.); *hortensis* L., Byków; *linnei* Pnz.; *glabratus* Payk.

Leistus: *ferrugineus* L.; *rufomarginatus* Dft. 1 ok.; *piceus* Froel.

Nebria: *livida* L.; *picicornis* Fbr.; + *gyllenhali* Schoen., Turnica (w wyk. Carp.); *brevicollis* Fbr.

Notiophilus: *palustris* Dft.; *biguttatus* Fbr.

Omophron: *limbatum* Fbr.

Blethisa: *multipunctata* L.

Elaphrus: *uliginosus* Fbr.; *cupreus* Dft.; *riparius* L.; *aureus* Müll.

Lorocera: *pilicornis* Fbr.

Civina: *fossor* L.; *collaris* Hrbst.; c. a. *discipennis* Letzn.

Dyschirius: *digitalis* Dej.; *arenosus* Steph.; *obscurus* Gyll.; *nitidulus* Dej.; *aeneus* Dej.; *globosus* Hrbst.; # gl. a. *ruficollis* Kol.

Broscus: *cephalotes* L.

Asaphidion: *caraboides* Schrnk.; *pallipes* Dft.; *flavipes* L.

Bembidion: *striatum* Fbr.; *foraminosum* Strm.; *velox* L.; + v. a. *nigrescens* Schilsk., z lypowym (Tennenbaum: Mazowsze); *argenteolum* Ahr.; *litorale* Ol.; *splendidum* Dft.; *pygmaeum* Fbr.; p. a. *bilunulatum* Bielz.; *lampros* Hrbst.; l. v. *properans* Steph.; *punctulatum* Drap.; + p. a. *lutzi* Reitt. (Tennenbaum: Krynicę); + *ruficolle* Gyll., 2 ok. z nad Wiaru (w wyk. Hal. occ. Tennenbaum: Warszawskie); *bipunctatum* L.; *dentellum* Thunbr.; *varium* Ol.; *adustum* Schaum; + *obliquum* Strm., 1 ok. z nad Wiaru (w wyk. Sil. Mas.); + *prasimum* Dft., 1 ok. z nad Wiaru w wyk. Carp. occ.); *fasciolatum* Dft.; # f. a. *coeruleum* Serv. z poprz. nad Wiarem; + *tricolor* Fbr., nad Sanem i Wiarem (w wyk. Carp.); + *conforme* Dej., jak poprzedni (w wyk. Carp.); *tibiale* Dft.; *ripicola* Duf. v. *testaceum* Dft.; + *andreae* Fbr. v. *distinguendum* Duv. (w wyk. Sil.); a. v. *femoratum* Strm.; *ustulatum* L.; *lunatum* Dft.; *modestum* Fbr.; *decorum* Pnz.; *nitidulum*

Mrsch.; *brunnincorne* Dej. v. *milleri* Duv.; + *monticola* Strm. nad Wiarem (w wyk. Carp.); *ruficorne* Strm.; + *millerianum* Heyd., nad Wiarem (w wyk. Carp.); *stomoides* Dej.; *minimum* Fbr.; *4-guttatum* Fbr.; *4-maculatum* L.; *humerale* Strm.; *tenellum* Er.; + *t. a. triste* Schilsk. z poprz. (Tenenbaum: Warszawskie); *doris* Gyll.; *articulatum* Gyll.; *8-maculatum* Goeze; *assimile* Gyll.; *guttula* Fbr.; *mannerheimi* Sahlb.; *biguttatum* Fbr.

Ocys: *5-striatus* Gyll.

Tachys: *bistriatus* Dft.; *4-signatus* Dft.

Tachyta: *nana* Gyll.

Perileptus: *areolatus* Creutz.

Thalassophilus: *longicornis* Strm.

Trechus: *micros* Hrbst.; *discus* Fbr.; *4-striatus* Schrnk.; *rubens* Fbr.; + *palpalis* Dej. (- ? *subnotatus* Dej.) Turnica (w wyk. Carp.); + *latus* Dej., Turnica (w wyk. Carp.); + *striatulus* Putz. (w wyk. Carp.); + *pulchellus* Putz. (w wyk. Carp.).

Epaphius: *secalis* Payk.

Patrobus: *excavatus* Payk.

Pogonus: + *luridipennis* Grm., Nowosiółki nad Wiarem, 1 ok. V. (w wyk. Sil. Bor.).

Panageus: *crux major* L.; *bipustulatus* Fbr.

Chlaenius: *vestitus* Payk.; *nitidulus* Schrnk.; n. v. *tibialis* Dej.; *nigricornis* Fbr.; *tristis* Schall.; *sulcicollis* Payk.; + *costulatus* Mocz., Lipnik. 1 ok. V. (w wyk. Pos., Pom.).

Callistus: *lunatus* Fbr.

Oodes: *helopiooides* Fbr.

Badister: *unipustulatus* Bon.; *bipustulatus* Fbr.; *sodalis* Fbr.; *peltatus* Pnz.

Licinus: + *hoffmanseggi* Pnz., Turnica, (w wyk. Carp.); *depressus* Payk.

Ophonus: *punctulatus* Dft.; + *rupicola* Strm., Kruhel Mł.; Siedliska (w wyk. Sil.; Kuntze: Podole); *puncticollis* Payk.; *brevicollis* Serv.; *azureus* Fbr.; # az. a. *chlorophanus* Pnz., z po- przednim; *griseus* Pnz.; *pubescens* Muell.; *calceatus* Dft.

Harpalus: *aeneus* Fbr.; *aen. a. viridis* Schilsk.; *aen. a. coeruleus* Schilsk.; *aen. v. confusus* Dej.; *aen. v. semipunctatus* Dej.; *distinguendus* Dft.; *d. a. chlorisans* Torre; *smaragdinus* Dft.; *dimidiatus* Rossi; *iufus* Bruegg.; *latus* L.; *luteicornis* Dft.; *4-puncta-*

tus Dej.; *rubripes* Dft.; *autumnalis* Dft.; *servus* Dft.; *tardus* Pnz.; + *modestus* Dej. (w wyk. Hal. occ.); *anxius* Dft.; *picipennis* Dft.

Trichotichnus: *laevicollis* Dft.

Stenolophus: *teutonus* Schrnk.

Acupalpus: *flavicollis* Dft.; *meridianus* L.; *dorsalis* Fbr.; *exiguus* Dej.

Bradycellus: *v. rhabaci* Dft.; *harpalinus* Serv.

Dichirotrichus: *rufithorax* Sahlb.

Diachromus: *germanus* L.

Anisodactylus: *binotatus* Fbr.; *nemorivagus* Dft.; *signatus* Pnz.

Zabrus: *tenebrioides* Goeze.

Amara: ~~Alebeja~~ Gyll.; *similata* Gyll.; *cvata* Fbr.; + *montivaga* Strm., Brylińce, Turnica (w wyk. Carp.); *communis* Pnz.; *convexior* Steph.; *lunicollis* Schioedte; *aenea* Dej.; *spreta* Dej.; *eurynota* Pnz.; *familiaris* Dft.; *lucida* Dft.; *tibialis* Payk.; *municipalis* Dft.; *bifrons* Gyll.; *apricaria* Payk.; *fulva* Deg.; *consularis* Dft.; *aulica* Pnz.; *equestris* Dft.

Stomis: *pumicatus* Pnz.

Abax: *ater* Vill.; *parallelus* Dft.; *ovalis* Dft.; *carinatus* Dft.; + *schueppeli* Pall. v. *renderschmidti* Grm.: Brylińce, Turnica (w wyk. Carp.).

Molops: *piceus* Fbr.

Pterostichus: + *macer* Mrsch.; Hurko, Prałkowce, Michałówka (w wyk. Hal. occ; Sil. Bor.; Tenenbaum: Warszawa); *lepidus* Leske; *cupreus* L.; *coeruleescens* L.; *vernalis* Pnz.; *aterimus* Hrbst.; *oblongopunctatus* Fbr.; *niger* Schall.; *vulgaris* L.; *nigrita* Fbr.; *anthracinus* Ill.; *gracilis* Dej.; *minor* Gyll.; *interstinctus* Strm.; *strenuus* Pnz.; *diligens* Strm.; + *cordatus* Letzn. (w wyk. Carp. occ.); *aethiops* Pnz.; *melas* Creutz.; + *foveolatus* Dft., Turnica (w wyk. Carp. occ.); + *metallicus* Fbr.; (w wyk. Carp., Tenenbaum: Ojców); + *fossulatus* Quens., Brylińce, Turnica (w wyk. Carp.); + f. v. *wellensi* Drap. z poprzednim (w wyk. Carp.).

Sphodrus: *leucophthalmus* L.

Laemostenus: *terricola* Hrbst.

Platyderus: *rufus* Dft.

Calathus: *fuscipes* Goeze; f. a. *flavipes* Payk.; *erratus* Sahlb.; + *metallicus* Dej. Turnica (w wyk. Carp.); *melanocephalus* L.; *micropterus* Dft.

Dolichus : halensis Schall.; *h. a. triangulatus* Schilsk., częstszy od typowego.

Synuchus : nivalis Pnz.

Olisthopus: + *sturmi* Dft., okolice bliższe (w wyk. Leop.; Tenenbaum: Śląsk); + *rotundatus* Payk., na płd. i pół. od Sanu (w wyk. Carp.; Tenenbaum: Kieleckie).

Agonum : ruficorne Goeze; *obscurum* Hrbst.; *assimile* Payk.; + ass. a. *sanguinipes* Reitt., z typowym (Mazur: Krakowskie); *livens* Gyll.; 6-punctatum L.; + 6-p. a. *montanum* Heer., z typowym, (w wyk. Pol. med., Mazur: Tatry, Wieliczka); *viridicupreum* Goeze; *vir. a. austriacum* Fbr.; *marginatum* L.; *muelieri* Hrbst.; + m. a. *coeruleascens* Letzn. z poprz. (Tenenbaum: Warszawa; Mazur: Tatry, Kraków); + m. a. *tibiale* Heer, z poprz. (w wyk. Sil.); *gracilipes* Dft.; *viduum* Pnz.; *vid. a. modestum* Dft.; *vid. v. emarginatum* Gyll.: *micans* Nicol.; *fuliginosum* Pnz.; *piceum* L.; *gracile* Gyll.; *dorsale* Pont.

Lebia : cyanocephala L.; *chlorocephala* Hoffm.; *crux minor* L.; + c. m. a. *nigripes* Dej., z poprz. 1 ok.

Lionychus: + *quadrillum* Dft., nad Wiarem, (w wyk. Carp.); + q. a. *bipunctatus* Heer, z poprz. (w wyk. Sil.); + q. a. *major* Mill., z poprz. (w wyk. Carp.).

Metabletus: *truncatellus* L.; *foveatus* Geoffr.

Microlestes: *minutulus* Gocze; *maurus* Strm.

Dromius: *linearis* Ol.; *agilis* Fbr.; + *longulus* Friv. (= ? *cordicollis* Vorb. = ? *quadraticollis* Mor.); *marginellus* Fbr.; *fennestratus* Fbr.; *4-maculatus* L.; *4-notatus* Pnz.; *nigriventris* Thoms.

Demetrias: *imperialis* Grm.; *monostigma* Sam.

Cymindis: *humeralis* Geoffr.; *axillaris* Fbr.

Odacantha: *melanura* L.

Drypta: *dentata* Rossi, częsta w bliższej okolicy.

Brachynus: *crepitans* L.; # *cr. a. strepitans* Dft., Hurko 1 ok.

RHYSSODIDAE.

Rhysodes: *sulcatus* Fbr., Brylińce, Turnica, Cisowa, Koptyno (pod korą próchniejących jodeł, rzadziej buków i w otworach po: *Ceruchus*, *Sinodendron*, *Zimioma*, *Eurythyrea* i t. p.); owada doskonałego spotykalem prawie przez cały rok, raz

w styczniu w dziesiątkach egzemplarzy w starym pniu jodłowym wraz z *Cucujus*, *Ostoma*, *Melasia* i t. d.).

Résumé.

Es werden *Cicindelidae*, *Carabidae* und *Rhysodidae* von Przemyśl und Umgebung angegeben.

Nowe i mało znane formy motyli fauny Polski.

(Neue und wenig bekannte Lepidopteren aus Polen).

podał

F. SCHILLE (Podhorze k. Stryja).

W ostatnich kilku latach zebrałem kilka nowych gatunków i odmian motyli w okolicy Podhorzec, które niżej podaję. Gwiazdka oznacza formy nowe dla fauny a liczba obok porządkowej jest liczbą katalogu Staudingera i Rebla.

*1. (836.) *Ochrostigma velitaris* Hufn. ab. *cinerea* ♂ m. ab. nov.

Nakreślenia skrzydeł zupełnie jak u formy typowej. Kolor skrzydeł przednich łupkowo szary (schiefergrau), przepaski podwójne na skrzydłach nie biało lecz szaro wypełnione, duża plama u nasady skrzydeł przed pierwszą przepaską jasno ochrowo żółta. Plama duża u wierzchołka skrzydeł szara. W miejscu plamki nerkowej i między przepaską drugą (postmediana) a brzegiem zewnętrznym przebija, chociaż bardzo słabo, ton ochrowy. Skrzydła tylne ciemno szaro brunatne.

Strzałków ex I. 29. VI. 24, z dębów.

*2. (2475.) *Rivula sericealis* Sc. ab. *albolividalis* m. ab. nov.

Jasno żółto biała, bez wszelkich nakreśleń prócz plamki nerkowej, w której 2 czarne kropki; plamka bez ostrzych brzegów, rozlana. Tylne skrzydła również rozjaśnione, prawie że białe, u formy typowej ciemno szare.

Strzałków 13. VI. 25, na łące koło mego mieszkania.

*3. (2767.) *Zanclognatha tarsicrinalis* Knoch. ab. *pallida* Spuler.